



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A

1790

A

Don Faustine Luchini

L

80



42599
PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE ME=
DICA MATERIA
LIBRI SEX,

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.

HIS ACCESSIT, PRAETER
*Pharmacorum simplicium catalo=
gum, copiosus omnium ferme
medelarũ suæ curationum*

Index.



VENETIIS.
DOMINICVS LILIVS
EXCVDEBAT.
M. D. . L.

2

N A E N I A I N O B I T V
R V E L L I I.

Cesserat è uiuis ad celsa Ruellius astra.

Constiteratq; alti clarus in arce patris:

Cùm perijssse hominem rata Mors, ait, Ecce triumphe

Clamet io, cui cui uictima grata cadit.

Vicimus, en nostras toties qui eluserat arteis,

Qui toties mortem uicerat, interijt.

Ast ubi in ore uirum uersari auditq; uidetq;,

Hunc magis atq; magis uiuere, uicta fremit.

Cui pæam, quibus ortus erat mihi redditur astris,

Quemq; putas uictum, bina trophæa refert.

Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:

Altera, quod moriens nunc quoq; mille rapit:

Nempe Dioscoride Romana per oppida ducto,

Cui toga, cui potior lingua Latina, sua est.

Cætera quid memorem uicturi scripta laboris,

Naturam & fides, pharmacaq; omne genus?

Non uillas, nec equos, nec curam diuitis agri,

Nullaq; uitæ hominis commoda præterijt,

Quæ non tractarit, sapientibus edita Graijs,

Quæ non reddiderit, uel meliora suis.

Vtq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis

Amille haud quisquam tanti opus ingenij.

E P I T A P H I V M

Ioannis Ruellij, Diony-
sio Corronio au-
thore.

Hic situs est, in quo uiguit medicina, Ruellus:
In quo naturæ notitia, atque poli.
In quo prima fuit dos, Graium uertere scripta
In Latium, ac Latio scribere digna Ioue.
Olim erat affinis, nunc est conuiuii deorum,
Præmiâque illa sui grata laboris habet.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

libri primi præ-

fatio,

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi
interprete.



QVANQVAM, amiciffime
Aree, complures non ueterū mo-
do, ſed recentiorum quoque, de
medicamentorum compoſitio-
ne, uiribus, atque probatione cō-
mentati ſunt: nobis tamen nec
uauum, nec à ratione abhor-

rentem impe-
tū animi ad

hoc opus inceſſiſſe, tibi oſtendere tentabimus: quòd
eorum nōnulli abſolutum nihil ediderūt, alij quā-
plurima, quæ auditu percunētando didicerant, ſcri-
ptis tradiderunt. Si quidem Bithynus Iolas & He-
raclides Tarentinus, omiſſa prorsus herbarum tra-
ctatione, rem ſanè quā paucis perſtrinxerunt.
Neq; uerò omnes illi de metallicis quicquam rebus

A iij

DIOSCORIDIS

aut odoramentis memoria prodiderunt. Crateuas autem herbarius, & Andreas medicus, qui ceteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprimè utileis, herbasq; haudquaquā adnotatas, reliquerunt. Veruntamen priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinalē materiam vernaculam cognitamq; vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mādaretur: & ut medicamentorum vires probationesq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio verba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemq; controuersiarum extulerunt. Siquidem, qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascētis in Italia, chamælee succum esse contendit: androsæmonq; eandem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloë in Iudæa fossilem nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamante euidentia, quæ prorsus veritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine iđem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes nullaq; cognatione coniunctas vires collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes,

quò facilius memoria mandarentur, genera & eo Dioscori-
 rum effectus à sua cognatione disiungentes. Nos ue dis co-
 rò ab iuuentute, ut ita dicam, iuuenta iugi desiderio gnoscen-
 cognoscendae materiae allecti, permultis regionibus dorum
 peragratis (nec enim nescis nos militarem uitam simpli-
 exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros cum stu-
 contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi diuini.
 gratitudine obsequentes, ob eum, quo nos prosequeris,
 affectum. Etenim natura cum in omnes erudi-
 tione excultos, tum uerò in eos quibus cum tibi eius-
 dem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitia-
 m esse soles, in nos etiam aliquantò peculiaris.
 Enimuero non parum praebebat tuae probitatis argu-
 mentum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te
 amicitia: quam unà nobiscum degentes nouimus,
 cum mutuam inter vos beneuolentiam emulatione
 dignam intueremur. Admonitum autem te uelim,
 eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in uer-
 bis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhi-
 bitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima
 visu ipsi exactissime cognouimus: quaedam etiam
 ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percun-
 ctationeq; rerum apud singulos vernacularum dili-
 genter accepimus. Dabimus igitur operam, ut diffe-
 renti ab alijs ordine tradito, genera medicinarum
 uiresq; describantur. Quòd autem necessario sit me-
 dicamentorū ratio, nemo est fermè qui ignoret: quòd
 ea & toti arti coniuncta sit, vniuersisq; eius par-

DIOSCORIDIS

tibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, quàm plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiã uernaculam familiaremq; materiam complectemur, ut perfecta sit quæ à nobis relinquetur doctrina. Verũ in primis curam impẽdere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recondantur. certẽ pro horum ratione aut ualent uiribus, aut euanido nulloq; munere funguntur. Serena igitur cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores uel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia: in his enim locis uires eorum longẽ ualidiores intelliguntur. Contrã, quæ in campestribus, riguis, & opacis, ceterisq; locis à uento silentibus enascuntur, plerunq; degenerant, & minus uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore nec Plantæ, opportunẽ colligantur, aut si per imbecillitatem in-
ut exa- tabuerint. Neq; ignorandũ, sæpe pro peculiari loci
Etẽ co= natura, aut anni clemẽtia, maturius aut serius ad-
gnoscan lescere. Nõnulla propria ui, hyeme florẽt, et folia pa-
tur omni riunt: quedam bis anno florifera. Quare cui in ani-
tempore mo est horum peritiam assequi, necesse est eum pri-
inspicien ma germinatione solo emergẽtibus, adultis & sene-
da. scentibus adesse. Nã qui pullulanti herbæ dũtaxat

adstiterit, adultam cognoscere non potest: neq; qui
adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem no
scet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum facie,
caulium proceritates, florum seminisq; magnitudi
nem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli, qui
olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno
in errore uersentur. Quae causa etiam nonnullis scri
ptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gra
tia, gramen, quinesolium, & tusilaginem emit
tere florem, fructum et caulem negant. Ergo qui se
pius ad uisendas herbas & earum natales se contu
lerit, earum cognitionem maximè consequetur. Sci
re etiam non conuenit, sola ex herbaceis medicamini
bus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum
multis educare annis: reliqua à trimatu inutilia.
Quae uero fruticosa sunt, sicut stoechas, trixago, po
lium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum.
& alia id genus semine pregnantia demetantur flo
res quoq; antea, quam sponte sua decidant. fructus
autem, ut maturi decerpantur necesse est. & semi
na, ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herba
rum succus & foliorum elici debet, germinantibus
tum primum cauliculis. Lac & lacryma excipian
tur, inciso per summum adolescentiae uigore caule.
Radices, & linguamenta, corticesue ut recondantur,
eximere conuenit cum herbae suis folijs exuuntur. Sic
cantur etiam expurgatae inibi, locis asperginem non
redolentibus: sed quae luto aut puluere sunt obsita;

DIOSCORIDIS

aqua elui debent. Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant. arcubis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modo rara non sit, accommodatur: et lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cedria cõponuntur. Adipè autè & medullas stagnæis uasis recõdi cõuenit.

Iris.

Cap. I.



IRIS à cœlestis arcus similitudine nomē accepit. Folia fert gladioli. sed maiora, latiora, et pinguiora. Flores i caule æqualibus inter se spatijs distant, incurui, varij: siquidem candidi, pallentes, & lutei, purpurei, aut

* μηλί=
 v x, nō μέ
 λαια.

* οτε= cœrulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris specie, quæ
 gici, id est, cœlestis arcus imago representari videtur. Ra
 est, soli= dices subiacet geniculatæ, & duræ, odoratæ: quæ fru
 de. Statim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ li
 * τήν γέ= no reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedoni
 ci τω υρω= ca: & inter has laudatissimas, quæ pumila ferè et
 τρω, id densa constat radice, frangenti contumax, subru
 est, gu= fo colore, & gustu amaro, odore perquam sincero,
 stu fer= ita ut nullum prorsus situm redoleat: quæ dum turp
 mentiore. datur, sternutamenta mouet. Secundum locum ha

LIBER PRIMVS. 6

bet Africana, candicans, gustuq; amara. Teredines in uetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excalfactoria, extenuans, contra tussim efficax: humorum qui ægrè reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant, somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfriktionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex uino potæ pellunt. Decoctum earum, sceminarum fotibus utiliter imponitur: ad emolliendos locos, laxand aq; in eis venarum spiracula. ischiadicis infunditur, fistulas, ac finus carne explet. Radices ex melle glâdis modo subdite, partus extrahunt: quin etiam coctæ & illitæ, strumas, veteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoque vlcera replent, & cum melle purgant. nudata ossu corpore operiunt doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lêtigines et uitia cutis in facie à sole cōtracta emaculat: pessis, malagmatis, et acopis inseruntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

ANNOTATIO.

Censetur Galanga officinarū. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam uulgus herbariorum. hoc nomine solet indicare.

DIOSCORIDIS

Acorum.

Cap. I I.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo caespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: proficit ac deest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: etiam item torminibus, uulsis, ruptis: lienem absomit, urinae stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur, oculorum caligines succo discutit, antidote, Graecis radix magno usu commiscetur.

Meum.

Cap. I I I.

Meon, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, & anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. hinc diuersimodum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quae fere uesicae ex aqua, uel tritae citra coctionem, praecursum renum uesicaeque farctae uitia potu leniunt, Meon, urinae difficultati medentur, stomachi inflationes non faci discutunt. Torminibus, affectae uulvae, articulo- rum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritae coiecerit. cum melle in eclegmate auxiliantur, sanguinem

per menstrua pellunt, defectionibus feruefactæ: in-
fantibus autem illitæ imo uentri, urinas mouent:
quod si plus quàm deceat ex his bibatur, caput do-
lore afficiunt.

Cypirus. Cap. I I I I.

Cypirus, quem aliqui erysi sceptrum, ut aspala-
thum appellant, folia fert porraceis proxima,
sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubi-
talem aut maiorem angulosum, in cuius cacumine
minuta folia cum semine exoriuntur: ra- lices, qua-
rum in medicina est usus, coherentes inter se, oleis
oblongis similes, aut rotundæ, nigro colore, suauis
odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cul-
tis enascitur. Optima est grauissima, densa, fractu
contumax, plena & aspera, odoris cum quadam
acrimonia incundi, qualis est Cilicia, Syriaca, &
quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis
est. Venarum spiracula laxat, urinam ciēt, ad cal-
culos aquamq; subter cutem utilissimè bibitur, ad-
uersus scorpionum ictus remedio est, perfrictioni-
bus vuluæ et præclusionibus fotu prodest, pellit mē-
ses. Contra ulcera oris etiam si depascent uorētq;
farina eius efficax est. Malagmatis calfacienti-
bus, et unguentorum spissamentis bene adiūci solet.
Aliud cypiri genus tradunt in India nasci, gingibe-
ris effigie, quod manducatum croci uim reddit, gu-
stu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri-
tum exhibet.

DIOSCORIDIS

Cardamomum. Cap. V.

Cardamomum optimum est, quod est comagea-
ne, Armenia, Bosphoróque deuehitur: in India
quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet plenum,
frangenti contumax, occlusum, farctumq; (quod
enim huiusmodi non est, exoletum indicatur) & gu-
stu acre, subamarum, & odore caput tentans. Ex-
calfactoriam uim habet, potumque ex aqua facit
ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruorum resolutio-
nem. Item ad rupta, uulsa, tormina: latas uentris ti-
neas excutit. Ex uino autem potum, renibus, diffi-
cultati urinae, à scorpione ictis, neq; non omnibus ue-
nenum uibrantibus, auxilio est. Cum cortice radiz-
cis lauri epota drachma calculos cōminuit, partus
suffitu enecat, scabiem ex aceto illitum adimit. Et
ad unguentorum spissamenta additur.

Nardum. Cap. VI.

Duo nardi genera: unum Indicum, alterum Sya-
riacum appellatur, non quòd in Syria proue-
niat, sed quòd montis, in quo oritur, pars una ad
Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Sya-
riaci genere præcipuum est recens & leue, largam
gerens comam, flauum colore, perquam odoratum,
ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore, lin-
guam siccante, quod diu in sua odoris gratia perma-
neat. Ex Indicis autem nardum quoddam Gangi-
tis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enasci-
tur, montem præterfluente: quod genus ob multam

LIBER PRIMVS. 8

loci, in quo prodit, uliginem, viribus infirmius est,
atque procerius adolescit, plures ferens spicas ab
unica radice comosas, unaque conuolutas, ac gra-
uiter olentes. Montanum autem odoratus, spica bre-
ui ac mutila, odore cypero uicino, ceteras habens
Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sam-
pharitzo nomen locus indidit, frutice breui, in ma-
gnas se spargens spicas, candidiore interim medio
caule, hircorum uirus supra modum redolente:
quod improbat. Madefactum uendi solet: quod
initium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica,
& squalida, & nulloque puluere obsita. Adultera-
tur stilbio cum aqua, aut palmeo uino, inspissatio-
nis ponderisque causa inspirato. Intueri autem
oportet si lutum radicibus infideat, & incerniculo
puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim
habent exca lfactoriam, & exiccantem. Vrinam
mouent, aluum potu sistunt, vulue profluvia, sa-
niemque apposita supprimunt. Nausea ex aqua
frigida auxiliantur, & stomachi rosonibus, infla-
tioni, iocineri, regio morbo, renum uitij. Aquae au-
tem incoctae fotu ad infessum, vulue inflammatio-
nibus medentur: ad glabras oculorum genas ualent:
si quidem eas ad densiorem pilum reducant. perfu-
si humore corporibus insparguntur. Miscetur an-
tilotis, & in fictili nouo non picato ad ocularia
medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cu-
uino in pastillos coacta.

* καὶ μὲν
ἐξ αὐτοῦ
χρὸν ἰδ
ἐστὶν, &
quod na-
tina ca-
reat la-
nugine.

DIOSCORIDIS

Nardum Celticum. Cap. VII.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, saluica patrio nomine appellatum, provenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flavum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suavitas: unde pridie fasciculos aqua abluerè expedit, & exempta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidè utile, cum aceroso, alienoq; propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris gravitate, sed facilis cognitio: namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neq; odorata, uti verum nardum est. Itaque radices, atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asservari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absynthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ uitia, & uenenatos ictus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

Montanum

LIBER PRIMVS. 9

Montanum nardum. Cap. VIII.

Montanum nardum, quod ab aliquibus thymolacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, surculo & folijs eryngii, similibus, minoribus, minimè tamè spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulae regiae, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neque caulem, neque fructum, neque florè profert. Ad eadem, ad quæ Celticum, efficax.

ANNOTATIO.

* Minoribus. } Fuchsius in opere de Stirp. maioribus legendum suspicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus est, n. ol. lioribus habet quod sanè utrunque herbæ, quàm aptissimè quadrat.

* Cyrino hyoscyami. } Id est, flori hyoscyami, qui ueri cyrini, quem domesticæ punicæ florem esse nouimus, aliquam exprimit effigiem, ut in eius descriptione auctor est Dioscorides.

Asarum.

Cap. IX.

Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hederæ folijs & minoribus multò, rotundioribusq;, pluribus & cyrino hyoscyami similibus, purpureis, interfolia proximè radicè emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. } Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in & molles } radices numerosas, geniculatas, te= Græco.

B

DIOSCORIDIS

nues, obliquas, gramine non dissimiles, longe tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, & quæ linguam uehementer mordent. Excalfactoriam uim habet: urinam cit, hydropicis & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & ueratri alibi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosi montibus prouenit, sed plurimum in Ponto, Phrygia. Illyrico, & Italia Iustinensi agro.

A N N O T A T I O.

* Maioribus } Rectius forte minoribus legas, ut Ruellius quoque monuit. Flores siquidē Valerianæ nūc dictæ, quam Phuelle omnes ferè suspicantur, Narcissum effigie expressissime quidem referunt, eo tamen longe sunt minores: ni fortè soli diuersitati id imputandum censeas.

Phu.

Cap. X.

* Hippo
selini.

P Hu, quod & aliqui syluestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio & olusatri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, laui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcissi proximis, & maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius addigiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa in nigri ueratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum & mi

lantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prestare potest, ad lateris etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficio deprehenditur quoniam haec dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

Malabathrum. Cap. XI.

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indicis nardi folium, falsi quadam odoris cognitione: per multa enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. secus autem res se habet. Naque malabathrum folium, sui generis est, quod Indice gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuatur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatu aestiuo feruore, aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile odore caput feriens, quod diu in sua ui odore permaneat, et nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum uero & minutim contritum, praesertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Easdem nardo sortitur uires, sed efficacius omnia praestat. Urinam uehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibusque tritum et in uino feruefactum commode illinitur: subditum linguae, oris halitum et suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum

DIOSCORIDIS

seruat, & ab erosione tuetur.

A N N O T A T I O.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Casia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & alijs ueteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Casia.

Cap. XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralli æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordēs & cum aliquanto feruore adstringens, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis, achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto, id est germine, cognomen est. Reliquæ uiles, & quæ aphemum dicitur asyritur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & phemon. quæ darca, & citto uocitatur barbaro nomine. Similior, huic est pseudocasia, quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, herentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candidas,

* μετὰ
πολλῆς
id est, cum
multo.

* Græ-
cus asy-
ritur
phemon.

scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, uris nam ciendi, siccandi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lētigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra uiperarū ictus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflammationes omnes et renum uitia, pota proficit. Foeminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem uulvæ. Ea duplo pendere medicamentis mista, cinnamomi uicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis.

Cinnamomum. Cap. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod castiæ, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, laue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam incundè olēs. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cū optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadatenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut fricāti lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculum. facilis est huiuscemodi probatio: nāq; fragmenta miscel-

DIOSCORIDIS

lanea quaedam esse videntur. Quae autem melius
 spirant, suo halitu cum nares primum consulun-
 tur. olfactum expleant, deterioris dignotionem im-
 pediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum,
 fulvescens admodum. Tertium à Mosylitico, per-
 quam suauiter olet. nigrum, fruticosum, paucis in-
 tercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, can-
 dicans. aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnā
 habens radicem, quae cassiam planē repraesentat.
 Quintum genus, odore nares feriens, subrusum &
 cortice fulvae cassiae simile, tangenti firmum, minus
 nervosum, densa radice firmatum. Iis quae thuris,
 cassiae, myrti, aut amomi odorem spirant, minus sua-
 uitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at
 laue, & lignosum circa radicem, ut inutile reijcito.
 Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamomo
 cognomen est, vile, inualidi odoris, solutarumq; vi-
 rium. Vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylo-
 cinnamomum, praebens quandam cinnamomi fa-
 ciem. Est autem lignosum cinnamomum, sarmen-
 ta longa robustaq; ferens, odore longē cinnamo-
 mo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnas-
 momo genere differre dicāt, quod à natura eius ab-
 horreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit, et
 concoquit, urinam ciet. tam menses, quam par-
 tus potum aut ex myrrha impositum pellit, contra
 bestias, quae virus ei aculantur, venenaq; conuenit:
 caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit.

crassitiem extenuat, lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tuſſes, defluxiones, aquam ſubter cutem fuſam, renum uitia, & urinae difficultatem efficax eſt, unguentis pretioſis inferi ſolet: & in ſumma, magni ad omnia uſus. Tritum uino excipitur, umbraque ſiccatur, quò diutius eduret, reconditur.

¶ Eſt & quoddam cinnamomum, quod alii qui pſeudocinnamomum appellant, perquam denſo atque craſſo ſarmento, longè tamen inuolidius cinnamomo, & odore, & guſtu. ¶

Deſunt
in Græ-
co.

Amomum. Cap. XIIII.

Amomum exigue fruticat, ex ligno ſe conuoluens in racemi modum, flore, ceu candida uiole, paruo: folijs * uitis alba ſimilibus. Laudatur quam maxime Aemeniacum, * fuluo auri colore, ligno ſubruiſo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campeſtribus, & aquoſis enaſcitur, infirmius eſſe conſtat. Eſt autem magnum, ſubuiride, tactu tene- rum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uero ſubruiſum, paruum, fragile, racemoſum, fructu tur- gens, & odore nares feriens. Deligito recens, candi- dum uel ſubruiſum, quod nec adſtrictum cohaereat, nec conuoluatur, ſed ſolutum diffundatur: ſe- minis plenum, uuiſ paruiſ ſimile, graue, ualde odora- tum, modo cariem non contraxerit, acre, guſtu mor- dens, ſimplici colore non euariante. Vim habet caſfaciendi, adſtringendi, exiccandi. Somnum ala-

* bryoe-
nie.

* Χουοί-
ς, ἢ
Χεῖρα, id
eſt, colo-
re aurū
imitans.

DIOSCORIDIS

licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceidas concoquit, discutitq; : iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum, uiscerumq; lenit ex uua passa, ad uuluarum uitia in pessis, aut in seffionibus utile est. Decoctum iocineri, renibus, podagrae, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis unguentis. Adulteratur amomū herba simili, quae amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nasctur in Armenia flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quae ab una radice integros surculos emittunt.

Costus.

Cap. XV.

Precellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi uedicat Indicus, levis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, et odore feriens, Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, a teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excafactoria: urinam ciet, menses pellit, uitis, quae uulnam male habent, tam impositu quam fotu & fuffitu auxiliatur. Contra uiperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex uino & absynthio uenerem ex mulso stimulat, lassas uentris tineas ex aqua pellit, horroribus ex oleo.

antē febriū accessiones, & nervorū resolutionibus oblitur: vitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus emendat. Additur in antidota & malagmata. Sūt qui admistis helenij comageni præduris radicibus, adulterēt, quod deprehensu facile est: siquidem neque gustu feruet helenium, neque ualidū odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Odoratus iuncus. Cap. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathea, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij tenchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rusticus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Vim urina ciunde habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicē adstringit, comminuit, excoquit, ac uenarū spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocinebris, & renum miscetur antidotis. Radix adstringētiore est, ideo fastidijs stomachi, hydropicis, convulsis, drachma una cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uulue inflammationibus, ad desidentium fetus, utile est.

Calamus odoratus Cap. XVII.

Calamus odoratus in India nascitur: melior est fulvus, dense geniculatus, & qui

Officinus
Squinam
tum.

DIOSCORIDIS

assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Urinam potu ciet: quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subter cinem fusa morbo, renum vitij stillicidio urinae, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmatisq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum. Cap. XVIII.

* Mar-
cello lo-
cus hic
suspe-
ctus.

Balsamum, arbor, & albae violae, lycij, siue pyraecanthae magnitudine conspicitur. Folium rutae proximum longe candidius, perpetuò virens: in Iudaea solum quadam valle & Aegypto nascens, his differens modis: scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristion vocant, quasi demessile: fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aestivis sub ortu Canis ardoribus, arbor vnguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tamen exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quam semi septemue congiij cogantur, inibiq; pòdus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, validi odoris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui facilis, levis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè utiatur, misto ab aliquibus

terebinthi, cypri, lentisci, balani vnguento: item susti-
 no, metopio, melle aut Cypria ceraliquida. quod
 maleficium facile deprehenditur. Nanque merus in
 laneam uestem fusus, neque maculam facit, neque
 si eluatur notam relinquit: vitiatum autem inhaeret,
 & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non
 efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celer-
 rimè liquatur, coloreq; lactescit: vitiatum verò olei
 modo nuntat, se conuoluens, aut in stelle modum
 diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq;
 redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pes-
 sum ire, & ad ima sidere arbitrantur, postea dissi-
 patum supernatare. E ligni genere, quod xylobalsa-
 mam vocant, probatur recens, sarmento tenui, foliū
 odoratum, quadāntenus opobalsamum spirās. Ne-
 cessarius etiam seminis erumpit vsus, quare eliga-
 tur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens
 gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens.
 Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra
 oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, ina-
 mitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissi-
 ma vis inest succo, & quā maximè calfaciens:
 abstergit, quæ tenebras oculorum pupillis offun-
 dunt, medetur perfrictionibus vuluæ cum rosa-
 ceo cerato appositus: menses quoque, secundas
 & partus extrahit, horrores illiciti discutit, vl-
 cera sordida expurgat: & cruda concoquit. vri-
 nam potu ciet, egre spirantibus prodeest: datur

DIOSCORIDIS

in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium
ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidotis.
In summa, precipua authoritas succo, secunda se-
mini, minima ligno. Semen commodè potui datur
doloribus lateris, pulmonum vitis, tussi, ischiadicis,
comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinae diffi-
caltati, torminibus ac serpentum morsibus: ad ma-
liebres suffitus perquā utile est: uulnam aperit in de-
fessionibus balnearum decoctum, & humorem euo-
cat. Lignum easdem habet vires, aliquātò minores.
Ex aqua potum cruditatibus, torminosi, uulsi, ue-
nenatorum ictibus opitulatur, urinā cit, ad capitis
uulnera cum sicca iri conuenit, squammas ossium
extrahit, & ad unguentorum spissamenta additur.

Aspalathus. Cap. XIX.

*Endemum
id est, li-
gnosus.* **A**spalathus, alijs erysisceptron, frutex est *
furculosus, multis spinis horrens, nascitur in
Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad
unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur.
Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in
purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu ama-
rus. Est & alterum genus candidum, lignosum, si-
ne odore: quod deterius habetur. Vim calfaciendi cū
abstrictione obtinet. unde decoctum cum uino ad te-
tra oris ulcera colluenda conuenit, ad nomias geni-
talium, & sordida ulcera infunditur, subiectum in
pesso, partum extrahit, aluum sistit eius decoctum:
& sanguinis reiectionem potu cohibet, urinae diffi-

cultatem inflationesq; discutit.

Muscus.

Cap. XX.

Bryon, id est muscus, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, et quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum et odoratius præstat, nigricans improbatur. Adstringendi uim habet. Decoctum insidentium uulnus utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur, thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Agallochum.

Cap. XXI.

Agallochum. lignum est, quod ex India atque Arabia deportatur, thugie ligno simile, maculatum, odoratum, gustu adstringens, cum quadam amaritudine, cute uerius quam cortice uestitur aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arceat toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia, & imbecillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iocinerisue dolor excruciat, si dysenterie, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Putatur
lignum
aloes offi-
cinarum.

Narcaphthum.

Cap. XXII.

Narcaphthum ex India defertur, corticosum, simile sycomori libro: quod incendi adbris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis com-

DIOSCORIDIS

positis: constrictionibus vulvae suffitu prodest.

Cancamum.

Cap. XXIII.

Videtur quibus Lac= **C**ancamum Arabici ligni lacryma est, myrrha quibus= quodammodo similis, virosi gustus, quam ad a Lac= suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace & ca offici= myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere exte= narum. nuandis obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto, plusculos dies ebibatur: lie= nosis datur, comitialibus, & suspiriosis. menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confes= stim emendat, uino madefactum medetur eorun= dem hebetudinibus, aduersus gingiuas humore præ gnanteis, doloresq; dentium, nõ aliud efficacius.

Cyphi.

Cap. XXIII.

Cyphi odorati suffimenti compositio est, dicata dñs, qua abunde Aegyptij sacerdotes utun= tur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in potu. Per multe componendi rationes, quarum una hæc est: Sumito cyperi dimidium sextar= rium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: vuæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas duos= decim resinæ repurgatæ minas quinque: calami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhæ duodecim: uini ueteris sextar= rios nouem, cum duabus mellis minis: vuam pas= sam detractis uinaceis tussam, cum uino & myr= rha subigito: cetera tusa & cribrata adycito, die uno humorem combibere finito, dein mel coquito

dum sibi glutinis asciscat crassitudinem, eliquatā
resinam accuratè permisceto cum reliquis diligen-
ter contritis, & infictile vas recondito.

Crocum.

Cap XXV.

CROCUM, optimum in medendi usu Coryceum.
recens, & boni coloris, paulum candidi gerens
in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus con-
stans, non fragile, plenum à quo detractum est ni-
hil, quod madefactum manus inficit, nec situm re-
dolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis
nō est, aut uetus, aut humore persusum creditur. Se-
cūdus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ cōtermi-
no. Tertius Lycio, è monte Olympo. dein ex Aegia-
bus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripinum inter
Sicilica omnia uiribus infirmius est. Omnium na-
tura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & colo-
ris venustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: qui-
bus de causis magno venditur. Vtilissimum in
medicina quod antè descripsimus. Adulteratur im-
misto crocomagmate tuso, atque etiam sæpe sub-
litus: contrita, quò pondus adiciatur, simul ar-
genti spuma, aut plumbagine: sed maleficium de-
clarat insidens puluis, præsertim si defrutum in
odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odora-
tum esse uoluit. Alij exitiosum, tribus drach-
mis ex aqua potis. Proculdubio vim coquen-
di, emolliendi, atque substringendi habes: uri-
nam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passo

DIOSCORIDIS

biberint, crapulam nō sentient: oculorum fluxiones
illitum cum humano lacte, cohibet: additur in po-
tiones, quæ interancorum causa temperatur: ad uul-
uæ etiam sedisq; cataplasmata, utiliter inditur: ue-
nerem stimulat, uergentes ad ignem sacrum inflā-
mationes mulcet, auricularijs collectionibus utile.

Quo facilius conteratur, in calido fictili sole siccari
oportet, celeriterq; uersari. Urinam mouet radix ex
passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odo-
ramentis, & in formas digestis, quod crocomag-

* Re = ma uocant. Optimum est odoratum, modicè myr-
rhæ olens, graue, nigrum, ligni expers, læue, subas-
Marcel = marum, quod madefactum croci colorem reddit, gra-
uis ali- statumq; uehementer dentes, ac linguam inficit, &
quot ho- multis durans annis, quale est quod à Syria defer-
ras per- tur. Habet suas uires ad delenda quæ caliginem oculis
manente lis obuersant: urinam cit, calfacit, concoquit, &
colore. emollit. uires croci proportionem quadam tenus repræ-
Vulgo sentat, quandoquidem plurimam croci partem sibi
Enula crocomagma uendicat.

capana. Helenium. Cap. XXVI.

* Progu- H Helenium folia habet uerbasci angustioris for-
tis, xai- mæ, asperiora, oblonga, caulem quibusdam in-
enioris, id locis non emittit, radicem subalbidam, interdum
est, in subrusam, odoratam, subacrem, uegetam, ma-
montosis gnam, ex qua agnatæ propagines liliorum aut ari-
ac opa- modo feruntur. * Montibus in umbrosis, siccoq; so-
cis. lo prouenit. Foditur æstate radix, particulas
timq;

timq; dissecta siccatur. Potum radicis decoctum mē-
ses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex melle pro-
dest tussi, orthopneæ, ruptis, conuulsis, inflationibus
& serpentium morsibus. In summa excalfaciens.
Folia ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur.
Helenium stomacho vtile in passo conditum: si quie-
dem salgamarij paululum siccata radicem, mox
decoctam, et frigida aqua madefactam, in sapam
coniiciunt, & ad vsus recondunt. Trita potaq; ad
cruentas excreationes efficax est. Alterum helenij
genus in Aegypto gigni Crateuas tradit: herba est
cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repē-
tibus, folijs lenticule circa ramos, sed longioribus cre-
brisq; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per
ima tenui, superne crassiore, cortice nigro. Nasitur
in maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota,
contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum oleum. Cap. XXVII.

Oleum, quod ex immaturis oliuis exprimitur,
ad multos vsus rectè valentibus accommoda-
tissimum: omphacinum id appellatur. Prestat recē s
odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum
compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vti-
le est, quod adstringat: gingiuas contrahit, dentes
firmat, si contineatur in ore, sudores cohibet, et quò
vetustius ac pinguius, eò ad medicamenta aptius
est. Et (vt reliqua in commune dicantur) omne oleū
calfacit, emollit ventrem, à perfrictionibus cor-

C

DIOSCORIDIS

pus tuetur, ipsūque promptius ad obeunda munera reddit, aluum emollit, vlcera venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur, asidue potum redditumque vomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisana succo aut aqua potum, ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, ventris animalia pellit idem maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si vetusti non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

Oleum sylvestris oliuæ. Cap. XXVIII.

Oleum, quod sylvestres oliuæ fundunt, uehementer adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet, furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasque abstergit: tardius cautionem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur: ex altoque demittitur, ut asidue deuolutione, ictuque agitatam respumet: octaua die fœnumgræcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madesactum donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne

extillet aqua: postea tede præpinguis piceæ, assulata
tim cesa æquale pondus adiicitur, & transactis
oëto diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem
contraxerit, in uis nouum uetere uino affusum re=
condi debet, substratis sertulæ campanæ corollis
drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pō=
dere sin minus, rursus Soli mandandum, & idem
munus obeundum, usque dum inalbescat.

Sicyonium. Cap. XXIX.

Sicyoniū componendi ratio hæc est: In lebetem
oris lati stanno inductum, funditur olei albi
quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius unus,
aquæ semicongius: leui id igne coquitur, leuiter mo=
uendo: at ubi bis efferbuit, & subtracto igne refri=
xit, immatans oleum concha decapulatur, et adiecta
noua aqua conferuescit, et reliquis, ut diximus, per=
actis reponitur. In Sicyonia maximè fieri consuevit,
Sicyoniū inde accepto cognomine. Calfactoriam ad
quendam usque modum uim habet. Febri ac neruo=
rum uitijs prodest. fœminæ ad commendandum fa=
ciei nitorem eo utuntur.

Strigmenta balneorum. Cap. XXX.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt,
discutiunt: ad sedis rimas & condylomata
illinuntur. Alla uero quæ ex palestris puluerē
sibi ascuerunt, in sordis speciem redacta, articulorū
no los imposita adiuant: ischiadicis in fotus aut
malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.

C ij

DIOSCORIDIS

Derase gymnasiarum parietibus simulacrisq; sor-
des, calfaciunt: tubercula, quæ egrè ad coctionem
perducuntur, dissipant: desquamatis et vlceribus
senum prosunt.

Elæomeli.

Cap. XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex
quodam candice manat, oleum melle crassius, sa-
pore dulci. Bilem, cruditatesq; detrahit, sextario cū
vna aquæ hemina dato. Sed qui sumpsere, torpe-
scunt & viribus deficiuntur: quod minimè vereri
oportet, verum crebro excitare, ne veterino pressi
somnos capient. Fit & oleum è pinguitudine sur-
culorum oleæ optimum vetus, crassum, pingue, non
turbidum. Calfacit, priuatimq; caliginibus oculorū
illinitur: lepras, nervorumq; dolores illitum emēdāt.

Cicinum oleum.

Cap. XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Maturi
ricini, qua voles quantitate, torrido sole flac-
cescunt, & vuarum more instrati tantisper inso-
lantur, dum vestiens cortex fractus decidat. Caro
colligitur. & coniecta in pilam diligenter tunditur
postea in lebetem stanno illito, qui aquam habeat,
demittitur, subiectoq; igni feruescunt: & vbi insi-
tum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni
vase, innatans oleum concha tollitur, & recondi-
tur. Sed in Aegypto, vbi largior increbuit vsus, lon-
gè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos male
mandant, & accuratè molitos per sportulam tor-

culo exprimunt. Tum quidem ematurauerunt rini, cum continentibus orbiculis exiuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet. prodest sedis inflammationibus, vuluis conuersis atque praelusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum, potu aquam aluo extrahit, ventris animalia pellit.

Amygdalinum. Cap. XXXIII.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopium vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ, quæ ferbuerit, sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quam antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: vijs renum, calculosis, difficili vrine, suspiriosis, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit: maculas & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato, & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & furfures cum vino abstergit.

C ij

DIOSCORIDIS
Balatinum. Cap. XXXIII.

Simili modo fit balatinum oleum, quod repur-
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices
nigras. Aluum soluit, Stomacho aduersatur,
contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio
est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesami-
ni ratio. Fit etiam è nuce iuglandis oleum, quod caryi-
num vocant. Eandem vim habet quam balatinum.

Hyoscyaminum. Cap. XXXV.

Huoscyaminum sic fit: Semen candidum,
recens ac siccum tunditur, et calida asper-
gitur aqua, ut in amygdalino diximus.
dumq; insolatur, siccatae, quae sub manu sunt, partes
cum reliqua massa permisceantur: hoc in ante fieri
oportet dum nigrescat & grauiter oleat: mox pres-
sum atq; excolatum reconditur. Ad aurium dolores
efficax est, pessis miscetur, ad emolliendum utile. Fit
& è grano gnidio purgato & tuso. Vis ei aluum
soluere potu. Non secus cnicinum oleum temperatur:
cui facultas eadem est, quae facto è gnidio grano,
verum inualidior. Rhabbaninum è raphani semine
fieri solet, ceterorum more. Phthiriasis mala vale-
tudine contractas tollit, scabritias entis in facie emē-
dat. Ad obsonia vtuntur Aegyptij. Melathinum idē
quod rhabbaninum potest. Tritum sinapis semen,
& calida aqua madefactum, adiecto postea oleo
exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est, trās-
fert humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Myrteum. Cap. XXXVI.

Myrtei faciendi ratio hæc est: E myrto nigra syluestri, aut sativa, foliorum molliſſima quæq; tuſa premuntur: ſucco pares omphacini olei portiones adijciuntur, ſubiectisq; carbonibus inferueſcunt, donec concoquantur, innatans oleum deraditur. Sed longè facilius hæc compositio: Tendra folia contuſa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in ſole macerant: alij prius oleum inſpiſſant malicorio, cupreſſo, cypiro & iunco odorato. Efficacius eſt amarum guſtu & oleoſum, viride, tranſlucens, & olens myrtum. Adſtringit & indurat, ideo medicamenti miſcetur, quæ cicatricem obducunt: prodeſt vlceribus in capite manantibus, ambuſtis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, ſedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis ſudores compescit, & omnia quæ adſtrictionem inſpiſſationemq; deſiderant.

Laurinum. Cap. XXXVII.

Laurinum fit hoc modo: Lauri bacce cum mature ſunt, in aqua coquuntur: ſi quidem ex obducto cortice quandam pinguitudine reddunt, quæ manibus ſubacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo inſpiſſant, deinde tendra lauri folia concoquunt. alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit, alij ſtyracem & myrtum addunt.

C iiij

D I O S C O R I D I S

Optima laurus ad id latifolia & mōtana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quoque viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. Cap. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in laurino diximus. Hoc scabiem iumentorum canumq; sanat: vtilissimum pessis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinū fieri solet, quod refrigerat & adstringit.

Mastichinum. Cap. XXXIX.

Mastichinum è trita fit mastiche, quod contra omnia vulue mala efficax est: mediocriter calfacit, adstringit, & emollit, Aduersus prominentes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, et colorē nitidum facit. optimū in Chio insula componitur.

Vnguentorum compositio. Cap. XL.

DE ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidem ea in nonnullis corporum vitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt: in quorum probationibus consules

re nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in quibusdam planè observari non potest, propter ea quæ admiscetur odore cæteris prævalentia: ut in amaracino & crocino, telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conveniet.

Rosaceum. Cap. XLI.

Rosaceum sic fit: lunci odorati quinque libras & bessẽm tundito, & subactas aqua in viginti olei libris & quincuncẽ subinde mouendo, coquito, dumq; percolaueris, in olei libras viginti & quincuncẽ, adijcito rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, interdiu premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato vase, in craterem melle illitum recõdito. Cæterum rosas, quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demitto, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias vsque, quartasue persusiones insundens exprimere voles, secundarium fiet, tertiarium: & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si vero secundum infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle præmadefactis, agitando premito: & iterum, tertio aut quarto simili modo exprimens facito, totiesq; recentis roseis detractis unguibus im-

DIOSCORIDIS

mittito: fiet enim ita oleum multo validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detrahetis unguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo: Rosae quae selibram pondere aequant, in sextario olei diebus octo madescunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut asspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim adstringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet & mulcet, quae cacoethe vocantur: ulceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficax est, ad lacescita interanea & concitatas vulvas utilissimè subiicitur.

Elatinum.

Cap. XLIII.

FRacta elate tusa et scarificata, in labellum deiçitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent utriusque portiones, dein mūdo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionē respondet: aluum tamen non mollit.

Melinum hoc modo temperatur: Olei congius decem aque sextarijs admiscetur. Adijcitur elute pulmarum fracte quadrans, & iunci odorati vncia: que die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut vetusta tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decem dierum spatio operimentis involuunt, vt contineatur odoris suauitas, nec evanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Id vim refrigeratorem & adstringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & que serpūt, ac fursures, perniunculosq; effectum præbet: exulceratis vuluis infunditur, citatam vrinam sistit infusum, sudores cohibet, cōtra cantharidas, buprestim, pinorū erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

Oenanthini compositio.

Cap. XLV.

Oenanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturq; et cū biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Adstringit proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore oenanthem refert.

DIOSCORIDIS
Telini componendi ratio.

Cap. XLVI.

Foenigræci libræ quinque, calami libra una, cypiri libræ duæ, olei libris novē, septenis diebus macerantur, quotidie ter moventur, postea premuntur, & reponuntur. Alioqui pro calamo cardamomum substituunt, et cypiri loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato fœnumgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, omnibus vulvarum duritijs magnopere cōuenit, fœminis difficile parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem cōtraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenasmo subditum prædest, vlcera capitis manantia fursuresque expurgat, ambustis, et pernionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod nō uehementer fœnigræci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

Sampsuchini compositio.

Cap. XLVII.

Serpylli, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrij, frondium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quædam pro viribus ipsorum coniectatione, unâ tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui mordentium vires nō euincat: hæc post quatrimum exprimuntur. Denuò noua alia, simili mensura, &

æquali tempore macerata premuntur. ita enim validius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus vuluæ præclusiones cōuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, uluæ stragulus recreat, lumborum inguinumq; dolores lenit: sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. Laßtitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, vulsorumq; castaplasmata vtilissimè additur.

Ocimini compositio. Cap. XLVIII.

Ocimum oleum fit ut cyprinum. Ocimi folia decerpta librarum vndecim, & beßis pondo, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhausseris quallum, rursus parem olei modum fundito, exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perfusionis nō est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tãto temporis spatium maduerit, exprimitur, et oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter, aut quater madesfacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotonini compositio. Cap. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincurce, foliorū abrotoni libras octo die no

DIOSCORIDIS

Et uq; madefactas premito. Quod si in longum tempus oleum velis asseruari, eiectionis prioribus solijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritias præclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

Anethini compositio. Cap. L.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim et bessem, maceratas in oleo die una, manibus premito & recõdito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Sufinum. Cap. LI.

Sufinum, quod alij liliinum appellant, sic temperatur: Olei libræ nouem cum quincunce, calami libræ quinq; & quadrans, myrrhæ vnciæ quinq; permisto odorifero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq; , tres libræ cum semisse spissati olei assumuntur: mille lilia decerptis folijs, in latum, nõ tamen profundum, label lum demittuntur: iniectionum oleum, manibus melle perunctis agitata: die noctuq; conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressit fuerat, colo incerni oportet: (non enim, vt rosaceum, moram ro-

lerat: nam concalfactum feruet & computrescit:
 quare ſæpius decapulandum) vafa melle illinenda,
 tenuis ſal inſpargendus, & ſi qua ſordes vaſis fau-
 cibus hæſit, eximenda. Odoramentis iam expreſſis
 ex quaſillo in labellum trãſfuſis, rurſum olei prius
 odoribus imbuendi, quod primũ pondus æquet, &
 cardamomi tuſi drachmæ decem coniiciuntur. Hæc
 manibus ſcitè preſſa, interiecta breui mora expri-
 muntur: quod profluit, repurgatur. Tertiò eadẽ in-
 funduntur, adiecto cardamomo, & ſale, & mani-
 bus melle madefactis. Lõgè optimũ erit, quod prius
 exprimitur: ſecundum, quod ſequitur: tertium locũ
 ſibi vendicat, quod nouiſſimũ prodit: Denuò in mil-
 le lilia euulſis folijs expreſſum primò oleum inſun-
 ditur: tum eadem ratione proſequendum, idemq; fa-
 ciendum, vt prius, addito cardamomo, dein expreſ-
 ſo: & quò frequẽtius recentia lilia maceraueris, eò
 validius vnguentum efficies. Deniq; cum factum
 abundè videbitur, ſingulis compoſitionibus miſcere
 cõuenit myrrhæ quàm optimæ duas & ſeptuagin-
 ta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque
 & ſeptuaginta: croci vero & cinnamomi pares
 portiones tũduntur, et cribrate in lutrã cũ aqua de-
 mittuntur, expreſſũq; primò vnguentũ inſunditur,
 et paulò poſt exciũ iũtur vaſculis ſiccis, myrrha aut
 gũmi antea perfuſis, et croco, melle et aqua madesa-
 ctis. Eadẽ ſiũt in altera aut tertia expreſſione. Aliqui
 ſimplex ex balanino, aliõne oleo, et lilijs cõponunt.

DIOSCORIDIS

Optimum esse constat in Phoenice, mox Aegypto factum. Sed cum primis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit vulvae præclusiones, & collectiones, aperit, vtilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, surfuresq; emendat: vibices cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat, potum bilem per aluū extrahit, vrinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum.

Cap. LII.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ asspalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum vncis quinque assumuntur. Asspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur. quo exempto, calamus quinque libris, & besse adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac vino ueteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellū mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniiciuntur, quibidui spatium (vt in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulādum, si quidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vulvae duritias, præclusionesque sed capitis dolores facit.

Crocinum.

Cap. LIII.

Cum crocinum componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus,

deribus, & mensuris: cuius olei libras treis & semissem, croci vnciam vnā assumes, identidem quotidie moueto, & sexta die, quā hoc assiduo peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco parem olei modum adijcito, moue triduo, dein contuse myrrhæ atque cribrate drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitatum recondito. Alioqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione vtuntur. Optimum est, quod abundè crocum spirat, in medendi vsu expetitur. Proximum, quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit, quare persæpe phreniticis subuenit, persusum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, ulcera purgat, cōtra vuluæ duritias atque præclusiones, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere. Concoquit enim, emolliat, humectat, & permulcet: ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Hinc autem proportionē respondent butyrum, onychinum & styracinum: quæ & si nominibus distant, viribus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum. Cap. LIIII.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cœlestis tantundem cum semisse, cuius vna parte oleū diluitur, altera adijciendis odorametis admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quinque, & semisse, calami libris sex, & semisse, myrrhæ libra una, cardamomi libris tribus, & dodrante, olei libris no-

D

DIOSCORIDIS

uem, & vncijs quinque. Aspalathus tusus, et aqua affusus decoquitur in oleo donec conferuescat, myrrha autem vino vetere odorifero subacta, cōtusūq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur: & vbi efferbuerint sublato alieno, oleum percolatur. Cardamomum tussum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla, dum refrigerit, interpellatione. Posthæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprum vocant, sex & quadraginta libræ cū besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum simili modo prematur: & iterum aut tertio si quis velit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eliggi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addūt. Calfacit, emolli, ora venarum adaperit, vuluæ neruorumq; vitijs conuenit, pleuritici, fractisq; per se vel cerato immistum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinis opitulantur. item in acopa adiicitur.

Irii spissamentum. Cap. LV.

Spathæ quàm minutissimè contusæ sex libras cū besse, in tribus & septuaginta libris & quindecunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulā melle oblitā colato: ex eo aromatibus imbuto oleo,

irinum primò temperatur, iride ex oleo inspissato
 macerata, vt scripsimus. Sed alia est componēdi ra-
 tio: In olei septuaginta libris & quincunce, xylo-
 balsami (vt dictum est) contusi, libras quinque &
 sextantem excoquito, postea detractc xylobalsamo
 nouem libras & dextantem adijcito, & myrrhæ
 glebam vetere vino odorato perfusam, et in olei ita
 odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tuse
 iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenuè
 & vehementer dstringito. Quòd si vis validius fie-
 ri, par pòdus iterum ac tertio similiter maceratum
 exprimito. Lōgè optimum est, quod solam irin olet,
 quale est in Perga Pamphylie, et Elide Achaie na-
 tum. Vim habet calfactoriam atque emollientem,
 crustas adimit, sordida vltera & putrida purgat:
 confert sceminis vulue causarijs: item inflamma-
 tionibus eiusdem atq; præclussionibus, partus eijcit,
 hemorrhoidas recludit, contra aurium sonitus ex
 acceto, ruta et amaris nucibus prodest: diuturnis de-
 stillationibus, naribus illitum, & contra graueolen-
 tia earum vlcera, quas oxenas vocant, auxiliatur:
 aluum purgat cyathus epotus, facit ad ilei crucia-
 tus, vrinam mouet, difficileis vomitiones adiuvat,
 perunctis eo digitis & immisus, vel ijs quæ ad vo-
 mitum ciendū induntur: angine etiam illinitur, aut
 ex aqua mulsa gargarizatur: item contra arterie
 scabritiam. datur etiā ijs, qui cicutam, coriandrū,
 aut venena fungorum hauserunt.

DIOSCORIDIS
Gleucinum Cap. LVI.

Gleucinū absolutē constat orphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celticanardo, spatha, aspalatho, sertula campana, costo, & musto: circumdati interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, his in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vulnēq; vitij auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Amaracinum. Cap. LVII.

Amaracinum longē optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissimē ētis ē xylobalfamo, iunco odorato, et calamo factis, cōditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassie, carpo balsami et myrrhē odoribus. Aliqui, quō pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & vinū assumuntur: hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vrinam cit, putrilaginibus ac fistulis per quā vtile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, et tetra vlcera, quæ theriomata vocāt, rumpit: difficili vrinē, illit. i sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vulnē subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vulnē tutores discutit, vulneratis nervis, & muscu

lis confert, laneo centunculo modicè madefactum.
& impositum.

Megalinum. Cap. LVIII.

FActitabatur olim megalinum, sed nūc compo-
sio exoleuit, & prorsus oblitterata est. Cuius ad
historiæ complementum meminisse non fuit alienū.
Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exu-
perabat, hac tantum ratione differens. Quare leni-
ter mollit. Resina vnguentis, neque tutelæ neq; volu-
ptatis gratia a lycitur, sed coloris crassamētūq; cau-
sa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius
coquendæ ratio declarabitur, dum de resina disse-
remus.

Hedychroum. Cap. LIX.

Quod hedychroum vocāt, in Co fieri solet: eisde
preditum viribus & misturis, quibus ama-
racinum, sed suauius spirat.

Metropium. Cap. LX.

EIt in Aegypto vnguentum, quod metopion pa-
trio nomine appellatur, propter galbani mistio-
nem: nam lignum, in quo galbanum enascitur, me-
topion vocant. Constat amaris nucibus, omphacino
oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino,
myrrha, balsami semine, galbano & resina. Proba-
tur pingue, graui odore, quod magis cardamomum
& myrrham, quàm galbanum respiciat. Calfacit
vehementer, & adurit, atque extrahit, orā venarū
aperit, vlcera purgat, extrahitq; : ad precisos ner-

DIOSCORIDIS

uos, & muscalos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inseritur, horroribus, convulsisq; præsertim quibus cervix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur: sudores ciet, vulvæ spiracula recludit, & eiusdē duritias laxat: in summa, molliendi naturam habet.

Mendesium.

Cap. LXI.

MEndesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Staete.

Cap. LXII.

STaete vocatur pinguitudo recētis myrrhæ cum exigua aqua tusa, & organo expressa. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque unguentū per se facit, quod staete nominatur. Maximè probatur, quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio cōpos est viriū plurimarū. Vim calfactoriā myrrhæ et calidis unguentis respōdentē habet.

Cinnamominum.

Cap. LXIII.

Cinnamominum confit è balanino oleo, & xylo balsami, calami, iunci odorati spissamētis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suavitare conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamomum portione, mel ad cogenda omnia adiicitur. Laudatur non

acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquàm amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque vllam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amarâ, & calfacientem. Itaq; ora venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores et spiritus attrahit, caput aggrauat, cōtra vuluæ vitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimonia exolescit, & quadam emolliendi vis contrahitur. alioqui adurit, et præ omnibus crassis vneguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas & vlcera, quæ putredinis vitium senserūt. item ad hernias humidiores, carbunculos, febrium horrores, tremores, gangrenasq; cum cardamomo: aduersus serpētium morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum. Cap. LXIIII.

Ratio nardini faciundi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunque autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamenti gratia adiicitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam

D iiij

DIOSCORIDIS

simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo
& nardo.

Malabathrinum. Cap. LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini habet,
insuper myrrhæ plusculum additur: qua de
causa calfacit, crocino aut amaracino viribus re-
spondens.

Iasminum. Cap. LXVI.

Apuđ Persas fit, quod iasminū cognominatur,
ex albis floribus vlolæ: quorum sextās in Ita-
licum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut
in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas
inter epulandum vsurpatur odoris causa. Nam toti
corpori cōuenit, præsertim cū in balneas descensum
est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionē,
laxationemq; desiderāt: grauius enim spirat, quā
ut libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. Cap. LXVII.

MYrrha lacryma est arboris, quæ in Arabia
gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cu-
ius vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes,
alia circum caudicem concrescit. Dicitur ex his ali-
qua pediasimos præpinguis, qua expressa, stacte
emittitur. Alia gabirea pinguisima, leto & pingui
solo nascens, ea copiosam sudat stacten. Omnium
prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto co-
gnomine à loco, in quo prouenit: splendens, subuiri-
dis, ac mordēs. Quinetiam legitur tenuis quedam,

quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mol-
 lis, verum odore grauiuscula, apicis nascens. Alia
 caucalis cognominatur, præter modum exoleta, ni-
 gra, & retorrída. Omnium deterrima, quæ ergasti-
 ma dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris,
 ad gummi imaginem vergens, & viribus eius pro-
 xima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pa-
 stilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è sic-
 cioribus haudquaquam pingues, & inodorati: mi-
 nus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pa-
 stillos digerebatur. adulteratur macerato gummi
 aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recēs,
 squallore obsita, leuis, vndique concolor, quæ confrā-
 cta venas vnguium modo candidas & leues osten-
 dat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciēs:
 superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picei.
 Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccāt,
 adstringit, vuluam emollit, & præclusam aperit:
 menses & partus celeriter extrahit, cū absynthio,
 lupinorum cremore, vel succo rutæ admota: tuber-
 culo fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnoea, in
 laterum pectorisq; doloribus, in alui profluvio, &
 dysenteria, horrores discutit, duabus horis ante fe-
 brium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pi-
 pere & aqua: subdita linguae liquataq; scabritiem
 arteria expolit: obtusam vocem expedit, ventris ti-
 neas enecat, contra grauem oris halitum mandis-
 tur, & aduersus alarum tædia cum liquido alumine

DIOSCORIDIS

ne illinitur: gingivas & dentes stabilit, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus ac ossibus nudatis, peruncta cum cochlea carnibus. Item purulentis auribus inflāmatīsq; cum meconio, castorio, & glaucio: ad varos autem cum cassia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat: diurnas destillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem lanigat. Fit ē myrrha, perinde atq; thure, fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniēs. Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est, quæ myrrham odoris suauitate representat. Vis ei calfactoria inest, emollit discutitq; suffimentis commodissimè inseritur.

Styrax.

Cap. LXVIII.

Styrax lacryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur & sordescens, flauus, resinosus, albicantibus grumis, quàm plurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum mollietur, melleum liquorem reddit: qualis ē Cataballis, Pisidia, & Ciliciæ deuehitur. Deterior niger, fursufrosus, friabilis, canoque situ obductus. Cæterum lacryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrhæ emula: verum perpauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, &

λεωρόν
id est, pin-
guis.

iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis foliis cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos expriment, venundantq; styracem hunc { quoniam in Adiectũ vermiculorum speciem contrahatur } scolecicem ab inter cognominant, tanquam syncerum imperiti approprete. bant, nō animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: si quidem acer admodum est, qui ad ulte rationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, rauedini, grauedini, & interceptæ voci. vuluæ præclusæ duritiæ laboranti conuenit, cit menses potu appositūque, aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopis que. Adoletur autem & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauatq; & soporem adfert.

Bdellium. Cap. LXXIX.

Bdellium alijs bolchon appellant, alijs madelcon: Lacryma est * saracenicæ arboris. Probatur * Vox gustu amarum, translucidum, taurini glutinis adulteri in morem intus pingue, liquefcens facile, ligni na Marac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile, cello.

DIOSCORIDIS

Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, vberioribus glebulis in offas cōuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiam à Petra opido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humiditasque hernias discutit, cum ieiuna salua dilutum: vuluæ spiracula laxat appositum & suffitum, & partus humiditatesque omnes extrahit, calculos potu comminuit, vrinam mouet, tussientibus & à serpente percussis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inseritur, quæ contra duritias & nervorum nodos profunt: contusum resolvitur affuso vino, aut aqua calida.

Thus. Cap. LXX.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicium vero * fuluescit, & colore liuet, sed rotundum induit rugas id striâ factitant: nam in quadrangulares formas differt, subru sectum fœtilibus versant, donec rotunditatem confum est. trahat: verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum

locum habet * Arabicū, & in Smilo nascens, quod * ὁ Ἀραβ^{icus}
 aliqui copiscum vocant, minus multo & fuluius. Blas καὶ
 Est & genus aliud, cui amomite cognomē est, alio= δὲν σμίλω
 qui candidum: quod dum mollitur, mastiches more id est, A=
 digitis cedit. Adulteratur * in itinere, pini resina et rabias di=
 gummi, quod facile deprehendi potest: si quidem suffectum, et
 fitum gummi flammam non ei aculatur, & resina quod in
 in fumum euanescit, thus vero statim ardet: idem Smilo
 maleficium odor prodit. Ad calfaciendū & adstrin= prouenit.
 gedum pollet, oculorum caliginem discutit, caua vl= * μεθε-
 cera complet, et ad cicatricem perducit, cruenta vul= δὲν ὀφθαλμοῦ,
 nera glutinat, infranatq; cunctas sanguinis eru= id est ar=
 ptiones, etiamsi cerebri membravis effluat: vlcera, tificiosē
 que cacoethe vocantur, & sedis & reliquarū par confor=
 tium permulcet tritum cum eo & lacte linamen= matum.
 tum, formicātes verrucas inter initia, impetiginesq; Sic Ma=
 ex aceto & pice illitum, tollit: ambusta igni, per= re.
 nionesq; cum suillo adipe aut anserino, & vlcera in
 capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: pa=
 ronychys cum melle, auribus fractis cum pice, me=
 detur: ad reliquos aurium dolores cum dulci vino in=
 funditur, inflammata à partu mammae cum cimo=
 lia & rosaceo magna vtilitate perunguntur, addi=
 tur ad arteriae viscerumq; medicamēta, prodest san=
 guinis excreationi potum: sed in secunda valetudine
 haustum insaniam mouet, & largius cum vino po=
 tum interficit. In fictili mundo thus crematur, fla=
 grante glebula succensum à lucerna, donec exura=

DIOSCORIDIS

tur post perfectam vstionem operire oportet, vsque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, vt in eius mentione mox ostēdemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo viuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporēque emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. Cap. LXXI.

PRefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, leuis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est, si quidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur. Thuris modo vritur, et vis eadem quæ thuri, sed validior adstringentiorq;. Quare potu cruentis excreationibus, vuluis fluxione laborantibus in pessa confert, ad cicatrices oculorum, et caua sordesq; efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Mannathuris. Cap. LXXII.

MAnna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris cōtusi adulterant: sed hæc igneprehenduntur. Neque

enim æquè suffitu aeris vaporem, sed fuliginosum
& impurum expuit, & permistum suaueolentie
halitus virus habet.

Thuris fuligo, Cap. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis
accensas singulatim thuris glebas, in nouam fi-
tilem ollam concavam imposito: & æreo vase in
medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito:
alteram admoeto, ex altera eius parte aut vtraq;
subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis,
quò facilius perspici queat, si vrantur: & quâ lo-
cus capax fuerit, glebularum alias supponito, et antea
quàm prorsus prior gleba restinguatur, aliam im-
ponito, donec sufficientem fuliginem videaris coegis-
se. Continuo tamen externe æramenti partes spon-
gia, aqua frigida, madesacta, abstergatur: ita enim
temperato æris feruore, fuligo omnis inhaerebit: quæ
alioqui per leuitatem decidua, thuris cineribus admi-
scetur. Dersa itaque fuligine, cinis cremati thuris
seorsum subtrahendus est. Idem opus, quoad satisfac-
tum tibi videtur, obeundum. Oculorum inflamma-
tiones mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat,
cava explet, carcinosmata sistit. Simili modo è myr-
rrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, fuligo exci-
pitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. Cap. LXXIIII.

Pinus & Picea generi e'dem adscribuntur, sed
quandam flagitant specierum distinctionem,

DIOSCORIDIS

arbores vulgò cognita : quarum cortex adstringit,
prodest tritus & illitus intertrigini, vlceribus sum-
mum corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma
argenti & manna. Vlcera delicatulorem acrimo-
niam recusantium, cerato myrtino exceptus, ad ci-
catricem perducit: tritus cum sutorio atramento ser-
pentia cohibet, suffitu partus & secundas eicit, po-
tus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita
& illita inflammationes leniunt, vulnera ab in-
flammatione vindicant, trita autem & decocta
aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent:
hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut
mulsa pota. Pinæ nucis cortex & folia potu idem
prestant. Teda earum particulatim secta si in ace-
to coquatur, & decocto dens colluatur, dolores le-
uat. Ex his etiam fit spatha acoporum pessorum-
que compositionibus idonea. Quinetiam earum
crematarum fuligo ad librarij atramenti confe-
ctionem excipitur: ea circumlutionibus efficacissi-
me imponitur, quibus palpebras ornant, coloré-
que mentiuntur, callibrephara Græci vocant: arro-
sis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, &
collacrymationibus opitulatur. Pityides appellan-
tur pinorum piceæq; fructus, qui in conis inueniun-
tur, vim adstrictoriam habent, et aliquantū excale-
facientē tussi & pectoris vitijs auxiliantur, per se,
aut ex melle sumpti. Nuces pinæ cū stroboli repur-
gate māduntur, aut cū passo aut cucumeris semine
bibuntur,

Pityides.

bibuntur, vrinam cient: acrimonias in renibus & vesica hebetant, Stomachi rofiones leniunt: data & cū portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerptæ in passo franguntur, & decoctæ vetustæ tussi acta bitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus.

Cap. LXXV.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest adstringendi: semini: emini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liguamentū autem ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, et vbi abunde cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua denuò coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciæ & hypocistidis vicem representat. Idem facit succus è tritis folijs. Decoctum fotu caua explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomias arcet, vrinam pellit, motus dentium collutione stabilis. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, & quod prodest, cum quid adstringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lē Mastix tiscina cognominatur, Mastix & ab aliquibus, officinis.

E

DIOSCORIDIS

mastiche. Pota utilis est sanguinem reijcientibus,
 & tussi veteri: stomacho auxiliatur, sed ructum
 mouet. Additur in dentifricia & illitiones faciei, ad
 nitorem cuti conciliandum. Palpebras oculis incom=
 modas replicat, manducata halitum oris commen=
 dat, gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in
 insula Chio prouenit. Prefertur Σ nitedule mo=
 Insertũ do Σ resplendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ
 ab inter similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem
 prete. edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris
 resineq; pineæ nucis mistura.

Terebinthus. Cap. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, &
 semen, & cortex adstringunt, & ad eadẽ ad=
 que lentiscus conueniunt, simili parata modo sum=
 ptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersa=
 tur: excalfacit, urinam mouet, venerem excitat, cõ=
 tra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibi=
 tur. Resina eius ex Arabia Petræa defertur. Præue=
 nit etiam in Iudæa, Syria, Cyprio, Aphrica & Cy=
 cladibus insulis: sed præualeat candida, perlucida, vi=
 treo colore, & in ceruleum vergente, odorata, tere=
 binthum olens. * Terebinthina resinas omneis an=
 * Offici tecedit. proxima lentiscina, & è pinu, & abiete:
 nis, Ter= has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Na=
 pentina. tura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurga=
 re. Tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eclegmate
 ex melle, vitia pectoris expurgant, urinam cient,

crūda concoquunt, ventrem emolliunt, palpebras commodissimè replicant, lepras tollunt, cum erugine ac sutorio atramento, nitroq; auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritis genitalium vtilis: malagmatis, acopisq; admiscetur. Laterum doloribus per se, illitu, & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. Cap. LXXVII.

Liquida resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet, atq; olim à Colophonē petebatur: hinc Colophonie sibi cognomētum vendicauit. A Gallia quoq; subalpina: quā vernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linetu, & per se, magnopere prodest iussu veteri. Colore inter se distant: si quidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ vero aridarum generi adscribuntur, quedam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrida, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores à Pitiusa insula deferuntur, quæ secundū Hispaniā sita est. Sed quæ è picea, nucibus, pineis & cupressos manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiūtur. Veruntamen eorundem gratia, quorum &

DIOSCORIDIS

illæ sumi solent. Lentiscina terebinthina respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur: itaq; resinæ congius, in duobus aquæ pluviæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida reddatur, ac digitis cedat. Cæterum ubi refrixit, in fictile nõ picatum, quod aconitum vocant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò feculentæ sordes excernatur. Vrantur quoq; sine aqua, primùm lento igne & ubi coire cœperunt, maior carbonum strues superponitur, et triduo citra intermissionem discoquuntur usq; dum antedictas naturæ suæ notas exuerint: mox, ut dictum est, reponuntur. Aridas vnius diei spatium decoxisse satis est. Vstæ odoratis malagmatis, et acopis, & vnguentorum colorationibus magnopere vtilis sunt. Et resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circunlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. Prodest glabris genis, collacrymationibus, erosisq; oculorum angulis. ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. Cap. LXXVIII.

Pix liquida, quam alij conum vocant, è pinguisima pini piceaq; lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, leuis. Contra venena, phthisin, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores, qui difficile exc

tuſſiuntur, efficax eſt, eclegmate cyathi menſura
cum melle dato. Tonsillarum & vna inflammatio
nes, anginaq; vtiliter perunguntur: purulentis auribus
infunditur cum roſaceo, & illinitur cum trito
ſale ſerpentium morſibus: adiecta verò pari cera
ſcabros vngues extricat, impetiginesq; emendat:
vulua duritias, ac ſedis tubercula diſcutit: cum fa
rinaq; hordeacea & pueri impubis vrina decocta,
ſtrummas rumpit: cohibet vlcera, quæ ſerpunt, cum
pineo cortice, aut ſulfure, aut furfuribus illita. Cæ
terum cum thuris manna & cerato profundos vl
cerum ſinus conglutinat, rimis ſedis & pedum, ma
gno auxilio illinitur: vlcera replet, & cū melle pur
gat: quin & cum vna paſſa, & melle carbūculos,
et putrida vlcera emarginat, diſrūpitq;: erodētibus
medicamētis, quas ſeptas vocant, probæ iſciſcitur.

Picinum oleum. Cap. LXXIX.

E Pice fit quod piſſileon appellant, ſeparato li
quore aquoſo, qui ſupernatat pici, ſicut ſerum
lacti, Nam expaſa, quand u pix coquitur, ſupra Hæc de
cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; halitu ſunt,
eius exprimuntur in vas. * Quas pix liquida præ
bet vtilitates alopecias capillo replet cum farina καὶ τὸ
hordeacea illitum, quibus & liquida pix medetur, αὐτὴν
iumentorum vlcera ſcabiēq; emendat. τὰ ἐφ' ὅ
σον αὐτῇ
χεῖνον
ποῖσα ἐ
ψηται.

Fuligo liquidæ picis. Cap. LXXX.

E It hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna
noua, quæ ellychnium habeat, nonnihil picis

E iij

DIOSCORIDIS

incendito, lucernamq; fictilis vase in clibani specie conformato, superius in angustam fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisq;. Vsi est ad pigmenta, quibus palpebras linunt & venustant, & ad circunlitiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososq; oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

Pix arida. Cap. LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam. quo in genere quedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probat purior, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pannosq; discutit, vlcera replet, vulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa. Cap. LXXXII.

Zopissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerat a sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. Cap. LXXXIII.

Bitumen Indicum ceteris antepositur. Cuius probatio est, ut purpure modo splendeat, sitq;

ponderosum, ac validum odorem vibret. Nigrū autem & sordidū, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sidone. Liquidum inuenitur in Acragantino Siciliæ, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinatur, qui id Siciliū oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. Cap. LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurū, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. Cap. LXXXV.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in eam transilient. Ad suffusiones oculorum, & albugines vtilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vulvarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, impositu: emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatæ lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit, tuſſim veterem & anhelitum adiuvat, serpentium morſibus, coxendicum laterumq; doloribus auxiliatur, datur cœliacis in catapotio deuorandum, cum aceto potum discutit sanguinem concretum, dysen-

DIOSCORIDIS

tericis cum ptisana liquatum infunditur, destillas-
tionibus suffitione medetur, mitigat dentium dolo-
res oblitum, ceterum pilos incommodos siccum re-
plicat, specillo impositum: concalfactum autem, et
cum farina hordeacea, nitro & cera illitum poda-
gris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest.
Pis asphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si mi-
sceantur, potest.

Cupressus. Cap. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & adstringit. Cuius fo-
lia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ
rheumatismis, & urinae difficultati auxiliantur.
Pilulae autem ex vino tuscæ in dysenteria, alui flu-
xione, tussi, et orthopnoea, aut si reijciatur sanguis,
convenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdè
præbet effectus tuscæ cum fico duritias emolliunt, na-
riumq; polypo medentur: in aceto coctæ, & cum la-
pinis detritæ scabros ungues eijciunt, hernias inte-
stinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Fo-
lia eadem præstant. Pilulae cum arboris coma suffi-
tæ, culices abigere existimantur. Folia trita & im-
posita, vulnera conglutinant: sanguinem suppri-
munt, capillum ex aceto tingunt, illinuntur per se,
aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus, quæ ser-
punt, carbunculis & oculorum inflammationibus,
admota cum cerato stomachum corroborant.

Iuniperus. Cap. LXXXVII.

Iuniperi genera duo: altera maior, altera mi-

nor, vtraque acris est. Excalfacit, & urinam mo-
net, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnulla nu-
cis iuglandis magnitudine, nonnunquam grandesce-
re, alie & nucem Ponticam equare inueniuntur: ro- * Auella
tunde, odoratae, in mādendo dulces, sub amara, quae nam in-
arceuthides etiam, id est, baccae iuniperi nominatur, tellige.
Modicè calfaciunt, & adstringunt: Stomacho uti-
les contra pectoris vitia, tuſſim, inflationes, tormi-
na, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: vri-
nam cient, vnde ruptis, conuulsis, & vuluæ stran-
gulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent: ideo
tam ipsa, quàm eorum succus, ex vino contra vipe-
rarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis
cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuo-
rata interficiunt.

Herba Sabina. Cap. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cupresso
similis, spinis horridior, grauius olens, acris &
feruēs: arbor est coactae breuitatis, quae sese magis
in latitudinē fundit: huius folijs nonnulli pro suffitu
vtuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusq;
folia nomas sistūt, collectiones illitu mitigant, et cū
melle nigritias sordesq; repurgant, carbūculos cū vi-
no pota rūpunt, sanguinē per urinā eliciunt, partus
apposita extrahunt, et suffitu idē praestant, vngue-
tis calfacientibus imiscetur, et priuatim gleucino.

Cedrus. Cap. LXXXIX
Cedrus arbor magna est, ex qua picem colli-

DIOSCORIDIS

gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris: quæ dū Cedrus effunditur, guttatim non dissipata coit, Cui ea vis mortuo= inest vt defuncta corpora conseruet, & viuientiarum vi= corrumpat: qua ex causa mortuorum vitam aliqui ta dicta. appellauere. Vestimenta quoque, & pelles eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit: magni ad ocularia medicamenta vsus, quippe illita oculis claritatem affert, albugines cicatricesq; detergit: instillata autem cum aceto vermes aurium necat, cum hyssopi decocto infusa sonitus sibilosq; sedet, canis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. Idem facit cum ex aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali abortiuum fieri constat: anginae ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est, lendes pediculosq; illitu enecat, cerasæ morsibus cum sale imposita subuenit, contra hausta leporis marini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat: vermes & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Fit & oleum, à cedria separatum, dum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus: privatim vehementer perunctum scabiem quadrupedum, canum, boumq; persanat: inhaerentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura accepe-

runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguria: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem, quam picea fuligo vim præbet.

Laurus.

Cap. XC.

Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infusus additum, vuluæ & vesicæ vitæ cōuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparum apiumque ictibus opitulantur, eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri bacca magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate trita cum melle vel passo prosunt tabi, orthopnoeæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, vitiliginem emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori, et grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur, quæ nervorum lassitudines reficiunt, acopa vocantur: et ad vnguenta, quæ calfaciunt, & discutiunt. Cortex radice calculos rumpit, partus necat, hepaticis

DIOSCORIDIS

prodest, tribus oholis in vino odorato potus.

Platanus

Cap. XCI.

TEnerrima platani folia in vino decocta, more illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in vino potæ, serpentium morsibus auxiliantur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant insidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus.

Cap. XCII.

FRaxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus.

Cap. XCIII.

Potus albæ populi cortex vncie vnius pondere, ischiadicis ac vrinæ stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum vino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilule, quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt corticem albæ populi, & nigre particulatim cæsum, & sulcis stercoreatis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigre folia cum aceto illita, magna vtilitate podagris.

cis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quæ in malagmatæ additur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lacrymam populorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, dum De ortu vari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij electri chrysophorum. Ad attritu iucundum odorem spirat, multa li & aurum colore imitatur: tritum potumq; stomachi ventrisq; fluxiones sistit. 3. & 4. br. vlt. c. apud Plin.

Macer.

Cap. XCIII.

Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam adstringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

Ulmus.

Cap. XCV.

Vlmi & folia & cortex et rami, vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur. nam in lori more flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua frigida vnciatim potus, pituitas trahit: fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis aut radicis foveantur. Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciemq; splendidiorum præstat. Qui dum siccat, in animalia abit, quæ culicū formā gerūt. Folia cū tenerescunt cocta, olerū more ad obsonia vsurpantur.

Ex caudicibus lignisq; veteribus caries conge-

DIOSCORIDIS

ritur, quæ farina modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisq; imposita illinatur.

Harundo. Cap. XC VII.

IN harundinum genere quædam nastos, id est, farctior, vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia foemina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cinctâ geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud amnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula, aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborūq; dolores cum aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur, panicula lanugo si aures intrauerit, exsurdât. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus. Cap. XC VIII.

PAPYRUS, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vtilitatis, ad laxandas fistulas: madesacta lino inuoluitur, vsq; dum in aruerit: constricta enim atq; immissa in hiatum, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaq; Aesc

gyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes,
& mansam expuunt. Ipsius radicibus pro ligno uti-
tur. Crematae papyri cinis depascentia vlcera cum
omnium partium, tum oris maxime, cohibet: verum
melius id combusta charta prestat.

Myrica. Cap. XCIX.

MYrica seu tamarix arbor vulgo cognita Officinis
est, cum apud pigras & stagnantes Tamari-
aquas enascatur, fructum quasi florem secus.
ferens compage muscosum. Aegyptus Syriaq; alte-
ram gignunt mitiorem, syluestri cetera similem.
Fructum parit gallae proximum, inaequaliter ad-
stringentem gustu: quo conuenienter utimur vice
gallae in medicaminibus oculorum orisq;. Datur crue-
tae excreationi in potu, & coeliacis, & contra pro-
fluvia foeminarum, regium morbum, & phalangio-
rum morsus: illitus tumores inhihet. Cortex in eof-
dem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino
potum, lienem absuntit: ad dolorem dentium in col-
lutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vulua
opportunis indesessioibus, phthiriasi lendibusq; cir-
cumsusum prodest, abundantiam foeminarum sistit
impositus arboris cinis, potorios calices e caudice lie-
nosis moluuntur, quo datus in his potus proficiat.

Erica. Cap. C.

Erica * fruticosa arbor, myricae similis, longè * Plin.
minor: cuius flore apes reprobum mel efficiunt, fruticem
tam flos quam coma serpentium ielibus illitis in datur. dicit.

DIOSCORIDIS

Acacalis. Cap. CI.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadantenus similis: cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conveniunt.

Rhamnus. Cap. CII.

Rhamnus fruticat in sepibus ramos ferens re-
ctos et aculeos in acutæ spinæ modum, folijs
parvis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei
genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq;
folijs constat, & quadantenus rubentibus: cuius
rami quoniam ferè cubitorum longitudinem implèt,
spinosiore quidem, sed infirmioribus minusq; rigens
tibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenue,

* *zome's* follicularij specie, * verticillo similem. Omnium fo-
liis igni sacro, & serpentibus ulceribus, efficaciter
ad id est illinuntur. Fama est ramos huius valvis fenestrisue
asphodeli impositos, ueneficia depellere.

li fructui
similem.

Halimus. Cap. CIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis
rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus.
nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquun-
tur ciborum gratia. Radix, convulsa, rupta, tormi-
naq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsa po-
ta: eadem lactis ubertatem facit.

Paliurus. Cap. CIIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, dur-
rus, cuius semen pingue & fuliginosum in-
venitur:

uenitur: quod potum tussi opitulatur, vesica calculos comminuit. serpētium ictibus aduersatur. Folia & radix adstrictoriam vim habent: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omneis discutit, trita et imposita.

Acuta spina.

Cap. C V.

Acuta spina, quam pyrinam aut pityanthen aliqui vocant, arbor est pyraestro similis, spinarum nosa valde & minor, baccas profert myrti, plenas, Berberis rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, alto descendente. Huius baccae potu aut cibo, alui profluvium, & abundantiam sceminarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut sensim feriatur, aut perungatur.

Rubus canis.

Cap. C VI.

Rutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo olivæ simili, qui per maturitatem fulvescit, & flocculos intus continet. Fructus exceptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruesfacti enim in vino, mox poti, arteriam infestant.

Ligustrum.

Cap. C VII.

Ligustrum arbor est olivæ folijs circum ramos similibus, latioribus, mollioribus, & canna.

DIOSCORIDIS

colore viridioribus: flore candidi, muscoso, odorato
semine scambuci, nigro. Optimum nascitur in Cae-
nope & Ascalone. Folia adstrictoriam vim habet:
quare commanducata vlceribus oris medentur, illis
ta feruidis inflammationibus, carbunculisq; pro-
sunt, decocto eorundem igni ambusta fouentur, ca-
pillum rufant trita folia, quæ in radiculæ succo ma-
luerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorẽ se-
dat. Cyprinum oleum, quod ex eo fit odoratum, ex-
calfacit, emollitq; nervos. si quæ feruētī natura præ-
dita sint, assumat.

Tilia. Cap. CVIII.

xelv
Tilia arbor est ligustri magnitudine, folijs o-
lee, nigrioribus & latioribus, fructu & lentis-
sci, nigro, subdulci, racematim coerente, asperis
nascitur. Huius folia adstringunt: ad eadem vtilia
ad quæ oleaster, cum adstrictione est opus: maxi-
mè ad oris vlcera, commanducata, aut si decocto
colluantur: pota urinam ac menses cient.

Cistus. Cap. CIX.

* Vox
ex Plinio
reposita.
Cistus, quem aliqui citharon, aut cissarõ vocat,
ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus,
saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsu-
tis. flos & masculo vt mali punice, femina albet.
Vis adstringens: unde flores in vino austero bis in
die poti, prosunt dysentericis, & nomas per se illiti
cohibent, vetustati vlcerũ, & igni ambustis cū cē-
rato medentur. Hypocistis, orobethron, aut cytinus

à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliquaq; vt in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, verû aliquantò magis siccatur, & adstringit. Prodest dysentericis, cœliacis, sanguinem excreantibus: fœminarû profluuiò et pota et indita.

Ladanum.

Cap. CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempore quidam contrahunt pingue. Foliorum vis adstringens, ac eosdem, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod ladanû dicitur. Siquidem cum cisti frondes passuntur capræ, hirciq; pinguitudinem cõspiciuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adherescentem reportant: quam depectentes incolæ, colantesq; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij uerò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorẽ abstergunt, conglomerantq; in ladanû. Maximè probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinosum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uerò Libycumq; vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit, capillum fluentem continet, addito vino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit, cum vino illi-

Colligen-
di lada-
ni mo-
dus.

F ii

DIOSCORIDIS

tum : medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum : suffitu secundas eijcit, pectus immistum uulue duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimq; finiunt, & malagmata vtiliter inseritur: alium sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet.

Ebenus.

Cap. CXI.

Ebenus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus læuore: cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque leniter adstringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modice fuluis, ite frequentibus maculis: ceterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cõsimilia pro ebenuo veneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas asculas resoluntur nihil mordacitatis in gustu, nec redolentie in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres distillationes pustulasq; mirum in modum pollet. si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentæue vino Chiodie noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquaq; eundem modum peragunt. Alij pro vino aqua utuntur. Vritur in fictili

nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi
vsti modo, & ita siccis scabrisque lippitudinibus
conducit.

Rosa.

Cap. CXII.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca mula
to magis. Succus recentibus folijs exprimi
tur, defectis forfice vnguibus (sic appellantur can-
dide foliorum partes) reliquum in pila premi & te
ri debet in vmbra, donec cogatur, & ita ad oculo-
rum circunditiones recondi. Siccantur etiamnum
folia rosarum, continuo versata, ne muceant, neue
situs in ijs insideat. Aridis rosis & in vino decoctis
expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium,
oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini ac vul-
ue, penna illitus aut infusus. Eadem sine expressio-
ne tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis
stomachi vitijs, igni sacro illi prodest: siccis ac tri-
tis semina asperguntur. Misceri solent vulnerarijs
antidotis, atque compositionibus, quas antheras vo-
cant. Folia vruntur in calliblephara. Flos, qui in me-
dijs rosis inuenitur, siccatus, gingivarum fluxioni-
bus efficaciter inspergitur. Capita pota citam al-
uum, & cruentas reiectiones sistunt.

Quid vn-
guis in
rosa.

Rosei pastilli

Cap. CXIII.

Pastilli, quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur: Rosarum viridium, quæ nul-
lo antea humore madefactæ extabuerint, dra-
chmæ quadragintæ, Indice nardi drachmæ de-

F iij

DIOSCORIDIS

cem, myrrha drachmæ sex, trita digeruntur in pa-
stillos, qui trium obolorum pondus æquent: sicca-
tiq; in umbra, in fictili non picato, atque obturato
reconduntur. Alij adiiciunt costi drachmas duas, iri-
dis Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle
mifcent. Mulieribus monilium uice collo circunda-
to ufui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus.
Tritis etiam utuntur ad illitiones et diapaſmata,
que fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis in-
areſcant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium. Cap. CXIIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan uocant, ar-
bor eſt ſpinoſa, ramis trium cubitorum, aut
longioribus: folijs buxi, denſis: fructu piperis, ni-
gro, leui, amaro, denſoq;: cortice pallido, non diſſi-
mili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis,
lignofis. Naſcitur plurimum in Cappadocia, Ly-
cia, & plerifque alijs locis. Aſpera loca amat. Suc-
ci extrahendi ratio hæc eſt: Rami cum radiculis
tuſi, & antè per multos dies macerati, coquuntur,
tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis craſ-
ſitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta deco-
ctioni amurcæ, aut abſynthij ſucco, aut felle bubu-
lo. Innatans ſpuma inter coquendum exempta, ocu-
lorum medicamentis additur: reliquo ad alia utun-
tur. Simili modo fit lycium, ſemine expreſſo & in-
ſolato. Optimum, quod uri poteſt, reſtinctumq; ru-
bentem ſpumam oſtendit, glebis extrinſecus ni-

gris, intus, cum flegoris, rufis, & odore minimè vi- * Ita ex
roso, cum amaritudine adstringens, crocino colore Plinio.
(cuiusmodi Indicum est) ceteris præstantius atque
efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum
discutit, genarum scabiem, pruritus, veteresq; flu-
xiones sanat: facit ad purulentas aureis, exulcera-
tas gingivas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis ri-
mas, attritusq; illitum: coeliacis, dysentericis, potiù
inditumq; conuenit: datur sanguinem excreantibus
& tussi, ex aqua: contra rabiosi canis morsus in
catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos
facit pilos: reduujs, ulceribus, quæ serpunt aut pu-
trent, medetur: fœminarum profluvia appositum
sistit: rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice. * Videtur
catapotij deuoratum, auxiliatur. * Tradunt Indi- tur Mar-
cum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato: ea cello quæ
spinarum generi adscribitur, ramos rectos habens hinc se-
ternum cubitorum longitudine, maioresue, rubo cras- quuntur,
siores, à radice numerosos. Fractus cortex rubescit, notha.
folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur. * Nō est
lienis inflammationibus & regio morbo mederi, genuina
& fœminarum purgationes elicere. Aßenerant officinae
etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare. rii Aca-
Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurga- cia, quã-
re: venenis quoque auxilio esse. uis eadē

Acacia.

Cap.

CXV.

vi ac na

A Cacia in Aegypto nascitur spina instar ar- tura præ-
boris, fruticosa, non se in rectum attollens. dita.

F iiij

DIOSCORIDIS

Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in umbra: niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum ulcera quæ serpunt, pernioles, pterygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimat, mensium abundantiam sistit, prociduum vuluam cohibet, citam alui suppressionem, aut potus aut subter inditus: capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Spinæ decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum vero ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoq; prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habens rutæ. Semē lenticulæ minus fert

autumno, in loculis connexis, ternum quaternumue
capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior,
& ocularibus medicamentis inutilis.

Vitex.

Cap. CXVI

Vitex siue lygos frutex est in arborem asur- Barba
gens, nascitur in fluminum ripis, asperusq; lo- ris a
cis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fructu gnus ca-
peruicaces: folia oliue, sed molliora. Duo genera stus.
eius, vna harum album florem mittit cum purpu-
reo, altera tantum purpureum & semen, ut piper.
Excalfactorias vires habet, & adstrictorias. Se-
men eius potum venenatis ictibus, aqua, quae cutem
subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet,
drachma pondere in vino potum: genituram exol-
uit, caput tentat & soporem affert. Decoctum her-
bae & seminis in defensione, mulieribus vuluae malo
opportunis opitulatur, item inflammationibus: pur-
gationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffi-
tu vel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum,
instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo &
phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant ve-
nenata: illita quoque serpentium morsibus auxi-
liantur: testium duritias cum butyro & folijs vi-
tium emolliunt: rimas sedis semen cum aqua illi-
tum mitigat, & cum folijs medetur luxatis, vulne Nominu
ribusq;. Virgam qui manu teneat dum iter facit, agni &
negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicas lygi r. a-
eastum, vocant Graeci, quoniam matronae in ihes- tio.

DIOSCORIDIS

mophorijs Atheniensium castitatem custodientes,
folijs huius cubitus sibi sternunt, & lygon quasi
vimen, propter inuictam ferè ramorum flexilita-
tem.

Salix.

Cap. CXVII.

Salix vulgò nota est: cuius semen, folia, cor-
tex & succus spißandi vim habent. Trita
folia cum exiguo pipere et uino pota, ileosis
subueniunt. sumpta per se & cum aqua præstant
mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu
sanguinem expuentibus prodest: cortex eosdem præ-
bet effectus. Corticis cinis admisto aceto macera-
tus, illitu clauos & callos tollit. Ex folijs & corti-
ce succus cū rosaceo in calyce punici calfactus, aus-
riū doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras
foueri utilissimū: surfures purgat in corpore. Exci-
pitur succus, qui manat ex ea cū floret, exciso cor-
tice: in plaga enim concretus humor inuenitur, qui
ad purgāda, que obstant oculis, suam vim præbet.

Syluestris olea.

Cap. CXVIII.

Syluestris, olea quam Latini oleastrū appel-
lant, alij Aethiopicam oliuam, folia adstrin-
gunt: trita autem et imposita ignem sacrū,
ulcera, que serpunt, epinyctidas, carbunculos, redu-
cias nomāsque cohibent: crustas emarginant cum
melle illita. Quinetiam sordida ulcera repurgant:
inflammationes panosq; cum melle imposita dis-
cutiunt: cutem à capite uulsam conglutinant:

oris ulceribus, & priuatim infantium, commandu-
cata medentur. Succus & decoctum eosdem habet
effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri proflu-
uium, admotus succus inhibet: uue oculorum, pustu-
lisq; prodest: ulcera & ueteres defluxiones sistit,
(quapropter in collyria additur.) ad genarum ero-
siones perquam utilis. Exprimitur succus tussis fo-
lijs, affuso uino aut aqua, siccatusq; sole in pastil-
los digeritur: sed longè ualidior ad recondendum
succus habetur, qui cum uino quàm cum aqua ex-
pressus est. Auribus subuenit, siue ulcerentur, siue
pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum farina
hordacea illinuntur: uruntur cum floribus folia, ut
spodij uicem cinis præstet, in cruda olla, oblito ore
luto. usque dum figlinum percoquatur: restincta q;
uino & rursus subacta, eodem modo uruntur, po-
stremo cerussæ modo elota coguntur in pastillos. His
iuscemodi cinerem in medicamentis oculorum con-
stat spodio non cedere, sed eisdem uiribus prædi-
tum esse potandum est. Foliorum sativæ oleæ ea-
dem uis intelligitur, sed aliquantò inferior: unde
ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim
conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, fursures & scabiem.
Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, &
ulceribus quæ depascunt uorantq;: quod autem in-
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros un-
gues excutit. Colymbades trita & ambustis il-

DIOSCORIDIS

litæ pustulas gigni prohibent, sordida vlcera purgant, murie succus collutas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua & recens stomacho vtilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascentia vlcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliuæ gingiuis putri vliginæ laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilit, calfacti fatus gingiuis fluxione laborantibus vtilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admo- uere, donec albæ spectentur.

Lacryma Aethiopice oleæ.

Cap. CXIX.

Lacryma, quam Aethiopica olea stillat, scāmo- nio similis quadamtenus est, fulua, stillis exi- libus constans, mordax: quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates oleæ, oleastrisq; similem lacrymam sudant, quæ commo- de ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albu- ginesq; illitu emendat, vrinam & menses ciet, cauis dentium impressa ad dolores efficax est: inter vene- na scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sa- nat. Appellatur autem Aethiopica et agrestis olea.

Amurca.

Cap. CXX.

Amurca (expressæ oliuæ recrementum) de

cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insuper dentium dolori & vulneribus, cū aceto, vino aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. Vetusstate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si uerò cū omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cū decocto lupini, & chamæleonte illitu sanat. Cruda et recenti amurca podagras articulariosq; dolores foueri, vtilissimum: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita tumoris molem reprimat.

Quercus, glans, fagus, ilex. Cap. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber, qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, cæliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pesso, fœminis fluxione vuluæ laborantibus subijcitur. Glandes eosdem effectus exhibent: vrinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sumptæ pariunt, resistunt esitæ venenatorum ictibus. Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino potum, prodest contra toxica: intrite crude inflammationes illitu leniunt: ad duritias, quas cacoethe vocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conue-

DIOSCORIDIS

niunt. Ilignee glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & ilex quercus generi assignantur, & con simile munus obeunt. Ilignee radicis cortex cum aqua coctus, cum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Castaneæ. Cap. CXXII.

Sardiana glandes, quas aliqui castaneas, aut lo spina, aut glandes lous appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent: præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercurSAT. Caro his, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla. Cap. CXXIII.

Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusque vis vehementer adstringere. Tritæ excrementa in carne, fluxiones gingivarum & vule, atque oris vlcerationem cohibent. Nucleus, dentium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus, donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida muria extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum, quibus insidere expedit, efficax est, & contra vuluas procidentes, fluxionesq; . Capillos denigrant, aceto aut aqua maceratæ, dysentericis coeliacisq; cum vino aut aqua tritæ conuenienter illis

nuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integre in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa, his vtendum ad adstringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

Rhus.

Cap. CXXIIII.

RHUS quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus Offici-
 erythros appellata, semen est coriarij fruti- nis su-
 cis, sic vocati, quoniam coriorum infectores eo vtũ mach,
 tur, ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris na- Arabum
 scens, binum ferè cubitorum altitudine, folijs oblõ more.
 gis, subrudentibus, in ambitu serratis, acino vuarũ
 gracilium denso, magnitudine terebinthi, quadãm-
 tenus lato: cuius corticosa tunica perquã utilis est.
 Folia vim habent adstringendi, & acaciæ effectus
 præbent. Decoctum capillos denigrat, dysentericis
 infunditur, & in potu eorum in seßusq; adijcitur:
 instillatur auribus purulentis. Gangrenas & pte-
 rygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Li-
 quamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinẽ mel-
 lis in aqua decoctis, ad eadem, vt lyciũ, conueniens.
 Semen eosdem effectus exhibet: cæliacorum, dysen-
 tericosumq; obsonijs, inspergitur: fracta, desquam-
 mata, liuida q; illitum ex aqua, ab inflammatione
 vindicat: lingue asperitates cum melle abstergit,
 candida foeminarum profluvia sistit, hæmorrhoi-
 das sanat, cũ querno carbone itrito admodũ. Aquæ,
 in qua semen maduit, decocta, cogitur coitq; effica-

DIOSCORIDIS

cior ipso semine. Gummi defert, quod dētiū canis
imprimitur, ad dolores finiendos.

Palma.

Cap CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturi-
tatis vigore, autumnō decerpi solet, Arabici
myrobalani similis pomatis cognomine, colore viri-
di, & odore mali cotonei. quod si ad maturitatem
peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma a-
cerba est & adstringens: contra alui fœminarūq;
profluvia, in vino austero bibitur: hæmorrhoidas s-
stit, ulnēra glutinat illitu. Phœnecobalani recētes
plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt,
copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem ex-
creantibus, Stomachicis, & dysentericis vtilēs in cō-
ho: illinuntur cum cotoneo & cerato cœnanthino ve-
sicæ vitij. Cariota, præsertim esu, faucium asperit-
ati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstua-
tionem sedat, vires recreat cum hydromelite veteri
sumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad ea-
dem conueniens. Decoctum per se potu & gargariz-
atione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei
palmarum, cæterorum more, cremati in crudo ficti-
li, & vino reſtincti, cinere loto, spodij vicem effi-
ciunt: miscenturq; in calliblephara; Quod si non ius-
tam vſtionem acceperint, denuo cremandi. Vim ad-
stringendi habent, & spiracula cutis obductu suo
claudunt: contra oculorum vnam & pustulas,
palpebrarum deflūia, cum nardo effectum præ-
bent:

dent: corporis excrescentias cum vino reprimunt, vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas vtilis ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. Cap. CXXVI.

PAlma, quam aliqui elatē aut spatham appellant, fructus palmarum adhuc florētium, inuolucrum est calyxq; quo in spissamenta vnguentarū vtūtur. Optima habetur odorata, adstringēs ponderosa, praeclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: sistit vlcera quae depascunt, laxatos artus committit, trita miscetur cataplasmatibus et malagmatibus: prodest praecordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat datur bibendum congruē, renum, vesicae, & viscerum vitijs: vuluae ac ventris fluxiones sistit: scabiē cum resina, & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolutusq; in ea elate fructus, quē suo āplexu fouet, elate ēt vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathae effectus praestat, nō sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recēs in cibo, aut decocta eadē facit, quae borassus.

Malum punicum. Cap. CXXVII.

MAlum punicum omne boni succi est, Stomacho vtile, perexiguum sufficiens alimentū. Dulcia Stomacho vtiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, vnde in febre abdicantur. Acida adstringunt,

Vulgo
malum
granatū

DIOSCORIDIS

æstuantî stomacho auxiliantur, & multò magis
 contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivâs q; læ-
 dunt. Vinosa vero mediam sortiuntur naturam.
 Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & ob-
 sonijs inspersi, concoctive, fluentem aluum stoma-
 chumq; sistunt. Cœlesti aqua madescunt, bibun-
 turq; commodè sanguinem excreantibus: ad deses-
 sus dysentericorum, fœminarumq; fluxione vulvæ
 laborantium vtilis sunt. Expressus nucleorum suc-
 cus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, et sedis
 vlcera, nomas, reduvias, & ea, quæ in corpore ex-
 tuberant, aurium dolores, & narium vitia: præser-
 tim acidorum. Huius flores cytini vocantur: qui
 adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta gluti-
 nant, quas punicum, præstant utilitates: humida
 gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto colluun-
 tur, herniam prolapsu intestini erumpentem cata-
 plasmate repellunt. memorie tradunt, qui tres quã-
 minimos cytinis deuorauerit, nullam eo anno lip-
 pitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exem-
 plo. Malicorium, asperum est mali punici putac-
 ri. men, quod aliqui sidion appellant. Ad spissandi vim
 habet, & quos cytini, præbet usus. Decoctum ra-
 dicis potu latus ventris tineas pellit, & easdem
 euocat. Balaustium sylvestris punici flos est, cy-
 tino similis, cuius complura genera reperiuntur:
 candidum, fulvum, colore rosaceo. Succus ex eo ex-
 primitur, hypocistidis modo, cui adstrictoria vis

inest, eadem faciens, quæ hypocistis, & cytinus.

Myrtus. Cap. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina quam candida, & in hoc genere multo magis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expressus eosdem effectus exhibet: stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctum capillum tingit, ius decocti in vino vlcera in extremis membris nata sanat, oculorum inflammationes illitum cum polline polenta lenit, contra agilopas illinitur, crapulam arcet præsumptum vinum, quod feruesfacto aliquantum eius semine exprimatur aliàs enim acorem contraheret. Præstat idem seminis effectus. Utile procidetie vulvarum in defectionibus, sedis vitij, & foemina fluxione vulvæ laborantibus: purgat fursures, vlcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas vocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad defectiones balnearum convenit, & contra laxatos artus, & malè solidescences. Eo fracta feruminationi repugnantia utilissimè foveantur, vitiginem emendat, purulentis auribus infunditur, et

G ij

DIOSCORIDIS

capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; prosunt, & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosa ceo cum vino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas & condylo-
mata. Arentium foliorum farina utiliter inspar-
gitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum femi-
numq; perfusiones, cardiacorum sudores cohibet.
Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, pa-
ronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs
succus adfuso vetere vino aut aqua coelesti, cuius
recentis usus est: nam exiccatus planè cariem sen-
tit, & vires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatū
inequabile, verrucosum intumescensq;, & conco-
lor: quod perinde quasi manus myrti caudicē am-
plectitur. Magis quàm myrtus adstringit: tusum
addito austero vino reponitur, coactumq; in pastil-
los siccatur in umbra, multò efficacius, & folio et
semine, cerato, pessis, infessionibus, cataplasmatibus
admixtum, ubi adstringendum aliquid est.

Cerasia. Cap. CXXIX.

Cerasia alio utilia sunt, si viridia suman-
tur: eadem siccata, illam sistunt. Gum-
mi, quod cerasi resudarunt, cum vino di-
luto tussi vetusta medetur: colorem commendat,
visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino
potum calculosis auxilio est.

LIBER PRIMVS. 51
Siliquæ. Cap. CXXX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur, al-
uum soluunt: eadem siccatæ sistunt stoma-
choq; vtiliores fiunt. Vrinam ciunt: sed præ
cipuè, quæ vinaceis condiuntur.

Mala. Cap. CXXXI.

Folia, flores, & germina cum omnis mali, tum
maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis
adstringendi vis inest: maturis vero longè secus.
Eæ ijs vernabilem gignunt, nervos omnes lædunt,
inflationes pariunt. Cotonea stomacho vtilia, vri-
nam cient: verum tosta mittiora habentur. Pro-
sunt coeliacis, dysentericis, purulenta extusionibus
cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor
commodè in stomachi aut ventris fluxionibus, po-
tius datur. Succus crudorum assumptus orthopnoi-
cis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & se-
des si procident. Cotonea, quæ melle condiuntur,
urinam mouent: mel autem sibi constringentem il-
lorum uim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum
melle coquuntur, stomacho atq; ori gratiora sunt,
sed minus inspissant. Cruda cataplasmati adij-
ciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus
æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mamma-
rum inflammationes, præduros lienes, & condylo-
mata. Fit vinum ex ipsis tuis expressisq;: sed quò
perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis
adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest.

G ij

DIOSCORIDIS

ad omnia quæ dicta sunt. Fit et oleum ex ijs, quod melinum vocauimus, quo vtimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè sunt rotunda, parua & odorata: quæ vero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, quæ adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorū, reiectionibusq; sanguinis. Contra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt stomacho negotium exhibent. Aestiuosa. Ea multis dulcia mala uocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia: sistunt aluum, urinas euocant, malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura oīa opus sunt. Persica poma matura tā stomacho, quā uentri utilia sunt. Acerba aluum cohibent: sed sicca uehementius. Decoctum ē siccis alui stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala Persicæ uel aut cedromela, quæ Latini citria uocant, nemini nō cognita. Arbor ipsa oībus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cū gravitate odoratum, semē habet pyri. Id in vino potum uenenis resistit aluū mouet, oris suauitatem cōmen-

dat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: uestiarijs impositum ab erosione uitio uestes vindicare existimatur.

Pyra. Cap. CXXXII.

PYrorū multa genera, quæ tamen oīa adstringunt: promde adduntur cōueniēter in repellentia cataplasmata. Decoctū ē siccis & cruda ipsa aluū sistunt: ieiunos esitata laedunt. Achras pyrastrī genus est, quod tardissimē ematurescit. Vim pyro adstringētiorē habet, et ad eadē conuenit: stringunt et eius folia. Ligni pyrorū cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi stranguant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus. Cap. CXXXIII.

MESPILUS, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthæ. fert pomiō suauē exiguō malo nō dissimile, tribus intus ossiculis: quæ ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardē maturescit, esus adstringit, stomacho gratū est, aluūq; supprimit. Alterū mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setaniū, alij epimelida uocāt Arbor folijs mali, sed minoribus: pomiū fert rotū dum esui aptū, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor. Cap. CXXXIIII.

LOTUS arbor est uastæ magnitudinis ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gra-

G iiij

DIOSCORIDIS

tam, Stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Rametorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis ac foeminis fluxione vuluae laborantibus auxilio est rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus. Cap. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferēs oliuae modo oblongas, quae primū uirent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant. In cibo adstringunt, profluvio alui atque dysenteriae salutare, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Muria, ut oliuae, condiuntur. Sanies, quā uirentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

Sorba. Cap. CXXXVI.

Sorba colorem luteum referētia prius, quā maturescant, dissecta & sole siccata manduntur, ut album sistant. Eadem est functio molitorum farinae, si polentæ loco sumatur: quod & decoctum eorum in potu praestat.

Prunus. Cap. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur: sed stomachū malè habet, aluum nullit. Syriaca pruna, et praecipue quae Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt. aluum adstringūt. Folia pruni i uino decocta collutiōe, et gargarizatu uinā, ginginas, et tōsillas fluxiōe laborāteis reprimūt. Praestat idē syluestriū prunorū baccæ, post maturitatē exiccate, cū sapa uero decoctæ, stomacho utiliores

redduntur aluiq; magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus. Cap. CXXXVIII.

Arbutus, siue vnedo, arbor est cotonea malo non dissimilis, tenui folio: *cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic, *Prunis memecylo cognomen est: maturus aut flauet, aut magnitudo rubescit, in esu acorosus, stomacho aduersatur, capidine quistisq; dolorem mouet. dem hic

Amygdalæ. Cap. CXXXIX.

Amygdalæ amaræ radicum tritarum decoctum nequa vitia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idem quam ce munus præstant, menses admotæ ciunt, capitis do dit: cete lori auxiliantur, illitæ fronti aut temporibus cū ace rum effi to vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino, item pu gie adeo trescentia vlcera, & quæ serpunt, et morsus canū expresse cum melle: earum aut esu dolores finiuntur, aluum refert fra emolliunt, somnum faciunt, vrinam cient, contra ga, vt nil sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur, re= queat ex num vitæ, & pulmonum inflammationibus ex pressius. aqua in potu aut eclegmate cum resina terebinthi na dantur: calculosis difficiliq; vrinæ in passo auxi liantur, & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, et inflationibus coli, nucis. auellanae magnitu dine: quinis septenisue præsumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vulpes, si cū quadam esca eas vocauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & ad

DIOSCORIDIS

Stringit: reijcientibus sanguinem, potũ auxilio est: impetigines, quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit: tussi vetustæ cum diluto vino potum medetur: calculosis cū passò bibere prodest. E nucibus græcis dulces cibo idoneæ sed multò minus valent in remedijs, quàm amara attamen extenuant, urinam ciunt, recentium esu cum suo putamine, humida stomachi vitia emendantur.

Pistacia. Cap. CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica: trita cum vino contra serpentium ictus prosunt, siue edantur, siue bibantur.

Nux iuglans. Cap. CXLI.

Nuces iuglandes, quas nonnulli Persicas vocant, sunt difficiles concoctu, stomacho inutilis, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptæ. Cum ruta vero & ficis præsumptæ, & à summo cibo, venenis resistunt: nec minus si à veneni haustu comedantur: largius esitate tineas latas pellunt, illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatisq; cum mellis exiguo, et ruta: cum cæpa autem, sale & melle, canis hominisq; morsui proficiunt: tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admostæ, sedant. Putamen combustum tritumq; in oleo, & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Sistunt menses nuclei viti, si

triti ex vino admoucantur: ydem e veteribus, illi carbunculis, gangrenis, & agilopijs medetur: alopecijs comaducati, et impositi p̄senti sunt remedio. Nucibus tussis oleū exprimitur. Recentes stomacho innocetiores sunt, vtpote suauiores: itaq; allio miste eximūt acrimoniā. Liores in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanae. Cap. CXLII.

Nuces auellanae, quas & leptocarya vocant, stomacho infesta sunt: ipse tamen trita, et in aqua mulsa pota, tussi veteri medentur: toste et cum exiguo piperis pota destillationem cōcoquant, crematurū cinis cū axungia aut adipe vrsi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cū oleo, caesiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso sincipite.

Morus. Cap. CXLIII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus: decoctus autem aereo vase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolescit vis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha: item myricae semine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq; acinorum rhois vice obsonijs miscetur, vt coeliacos iuuēt. Radicis cortex decoctus in aqua et potus aluū resoluit,

DIOSCORIDIS

latus ventris tineas excutit, his quoque auxiliatur, qui aconitum hauserunt, Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntque capillum, vitium & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

SYCOMORUS. Cap. CXLIIII.

SYcomorum aliqui etiam sycaminum, id est, morum, vocant, cuius fructus sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus, sed caudice, ipso caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus: ubi prouentu fecundo restibilique iuuamentum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum aluo utile est, sed perquam exilem praebet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cor-

tex, nihil effluet. Spongia aut vellere lacryma exci-
pitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili va-
se reponitur. Vis succi emollit, vulnera cōglutinat,
discutit collectiones coctioni repugnantes bibitur
etiam aut illinitur contra serpentium morsus, du-
ratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Ce-
lerimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro ar-
bor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita ta-
men est folijs sycomori, fructu pruni magnitudi-
ne, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Fici. Cap. CXLV.

Fici maturæ recentes stomachum lædunt, aluū
soluunt: sed faciliè contracta ab eis fluxio sisti-
tur: sudorem euocant, papulasq; sitim sedant, calo-
rem restinguunt. Siccis natura excalfaciendi, vires
alunt, sed sitim magis stimulant, aluo vtilis, rheu-
matismis ventris & stomachi contraria: gutturi
autē, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs, quos longa va-
letudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comi-
tialibus aptissimæ: seruæ factæ cum hyssopo & po-
te, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisq; pul-
monum vitijs conueniunt: aluum molliunt tuse cū
nitro & enico, dein manducate. Decoctum arte-
riæ & tonsillarum inflammationibus gargariza-
tu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatibus
miscemur, & in muliebres fetus cum fœnogreco
& ptisana, Cæterum cum ruta coctæ torminibus
infunduntur. Coctæ illitæq; duritias discutunt, pa-

DIOSCORIDIS

rotidas & furunculos emollunt, panos ad maturam
 tionem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addi-
 ta. Crude si cum antedictis tundantur, eadem effi-
 ciunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atra-
 mēto sutorio, deploratis fere tibiārum fluxionibus,
 & cacoethicis vlceribus medentur: quin & cum
 vino decoctæ addito absynthio, & hordeacea fari-
 na, vtilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum
 cerato sanant perniones, prurigines, sonitusq; si cru-
 de terantur, et sinapi liquoreq; aliquo exceptæ au-
 ribus instillantur. Tam sylvestris, quàm sativæ fici
 lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concre-
 tumq; dissolvit, vt acetum: exulcerat corpora, meas-
 tus aperit, solvit aluum, vuluam recludit cū detri-
 ta nuce græca potus, menstrua ciet cum luteo oui
 appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cas-
 taplasmatis cum farina scæni græci et aceto vtilis:
 lepras, lichenas, vitiligines, vitia cutis in facie, psor-
 ras, vlcera in capite manantia, cum polenta expur-
 gat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, venena-
 torum ictibus & rabiosi canis morsibus auxiliat-
 ur: prodest dentium dolori lana exceptus, & cas-
 vis eorum additus: verrucarū in formicationes tole-
 lit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem
 præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui
 lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tusi exprimū-
 tur, & siccatus in vmbra reponitur. Et lac & suc-
 cus imponuntur exulceratorij medicamenti. Deco

Eti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem
afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis sol-
uat, si inter coquendum ficulneo surculo spathæ lo-
co moueatur.

Grossi.

Cap. CXLVI.

Grossi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ, illitæ
strumas nodosq; omneis emolliunt: crudæ for-
micas, verrucas & thymos, nitro farinaq; additis,
tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sale & ace-
to vlcera in capite manantia, epinyctidas, & fur-
fures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & genarum
scabritia perfricantur. Nigræ ficus folijs caulicu-
lisq; candidæ vitilignes perunguntur, faciunt ad ca-
num morsus, & vlcera quæ ceria, id est fauos, voc-
cant. Grossi cū syluestris papaueris folijs ossa ex-
trahunt, furunculos cū cera discutiunt, cōtra muris
aranei morsus, & scolopendræ venena, cū eruo &
vino illitæ, auxiliatur. Fit ex cinere ficus tam sylue-
stris quā sativæ lixiuiū, crematis ramorū caulicu-
lis: quod subinde macerari opus est et iueterascere:
siquidē inter caustica intelligitur. Gangrænis pro-
dest: nanq; expurgat & consumit, quæ excrescūt:
eoq; sic viendū est. Spongia assidue hoc lixiuio im-
buta superponitur. Interdum dysentericis, et in flu-
xiones vetustas, & sinus cuniculatim ex edentes,
magnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, con-
glutinat, carne replet, & oras committit, nō secus
atq; emplastra, quæ cruentis vulneribus iniunguntur.

DIOSCOR. LIB. I.

tur, enema vocāt. Bibitur ad discuticndum sangui-
nem concretum, & contra præcipitationes, rupta,
conuulsa, cum cyatho aque recenter colatum: addi-
to olei exiguo, cœliacis, dysentericis per se cyathus
datus prodest: neruorum vitijs, conuulsionibus com-
mode illinitur ex oleo, vtpote quod sudores moueat
aduersus gypsi potum, & phalangiorum morsus
bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præ-
sertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea. Cap. CXLVII.

Persea arbor est, in Aegypto, fructum ferens c-
bo idoneum, stomacho vtilem: in quo phalan-
gia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim
in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitis
sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodi-
derunt aliqui in Perside exitiosam esse, translataq;
in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis. Cap. CXLVIII.

Iberis, siue cardamantica, folia habet nasturtij,
vere virentiora: caulem cubitalem, aut minore:
in incultis nascitur, æstate lacteū florem promit,
quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio
similes habet, calfacientes & adurentes. ipse enim
ischiadiacis cum salsa axungia emplastri modo vti-
les, quaternis horis alligatæ, vt dein in balneas de-
scendatur, et postea oleo cū lana locus perungatur.

PRIMI LIBRI FINIS.

Pedani

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA,

LIBER II.

IOANNE RVELIO SVESSIO
nensi interprete.



In primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia cōdidimus, de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusq; differuimus. In hoc aut secundo de animalibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cū ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

Echinus, siue erinaceus. Cap. I.

Marinus echinus stomacho vëtriq; utilis est: urinam cit, huius testa cruda inassata comode medicamētis admiscetur, quæ psoras abstergunt: cremata vero cinis sordida vlcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat. Terrestris erinacei

H

DIOSCORIDIS

corium combustum alopecijs cū pice liquida aptissimè illinitur, assiccatum corpus & cum aceto mulso potum, renum vitij auxilio est. item aquæ, quæ cutem subiit, conuulsionibus, elephantie, & malè habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem vsus utilissimè reconditur.

Hippocampus. Cap. II.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut azungia seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

Purpura buccina, eorūque volutæ. Cap. III.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, excrementas in carne cohibet, vlcera purgat, et ad cicatricem perducit. Eadem præstant concremata buccina, sed vultus vrunt: si quis salis plena, fictili crudo adurat, dentifricio cōueniūt: ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentū non oportet: nam postea quā vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modū induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx è buccinis, vt in eius mentione demonstrabimus. Cionia vocantur purpurarum buccinorumq; mediæ partes, circa quas testæ volumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisq; facultatem vrēdi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obti-

uent. Buccinorum carnes ori gratae sunt, & stomacho utiles. sed aluum non molliunt.

Mituli. Cap. IIII.

Mituli lautissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum praebent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cetera quae oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

Tellinae. Cap. V.

Recentes tellinae aluo utiles, sed maximè ius earum salita vruntur, tria quoque in cinerem et cum cedria instillata, aulcos proos & renasci non patiuntur. τὸ βλεφάρων.

Chamae. Cap. VI.

Chamarum conchularumque in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus. Cap. VII.

Vnguis siue onyx conchilij tegumentum est, ei simile quo purpura integitur: quod in India nardiferis lacubus inuenitur. suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquam stagnantes aquae aestiuis caloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylo-nicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo

H ij

DIOSCORIDIS

odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus castoreū olent. Idem suffitu excitant fœminas vuluæ strāgulatu oppressas, comitialesq; poti ventrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit, quæ purpura & buccinum.

Cochleæ. Cap. VIII.

T Errestres cochleæ stomacho vtilis sunt, & non facile corrumpuntur. Optimæ Sardoniæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, ac Chio gignuntur, & quæ in Liguria alpibus, pomatia, id est operculares, cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur: fluiatilis virus olet. Quæ vero repribus frutetisq; glutinata coheret, quam vocant nonnulli sesilon, ventrem et stomachum turbat, vomitiones excitat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi & vrendi naturam sortiuntur: purgāt lepras, vitilignes, dentesq; emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines, si cum carne sua vstæ tritæq; ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exigunt: sed non antè solvantur, quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt, im pactos corpori aculeos illitæ euocant, menses tritæ & admotæ cient. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cū vulnera alia, tum maximè quæ nervi acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrenant: viuæ cor-

pus, & præsertim Aphricanæ, cum aceto deuora-
tum, stomachi dolores mitigat, trita cum testâ, vi-
no & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli vesi-
cæq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incōmodos re-
plicat, si quis abrafo aculētoze eius, pilū attingat.

Cancrī.

Cap. IX.

CAncrorum fluuiatiliū exustorum cinis, qui
duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radi-
cis gentianæ modo, triduo potus cū vino, magnopē-
re prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum se-
disq; perniunculos, & carcinomata, cum decocto
melle lenit: triti crudi, potiūq; ex asinino lacte, auxi-
liantur cōtra serpentium phalangiorumq; morsus,
atque scorpionum iētus: decocti autem & cū iure
ēsitati, ijs profunt, qui tabe conficiuntur, aut lepo-
rem marinum hauserunt necant scorpiones triti, et
cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, verūm
inefficacius omnia præstant.

Terrestris scorpīo.

Cap. X.

Terrestris scorpīo tritus & impositus, sue pla-
ge remedium est quin estur assatus, ad eadē.

Marinus scorpīo.

Cap. XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones
oculorum, albugines, & hebetudines.

Draco marinus.

Cap. XII.

Draco marinus dissectus & apertus imposi-
tusq; iētus spinæ suæ qua ferit, medela est,

H iij

DIOSCORIDIS

Scolopendra. Cap. XIII.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos, sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis. Cap. XIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiā mulcet: eadē apposita euersam sedem prociduamq; coercent.

Viperæ. Cap. XV.

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, neruorum vitijs auxiliantur, increscentes strumas reprimunt: detracta autem cute caput caudaq; quoniam carne vacant, amputari debent, quippe commentitium est quod præcipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. Reliquum vero corpus exemptis interaneis elotū dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs, qui viperas esitent, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem vipera in fictile nouū demittitur, adijciuntur salis caricarumq; tritarū, singulatim quinque sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem reconditur. Plerunque, ut ori gratior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

LIBER SECVNDVS. 60

Senecta anguim. Cap. XVI.

Senectus anguim in vino decocta dolori au-
srium, infusu, & detium collutione, auxilio est.
Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præci-
puè viperinam.

Lepus. Cap. XVII.

Lepus marinus loligini parue similis est, qui
per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus
capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cere-
brum manditur, iuuandis tremoribus, qui valetu-
dine contracti sunt: affrictu aut cibo facilem in-
fantibus dentitionem præstat: exustum caput &
cum adipe vrsino aut aceto illitum, alopeciarum
inantibus medetur. Leporinum coagulum post tri-
duum à concubitu potum, conceptum adimere, par-
tusq; spem intercipere proditur: vuluæ & alui fluo-
rem sistit, comitiales iuuat, contra venena ex ace-
to bibitur, præsertim aduersus cöcretum lac, & vi-
perarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur,
vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginesq; sanat.

Pastinaca. Cap. XVIII.

Marine pastinacæ radius, qui eius cauda ena-
tus aduersis squammis reflectitur, dentium
dolorem mitigat: nam eos frangit, & euocat.

Sepia. Cap. XIX.

Sepiæ coctæ dum estur atramentū ægrè con-
coquitur, aluiū mollit, collyrijs è testa factis
conuenienter genarū scabritiæ perfriçantur:

H iij

DIOSCORIDIS

ustum in sua testa donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat vitilignes, furfures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absument, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis.

Cap. XX.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atque dissectus admoneatur.

Hippopotamus.

Cap. XXI.

Hippopotami testes exiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur.

Fiber.

Cap. XXII.

Fiber ancipitis vite animal, plerumque cum piscibus & cancris ex aqua victum capebit. Huius testes serpentium venenis aduersantur, sternutamenta mouent, & in vniuersum varios obtinent usus: si quile menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus secundasque eijciunt: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiadasque ex aceto bibuntur: lethargicos, & vtcunque venterno obdormiscētes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo, ol. factu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illi profunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus nervorum vitijs. In summa, calfaetoriam vim habet. Eligi debent testes qui ex vno

LIBER SECVNDVS. 61

ortu connexi sunt (fieri enim non potest, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiuntur) liquore intus veluti ceroso, odore graui & virus re dolente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniicientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, quum venatu vrgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, vt in sue, substricti. Operæ aut pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

Mustella vulgaris. Cap. XXIII.

Mustela, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cū vino pota, aduersus omnia serpentium venena presentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius venterculus coriandro farctus inueteratusq; percussis à serpente, et comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ, iuuantur: comitialibus etiam prodest.

Ranæ. Cap. XXIIII.

Contra omnium serpentium venena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decocta edantur, iusq; earum itidē sorbeatur: cōtra inueteratos

DIOSCORIDIS

tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis profluens sanguinis impetus sistit, explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridū ranarū cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulsorū instillatus: decoctus in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Silurus.

Cap. XXV.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem præbet saluum: sale verò conditus, minimum suppediat alimentum. Arteriam expurgat, & vocē expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixa corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidētium fatus adiiciatur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Smarides.

Cap. XXVI.

Smaridis piscis caput exustū, excrescentes ulcerū oras puluillosq; reprimat: nomas cohibet, thymos clauosq; absumat. Caro nō secus atq; salsamētū prodest à scorpione percussis, aut à cane demorsis.

Mænæ.

Cap. XXVII.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

Cap. XXVIII.

Gobius recens in suillum ventrem coniectus, si confuta rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub di-

no refrigeratus potui detur, alius sine molestia dei citur. Allitus contra serpentiū canumq; morsus auxilio est. Thunnus. Cap. XXIX.

Conditanei thunni caro, quā omotarichon vocant, sumpta iis auxiliatur, quos vipera nomine prester momorderit: sed oportet vinum quā plurimum subinde cogantur haurire, ita vt vomitione reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè valet, canum morsibus vtilissimè illinitur.

Garum. Cap. XXX.

Garum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo fatus fiat, depascentia vlcera sistit: morsis à cane medetur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: nonnullis, vt exulcerata adurat: alijs autem, ad laceffenda, quæ vlcera non senserunt.

Ius piscium. Cap. XXXI.

Recentium pisciū ius, modo per se, modo ex vino potum, alui subducit. Priuatim ad hunc usum cōficitur è phycidibus et scorpionibus, et iulide: è percis, et recētibus alijs saxatilibus, nec viris respicientibus, simpliciter cū aqua, oleo et anetho.

Cimices lectularii. Cap. XXXII.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante februm significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: et citra fabas sumpti, percussis ab aspide prosunt: vulnarum exanimationes olfactu reuocant: poti cū vino

D I O S C O R I D I S

aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: triti
et vrinariae fistulae impositi, vrinae angustias leniunt.

Millepeda. Cap. XXXIII.

Millepeda, quae sub aquario vase stabulatur,
animalia sunt multis pedibus nitentia, quae
contacta manu contrahuntur in orbem: haec ex vino
potae difficili vrinae, & regio morbo auxiliantur.
Millepedas illini anginis cum melle utilissimum. Tri-
ta, et in cortice mali punici calfacta, doloribus au-
rium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Blatta pistrinaria. Cap. XXXIII.

Blatte eius, quae in pistrinis inuenitur, intera-
nea trita aut cum oleo decocta, aurium dolo-
res instillatu mitigant.

Pulmones. Cap. XXXV.

Podagras pernionesque emendat pulmo marinus
recens, tritus & illitus. Suillus & agninus
ursinusque pulmo impositu attritus a calceamentis
contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus ve-
ro si arefactus bibatur, suspiriosos adiuvat. Adeps
quoque liquefactus, infususque, auris dolorem finit.

Genitale cerui. Cap. XXXVI.

Genitale cerui tritum & in vino potum, a vis-
cera demorsis auxiliatur.

Vngula asini. Cap. XXXVII.

Vngularum asini cinis per dies multos binis
cochlearibus potus proditur comitiales adiu-
uare, eadem oleo subacta strumas discutiunt: &

LIBER SECVNDVS. 63

illitæ pernionibus medentur. Caprinarum cinere
perunctæ ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. Cap. XXXVIII.

Lichenes sunt in equorum genibus, & * super * κατ'
ungulas in flexu harum partium indurati cal
li: qui triti & in aceto poti, comitialibus mederi
traduntur. φήν, non
ἐπιστραφ
φήν.

Iocinera. Cap. XXXIX.

A sini iecur inassatū esu comitialibus prodest,
veruntamen ieiunis edendum præcipitur. Ca
præ vero inassati decidua sanie, inūgi lusciosos pro
dest: & dum coquitur, apertos oculos halitu eius
vaporari prodest in cibo tostum ad eadem. Tradūt
hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. Apri
num recens si arefactum teratur, ex vino potum
contra serpentium volucrumq; morsus auxilio est.
Iecur canis, qui rabie exagitatur, tostum & in ci
bo ab emorsis sumptum, ne tententur metu aque
tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aque
pauores dentes eo, qui caninus dicitur. hunc a ca
ne, qui momordit, exemptum, & follicullo inditū,
pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum au
tem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis
potum, secundas pellit.

Coria veteramentaria. Cap. XL.

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta
igni, intertrigines, necnon calceamentorum
attritus sanat.

DIOSCORIDIS

Gallinae

Cap. XLI.

Dissectæ gallinae, & adhuc calentes appositæ, serpentium morsibus auxiliantur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus, sanguinem à cerebri membrana profluentē sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea vero inter coquendum abijci solet) siccatur, tritaq; in vino conuenientissimè stomachicis datur in potu. Ius è vetere gallinaceo aluum deijcit. Abiectis itaque interaneis salem coniungi oportet, & consuto ventre decoqui in uiginti sextarijs aquis, donec ad treis heminas redigatur. totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, onicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit predest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, et inflationibus stomachi.

Quorum natura.

Cap. XLII.

Ouum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est: massatum sedis inflammationibus predest, cum croco, & rosaceo: & condylomatibus: cum meliloto: cum uia autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo aluos fistat: per se etiam offerri solet. Candidum ovi crudum refrigerat spiramenta cutis occludit, in-

LIBER SECVNDVS. 64

flammationes oculorum infusum lenit, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à Solis adustione tuetur, fronti impositum cum thure fluxiones arcet, auertitque: inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & uino, mitigat: utiliter contra hemorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest uesicæ rostonibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Cicadæ. Cap. XLIII.

Cicadæ, quæ inassatæ manduntur, uesicæ doloribus prosunt.

Locustæ. Cap. XLIIII.

Locustæ odoris suffitu urinæ difficultates adiuvant, præsertim quæ scæminas malè habent: earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustæ, quæ asiracos aut onos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Teptiæ incolunt.

Osisifragus. Cap. XLV.

Venter eius auis, quam Latini osisifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotionio pellere proditur.

Galerita. Cap. XLVI.

Galerita amicula est parua, apicem in uer-

DIOSCORIDIS

tice, pavonis modo, gestans: quæ assa, & in cibo sumpta, cœliacos adiuvat.

Hirundines.

Cap. XLVII.

Dissectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore varium, alterum purum eximes: ù priusquam terram attigerint, in iuventa corio, aut cervina pelle brachio aut collo ad alligati, comitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti si cedula, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum, quàm matrū in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginae eo commodè perunguntur: vix & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipse & pulli exiccati, si drachmæ pōdere ex aqua bibantur, hos iuvāt, qui anginae morbo cōflicantur.

Ebur.

Cap. XLVIII.

Eboris scobe illito paronychia sanantur. Vinum adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus.

Cap. XLIX.

Svis talus cōburitur, dum è nigro albescat: qui stritus & potus inflationibus coli, longiq; torminibus medetur.

Cervinum cornu.

Cap. L.

Cervini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœliacis, regio morbo, & vesica doloribus

614710

LIBER SECVNDVS. 65

cum tragacantha: sceminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerni cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, vritur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, et defluxionibus salutare est: infriktum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: feruefactum in aceto, si eo gingiuæ colluantur, maxillarum à detitione dolor em adimit.

Eruca Cap. LI.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestijs feriri negantur.

Cantharides. Cap. LII.

ERUMENTIS congestæ cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec aëtu exanimentur postea lino transfixæ reponuntur. Potentißimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ. Cap. LIII.

SIMILI modo reconduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intoste, reponuntur. Vis omnium communis erucæ

DIOSCORIDIS

dere, ulcerare, calorem elicere: qua de causa admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferasq; lichenas & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quòd urinam moueant. Alij penas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Salamandra. Cap. LIIII.

Salamandra lacerta genus est, iners, varium, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, ut cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detrahitis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem usum.

Araneus. Cap. LV.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, et linteo illitus, prolatusq; utriusq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera, quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur: quem in aluta ligatum, et lacerto appesum, quartanis circuitibus mederi narrat. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

LIBER SECVNDVS. 66

Lacerta.

Cap. LVI.

Lacerta caput intritū, & appositū, aculeos, et oīa corpori infixā extrahit: varos, formicātes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocāt, tollit. Iecur excessi dētibz cōiectū dolores finit. Si diuulsa admoueatur, ictis à scorpione lenamentum præstat.

Seps.

Cap. LVII.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota morsus suos sanat.

Seincus.

Cap. LVIII.

Cincus aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alūnus, quāuis inueniatur in Lydia Mauritāie.

Est aut terrestris crocodilus, sui * generis, sale inueteratus cū nasturtio. Aiūt carnes, quæ renes amplectātur, id sibi viriū vēdicasse, vt si drachmæ pōdere bibātur, venerē accēdant. Verū decocto lentis cū melle aut semine lactucæ cum aqua potō, veneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

Terreni vermes. Cap. LIX.

Terreni vermes īpositi, præcisos nervos glutināt, tertianas discutiūt: decocti cū anserino adipe, et īfusi, aff. ctis auribus medētur: cū oleo autē decocti, si ī cōtrariā aurē instillētur, dētiū doloribus īstāt auxiliū: triti ī potu ex passo urinā ciūt.

Mus araneus.

Cap. LX.

Mus araneus dissectus, et impositus, sui morsus veneficia luit.

I ij

DIOSCORIDIS
Mures. Cap. LXI.

MVres, qui in domibus eberrant, concios scorpionum plagis vtilissimè imponi, in confesso est si massatos infantes ederint, oris salivam exsiccare promittunt.

Lac. Cap. LXII.

LAc generatim omne boni succi est: corpus alit, aluum emollit, Stomachum & intestina inflatione vexat: vernum tamen dilutius æstiuo habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ovillum autem dulce, crassum, & præpingue, non vsque adeò utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, veratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne ventrem & stomachum subvertit. quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem caprae, quibus candidam veratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt: et eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Ventrè adstringit lac omne decoctum, præcipueque cædētibus calculis marinis exustum

LIBER SECVNDVS. 67

Et in summa, omnibus auxiliatur internis exulce-
rationibus, præsertim faucium, pulmonis, intera-
neorum, vesicæ & renum: foris uerò contra pruri-
tum cutis, eruptiones papularum, & vitiatos corpo-
ris succos, recens cum melle crudo, addito sale, da-
tur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunq;
semel feruesactum. Decoctum cū calculis marinis
ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones adiuvat.
Lac quodcunque serum continet implicitum, quod
ubi discessit à lacte, multò potentissimum ad pur-
gationes redditur. Datur quibus sine acrimonia vo-
lumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comi-
tialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto
corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum,
id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo fer-
uet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, insparsis, post-
quam bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi-
cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim serefcēs
liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum cōcreuit.
Sed cū feruet, ne superfundatur, conueniet spongia
ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sexta-
riumq; argenteum frigida aqua plenum demitte-
re. Bibitur heminis per intervalla singulis, vsque
ad quinas, ita vt intercedentibus spatijs, potantes
ambulent. Lac autem recens efficax est contra ro-
siones vstionesq; , ab exitialibus medicamentis fa-
ctas: vt à cantharidibus, aut salamandra, bupre-
ste, aut pinorum eruca, hyoscyami, dorycnio, aconi-

DIOSCORIDIS

to, aut ephemero presertim bubulum ad id eximie confert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisque. Asininum peculiariter collutos dentes gingivasque stabilis. Fluxiones alui, si ulcera sentiatur, tenesmosque, ouillum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem & cum hordeacea ptisana aut halicaceo cremore infusum magnopere intestinorum resiones mitigat: exulcerata uulue immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit: mammis autem exulceratis, prodest tabi, & stomachi rofionibus: contra haustum leporum marinum presidium est. oculis cruore ex ictu suffusis cum thuris polline instillatur: podagricis utile est, cum meconio, & cerato illitum.

- Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, et nervorum uitio laborantibus. febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum præbeat. Primi paræ canis lacte perunctos narrat glabrescere: potum contra uenena antidoti uicem obtinet, abortus mortuos expellit.

Caseus.

Cap. LXIII

Caseus recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, et facile in membra delegatur: corpus auget, aluum modice emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis, à quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde in assatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflammationibus, &

fugillatis prodest. Qui uerò recens salitus est, minus alimenti præbet. corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisq; exhibet: uetustiore sistitur aluus. Sero, quod à caseo manauit, quam optimè canes aluntur. Quod hippacè uocant, caseus est equinus ea uirus redolet, magnopere alit, bubuloq; proportionè respō let. Nec desunt, qui hippacen, equinū coagulū appellarint. Butyrum & eius fuligo. Cap. LXIIII.

ELacte pinguisimo probatū sit butyrum, quale ouillū est: sit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrū natura oleosum est & emolliens: unde liriū epotum, uentrē resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, cōtra uenena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat: gingiuarū pruritus, et oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimētōrū facit corpora, & ab albidis pustulis per summa factentibus asserit. Contra inflammationes & duritias uulue, quod nec uirus resipit, nec uetustatē sentit, butyrum efficax est. dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur: in medicamēta addi solet, quæ pus mouent: utile præsertim cū nerui, aut cerebri membrana, uesicæ ceruix, uulnera acceperit. Ad aut purgat, replet, carnē creat, ab aspide percussis utilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei uicem pēsāt, et adipis uice fungitur i bellarijs. Colligēda ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrū in lucernā no-

DIOSCORIDIS

nam ingestum acceditur, fictiliq; operculato quod
superne in siphunculi speciem desinat, & infima
parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, &
subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dñ co-
aceruetur fulginis modus, quem facere institueris:
penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in
medicamentis oculorum, exiccare & adstringere:
fluxiones cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem
perducit.

Medicina lanarum. Cap. LXV.

Succidæ lanæ molles, è collo foeminibusq; laudat-
tissime habentur. Subueniunt inter initia vul-
neribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fra-
ctis, aceto, oleo aut vino imbutæ: si quidē facile suc-
cos combibunt quibus immerguntur, & ob pecudū
sordem sic enim œsypum vocant remolliunt: ca-
pitis, Stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum
aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Cremata
rum lanarum cinis crustas obducit, excrescentias
in carne cohibet, & vlcera ad cicatricem perducit.
Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cetero-
rum more, vruntur. Nec secus fimbriati marinariū
purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum
sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq;
modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, verucula inter
se distantia componunt, & concerptas carmina-
tasq; lanas oleo ita suffusas, vt ne stillare quidem
possint, assulis tedæ subiectis, et eisdem lanisq; per-

LIBER SECVNDVS. 69

mutatim interstratis, leuiter succendant, & vstas tollunt. quod si è teda pix, pinguitudoñe vlla profu-
xit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medi-
camenta: cinerem in labellis, aqua addita, mani-
bus confricant, & considere patiuntur: idq; sepius,
mutantes aquam, donec linguam adstringat, nec
mordeat.

Oesypum.

Cap. LXVI.

OEsypum vocant Græci, succidarum lanarum
pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est:
Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua
lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, &
in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur,
magnoq; ipetu ligula, vti respumet, agitur, aut li-
gnea rude validiusculè cõturbatur, quò largius sor-
dida spuma colligi possit, deinde marina respergi-
tur, considere pingui quod supernatahat. collectoq;
in altero fictili vase, denuò aqua in labellum fusa
agitatur: spuma iterum mari perfunditur, & de-
mum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum con-
sumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet.
Collectum œsypum manibus emollitur, & si qua
insedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sen-
sim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceas-
tur, donec admotum linguæ œsypum adstringat le-
uiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spec-
tetur: cum in fictili vase conditur. Verum omnia
feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigi

DIOSCORIDIS

da aqua eluunt, & manibus non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis et sordibus quibuscunq; exēptis, ac lento igne in aeneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernat at collectam, aqua, ut diximus, lavant: colactumq; infictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque Soli mandant, donec calidū fiat, & satis crassum. Alij bidui spatio aquam effundunt, novamq; adijciunt. Melius est læve, radícula non curatum, quod succidarū virus oleat, & si manu in concha fricetur cū aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habēs: veluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypū excalfacit, explet ulcera, et emolliat: præsertim sedis ac vulvæ, cum meliloto & butyro: in uellere appositum, menses & partus evocat, ulcera non aurium modo sanat, sed et genitalium cū anserino adipe: contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas, quæ occalluerunt, & ciliorū defluvia, efficax est. In testa nova torretur, donec redactū in cinerē pinguitudinē amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, uti demonstravimus: quæ in oculorum medicamenta commodè adli solet.

Coagulum. Cap. LXVII.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum morsibus, celiacis, dysentericis, & foeminis fluxione vulvæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore auxiliatur. Sanguinē in grana

LIBER SECVNDVS. 70

mos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant: potum uero partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulū, quam hippacen aliqui uocant, priuatim coeliacis dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, uituli, bubali que coagula similes naturas sortiuntur: cōtra acorriti potum in uino, et concretū lac in aceto, conueniēter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei uires representat: comitialibus, strangulatis uuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit uituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cū alterius animalis, tum præcipue agni coagulū, madauerit: nam si erit syncerum, statim liquescit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur aut caputulis, qui nondum natare possunt. In summa, coagulū omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps. Cap. LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad uulvæ uitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, uulvæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fætilem ollam demissus, qua altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligen-

DIOSCORIDIS

ter vase, flagrantissimo Soli exponitur: eliquescent
inde humor in fictile alterū excolatur, donec adeps
omnis absumatur, mox loco vehementer frigido re-
conditur, & ad vsus digeritur. Alij fictile fulciunt
super aquam calidam, aut tenuem & elanguidā
prunam, quæ Solis vicem penset. Est & alia curā-
di ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusq;
in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento:
mox lineo colo transfusus reponitur. Utiliter in me-
dicamenta additur, quæ lassitudines & fatigatio-
nes leuant. Suillus adeps & vrsinus hoc curantur
modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum de-
tractus, in largiore aqua cœlesti, & quā frigidis-
sima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus con-
fricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq;
nova aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis du-
ple inditus, in aquam demergitur, & subditis leui-
bus prunis spatha mouetur: eliquatusque colo
transfunditur in aquam: vbi verò refrixit, & gut-
tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-
le demittitur, & infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quò facilius fæculentum vi-
rus pessum eat: postea in pilam spongia madefa-
ctam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens in imo
sordes eximitur. Tertiò citra aquam eliquatur,
repurgatusq;, fictili benè operculato, per quā fri-
gido locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum,
cervinumq; ita curato: Elotum ex his quodcūque,

LIBER SECVNDVS. 71

tunicis (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pila emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquod innatet sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem coni cito, & adiecta aqua, vt superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quae ante diximus facito. Tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratumq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem suum, renibus maxime detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum vero dissolutum fuerit, in fictilem ollam coni ciendum, et marina aqua, quae non minus dodrante superemineat, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicae cere drachmis: excolatumq; detractis quae pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: opertumq; Soli interdiu credendum, vt ad candorem reducatur, & odoris virus enanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperseris, liquefacito: dein in nitentem aquam excolato, & ubi concrefcere coepit, manibus iterum co-

DIOSCORIDIS

fricando vehemēter lauato, aqua sepius infusa re-
 fusaq; donec quā optimē elotum videatur: rur-
 sus in olla cum pari modo vini odorati decoquito,
 & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni vase,
 ibidē finito pernoctare: postridie si grauer adhuc
 oleat, noua olla repetitum, vino odorato perfunda-
 tur: eadem qua prius fiat, dum omne virus euane-
 scat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectio-
 num earū causa, quibus sal aduersari solet, sed ita
 paratum non magnopere albescit. Eodē modo par-
 dorum ac leonum pingua curari oportet. Taurinū
 autem & vitulinum pingue, necnō ceruinum, atq;
 etiam huius animalis medulla, odoramentis imbui-
 tur, hac ratione: Pingue, quod odoratū reddi debet,
 demptis, quæ diximus modo, membranis, elotum
 & vino quā odoratissimo, nulla maris aqua di-
 luto, feruefactum, pernoctare sinitur: alterū id ge-
 nus vinum eadem mēsurā infunditur, colliquatur,
 & exquisitē colatur: nouemq; eius heminis, iunci
 Arabici septem drachmæ. Quod si ipsum odoris
 fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiuslē
 drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casie
 modis adduntur: & xylobalsami, asspalathi singu-
 læ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, & nardi,
 singule vncie: omnia exactius tunduntur, & af-
 fuso vino odorato, in vase operto, quod supra car-
 bones firmiter collocatum sit, ter efferuescunt, &
 dempto ab igne vase inili pernoctant: postridie vi-

LIBER SECVNDVS. 72

um effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur:
 Ter simili modo bene conferuescat. Deinde matuti-
 nis exempto adipe vinum effundatur, & abluto
 vase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. Po-
 stremo eliquatum pingue & excolatum, ad vsus
 reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur,
 quod antea curatum est. Verum antè dicta prius
 inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum
 vires adsciscant. Itaq; assumens quodcumq; horum
 voles, cum vino feruefacito, impositis vnà myrti
 ramulis, serpyllo, cypero, item aspalatho plenius tu-
 so. Aliqui tamen ad hunc vsus, vno duntaxat ho-
 rum contenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exē-
 ptum leniter, & linteo colatum, aromatis, vti ex-
 positum est, imbuitur. Adipibus spissamēta sic fiūt
 (quemcumq; acceperis, oportet ut recens tundatur)
 Syncerus & sanguinis expers adeps, reliquas ha-
 bens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouam
 demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod
 semipedis altitudinem superet: lēto igni feruescat,
 dum uernaculus odor aboleatur, planeq; vinum re-
 doleat. At ubi deposito uase refrixit, due adipis
 minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sex-
 tarij, & seminis loti, eius, inquam, cuius è ligno
 ludicra tibie factitantur, tusi minæ quatuor adij-
 ciuntur: lento igni subinde miscendo decoquantur
 cūq; odoris uirus euanuerit, excolatusq; adeps refri-
 xerit, una contusi aspalathi mina, cum amaraci-

DIOSCORIDIS

ni floris minis quatuor, & vetere vino subigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntue. Post tridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus vini, una feruescunt, quousque & vim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit: qui eliquesces colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguisime myrrhæ vino macerate, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Callinaceus anserinusque sic odoribus imbui solent: Cuiusvis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur: erysi sceptri, xylobal sami, palmæ elatæ, & calami planè contusi, singulorum sesquicia admiscetur: vini Lesbij veteris cyathus unus adijcitur: ea ter effervescent prunis, mox vase sublato ab igne, die noctuque refrigerantur: post tridie liquata per linteum crassum, mundum in uas excolantur. Vbi vero adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstate si quidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & ursinus, ceterique id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse representabit hoc modo: Curati quam optime adipis, præsertim taurini, mina una, tempestinique sampsuchi exquisitè cōfracti, sesquimina miscentur

LIBER SECVNDVS. 73

ſcentur, & inſperſo largiore vino degeruntur in of-
 fas, quæ in vaſe cooperto nocte quieſcunt: matutini-
 nis in fictili olla leuiſculo igni, affuſa aqua, leui-
 ter coquuntur: dumq; ſuum adeps odorem exuerit,
 defœcatus ac bene opertus, nocte tota permanet: po-
 ſtero die deterſa ſorde, quæ peſſũ ierat, ſampſuchi,
 vt dictum eſt, contuſi iterum ſeſquimina priori pa-
 ſtillo adiicitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs
 quæ diximus peractis, decoquitur & colatur: & ſi
 quæ fundo hæſit ſpurcitia, deraditur, & frigido lo-
 co reconditur. Siquis tamen incuratum adipem an-
 ſerinum, gallinaceum, aut vitulinum, à putredine
 tueri velit, ita faciendum eſt. Quemuis adipem dili-
 genter elotũ & ſiccatum in vmbra ſuper cribrũ,
 per lintea munda manibus vehementer exprimat,
 linoq; conſutũ vmbroſo in loco ſuspendat, & poſt
 multos dies noua charta inuolutum, frigido loco re-
 condut. Pingua autem indito melle vindicantur à
 putre linis vitio. Vis omnium eſt excalfacere, molli-
 re, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus, & vituli-
 nus aliquantũ adſtringunt: earundem virium com-
 pos leoninus: nam reſiſtere eũ aiunt ijs, qui inſidias
 moliuntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, ſerpẽ-
 tes fugiunt. Adſtringetior eſt caprinus: qua ex cau-
 ſa decoctus cũ polenta, rhoe, & caſeo, dyſentericis
 datur, & cam ptisanæ ſucco infunditur. Ius deco-
 cti phthiſicis in ſorbitiõibus prodeſt. Datur quoq;
 vtiliter ijs qui cãtharidum venena hauſerũt hirci-

K

DIOSCORIDIS

nus, ut qui validissimè discutiatur: podagricis auxiliatur, cum fimo caprae & croco impositus: huic proportionē respondet ouillus. Suillus uerò contra uulua & sedis uitia idoneus est: ambustis igno medetur. E sue uetustissimus quisq; sale conditus excalfacit & emollit: elotus uino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corporis cōcolores reddere. Anserinus galinaceusq; cōueniunt mulieribus malis, et ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, et contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fuluiatiliū piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, et melli admisceantur. Viperae adeps cōtra oculorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo uetere: pilos alis euulsos perunctis radicibus recens et per se illitus obliterat, atq; renasci non patitur.

Medulla. Cap. LXIX.

Laudatissima est ceruina, mox uitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Collicuntur aestatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, in quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullae molliunt,

calfaciunt, rarefaciunt: ulcera explēt, ceruina per
unctos uenenata fugiunt. Curātur recentes, adipis
modo, aquæ respersu subactæ, scelectisq; ossibus
tantisper elotæ, et in linteum expressæ, donec aqua
syncera emanet: et deterfa sorde penna, si qua in-
natet, liquatæ in duplicato, uase in pilam exprimū-
tur: & ubi coire, omni fæce, quæ ad ima sedit, dera-
sa fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas
reponere, facito omnia quæ de anserum & gallina-
rū adipe demonstrauimus.

Fel. Cap. LXX.

FEl omne curatur hoc modo: Recens præligato
ore folliculi lino tandiu demissum in feruentē
aquam, dum quis spatium trium stadiorū percur-
saret, mox exemptum siccatur umbroso loco, asper-
ginem nō redolente. Sed quod ad oculorum medica-
menta adijci solet, ligatū lino in uitreum uas, quod
mel habeat, immittitur: circūuoluto ad os uasis li-
ni principio, et operto uase reconditur. Est enim uis
omnium acris et exalfaciens intensis tamen et re-
missis uiribus differunt: si quidem præstantius in
effectu esse uidetur fel marmi scorpionis, & piscis
qui callionymus apellatur, marine testitudinis,
hieneq; item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, &
syluestris capræ: quod priuatim prodest cōtra sus-
fusiones incipientes, et oculorū caligines, argemas,
et genarum scabritias. Onillo, suillo, hircino atque
ursino, taurinū multo efficacius. Felle omni per fas-

K ij

DIOSCORIDIS

cilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tormentum aut fimbriam sedi subijciat. Privatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur, & si bilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris & circumlitionibus, quæ contra venenata parantur. Phagedænicis ulceribus, colis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quam optime purgat. Ouillum & ursinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstant. Ursinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus indutum comitiales erigit. Sylvestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillam autem contra aurium ulcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

Cap. LXXI.

Sanguis anseris, anatis & hœdi, utilissime in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lasciosisque illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & leporis sanguis inassatus sartagi-

LIBER SECVNDVS. 75

nè, dysenterias & coeliacorum profluvia sistit: in vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lentiginēsq; emaculat. Caninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marine autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitq;. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt, septica vocât. Sanguine chameleonis genarum palpebras euellô creditum est. Hoc enim viridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis foeminarum, circumlito conceptum inhibere existimatur, aut si omnino mulier menstrua supergrediatur: leuat podagra dolores & ignem sacrum, illitus.

Fimum.

Cap. LXXII.

Amentarie bouis fimum, si recens admouatur, vulnerum inflammatione: mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus fotu compefcit: illitum ex aceto duritias, panos, & Arumas discutit. Prinatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentes vulua reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

K ij

DIOSCORIDIS

Fimum caprarum, præsertim in montibus degens-
tium, potum in uino, regium morbum emēdat: mē-
ses cit cum oloramentis haustum, & partus euo-
cat: tritum in farinam, & impositum lanis cum
thure, sceminarum profluvia sistit, ceterosq; san-
guinis impetus ex aceto cohibet: medetur alopecijs
exustum, & cum aceto aut oxymelite illitum: cū
axungia uerò impositum, his, qui podagra tentan-
tur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum im-
ponitur serpentium morsibus, ulceribus quæ ser-
punt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadici
ustionem hunc in modum accipiunt: In eo intersti-
tio ubi pollex brachiali committitur, caua ueluti
lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substerni-
tur, deinde sigillatim feruentes stercoris caprini
pilule imponuntur, dum uapor per brachium ad
coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem
mitigare: adustio id genus Arabica appellatur.
Ovillum ex aceto illitum sanat epinyctidas, cla-
uos, pensiles uerrucas, thymos, & ambusta igni,
rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syuestris ari-
dum, in aqua aut uino potum, reiectioes sangui-
nis sistit: uetustum lateris dolorē mulcet, adrupta
& conuulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato
rosaceo medetur. Tam asinorum quàm equorum
fimum siue crudum siue crematum, addito aceto,
sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui her-
ba pascitur, siccam fimum liquatum in uino, mox

potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius et excalfacit et urit, cum hordeacea farina mistū strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cū melle, lini semine & oleo: ambustis igni medetur. Galinaceum uerò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra uenena fungorum, et coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, ad opeccis medetur: cum thur & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat, sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescent, quæ cū teritur, fermenti acorem quādamtenus refert. Adu terant eam sturnorum fimo, quos captos oryxæ pascunt, ipsumq; non dissimile uendunt. Alij amyllum aut cimoliam miscent, et adscito anchusæ colore per rarum cribrū paula-

DIOSCORIDIS

tim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea veneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

Urina.

Cap LXXIII.

Humanam urinam suam cuique bibere, cōtra viperæ morsus, ac venena, incipiētemq; aquā inter cutem proderit scorpionis, viperæ marinorū, draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus et lepras nitro addito expurgat, sed vetus vlcera capitis manantia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multò magis abstergit nomas, & præcipuè genitalium: cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decocta q; in calyce mali punice, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur decocta in aereo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat feruesfactum cum cyprino, inditumq; vuluæ dolores mulcet: strangulatus lenat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicae calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum

extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitijs mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coiréue in calculi duritiam, vulgò creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asininae urinae potu renu vitia sanari traduntur.

Mel.

Cap. LXXIIII.

P Rincipem locum obtinet mel, quod Atticae regionis est, præcipue ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hybleu. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, subflauu, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod obsequacem lentitiam non facile abrumpitur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergerendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida vlcera sinusq; commodissime infunditur. Decoctum atque impositum, abscedentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum lino quido alumine & illitum, item aurium sonitui et dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & foeda capitis animalia illitum necat, nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo lineo triginta diebus emolliatur: oculorum calis

Mellis

probatio qualis.

volatilis,

vesiculae pel-
lis a p[ro]prio

DIOSCORIDIS

ginem discutit, faucibus, tonsillis, anginae collutū
gargarizatumue medetur: urinam ciet, auxilia-
tur tussi, & à serpente percussis: contra haustum
meconium, cum rosaceo calidum assumitur: aduer-
sus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus in-
etum aut potum proficit: crudum tamen aluum in-
flat, tussim laceßit, & ea de re despumati usus ap-
tior est. Primatum tenet in mellis genere uernum,
deinde aestiuum: hybernium uerò, utpote quod cras-
sius constet, deterimum reputatur, ceraginis hali-
tum expirat. Quod in Sardinia gignitur mel, ama-
rum est: quoniam apes inibi absynthio uescantur
quo uitia cutis in facie & maculae aptissime per-
unguntur. Heracliae in Ponto quibusdam anni tem-
poribus, propria quorundam florum dote, mel con-
flatur: quod qui edere, mente abalienantur, ac su-
dore disfluunt. Remedio sunt, esitata ruta, & sal-
samenta, aut epotum mulsum, resumpta, quoties
uomitione reijciuntur. acre autem est, & olfactu
sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, fœ-
minarum cutem emendat, & cum sale sugillatio-
nes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod
saccharon nominatur. In India uero, et felici Ara-
bia in arundinibus inuenitur: salis modo coactum
est, dentibus, ut sal, fragile, alio idoneum, et stoma-
cho utile, si aqua dilutum bibatur: uexatae uesicae
renibusq; auxiliatur, illitum ea discutit, quae tene-
bras oculorum pupillis offundunt.

Mel Sar-
doñ ama-
rum.

Saccha-
rum.

LIBER SECVNDVS. 78

Cera.

Cap. LXXV.

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, et halitū quadāmtenus mel-
leū referens, natione Pōtica, aut Cretica.
Secundum locum obtinet candidās, et suapte natu-
ra pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radūt al-
bum sincerumq; atq; transfundūt in uas, quod sa-
tis habeat marinæ ex alto petitiæ, inspersoq; nitri
momento decoquūt: eumq; iterum tertione inferbuit
separatū uas refrigerant, ac ceræ pastillū eximūt,
deteresa sorde, si qua fortē adhæsit: tū denuò indita
noua maris aqua feruet, uti retulimus: et uase dē-
pto ex igne fundum ollula nouæ aqua frigida ma-
desactum, in ceram summam suspensa manu in-
tingunt, quò celerius concreseat, et quā minima
portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo,
iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper
in ceram immitti debet, dum tota excipiatur. Orbi-
culi lino consuti, interuacāte spatia, suspendūtur,
et iterdū, cōtinuò sub sole, noctu sub luna aspergū-
tur, usq; dum perfecte albescant. Verū si eximius
ille candor desideretur, eadem faciliari, & identi-
dē recoqui opere pretiū est. Nec desunt, qui pro ma-
rina, in murina quam accerrima semel aut iterum
excoquāt. dein laguncula tenui, rotūda ansam ha-
bēte, extrahūt: postea orbiculos, substrato affatim
caespite herbofo, insolant, donec cādorem summum
cōtraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus uere,

DIOSCORIDIS

cū sol remissa vehementia humorem pariat, vñ
nō facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, modice
explet corpora: datur in sorbitione dysentericis ac milij
magnitudine decem grana cere hausta, lac in nutricibus non
patiuntur coagulari.

Propolis. Cap. LXXVI.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens,
in vehemēti ariditate mollis, & mastiches more ductili.
Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, et omnia infixa corpori
extrahit, in veterē tussi suffita proficit, impetigines admodum tollit
ea in alueariorū foribus, cerose nature inuenitur.

Triticum. Cap. LXXVII.

Optima ē tritici generibus ad secundā valetudinis
vsus habentur, quę recentia, & iā perfectē adulta,
colorem luteum referunt. dein sequuntur trimestria,
quę nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda in
cibis teretes tineas gignūt, canum morsibus profunt,
mansa & imposta: confectus eorum similagine panis,
plus alit, quā cibarius, ē trimestrium farina panis
leuiorem cibum prębet, & qui facile in membra
demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo
illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Gręci
rheumatismos vocant. Item contra interaneorum
inflationes, lentigines ex aceto mulso tollit.
Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes
mammās sedant viperarum ictibus auxiliantur, &
torminosi pro

LIBER SECVNDVS. 79

sunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahē
diq; vim habet priuatim callos pedum, clauosq; ex-
tenuat, et cetera tubercula furunculosaq; ex sale cō
coquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra vene-
natos iētus cū aceto aut vino cōmodissimē illinitur:
eadē si decocta inglutini modum delingatur, cruen-
tis excreationibus proderit: contra tussim, & exa-
speratus arterias, cū mentha & butyro decocta, ef-
ficax est. Tritici pollensi. ex aqua mulsa, aut hydre
leo decoquatur, omnem dis. utit inflammationem.
Panis & crudus, & coctus cum aqua mulsa inflā
mationes omneis illitu mulcet, cum emolliat, et qua-
dāmtenus refrigeret. sed herbis succisue huic rei ac-
cōmodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adie-
ctis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens
muria maceratus, illitu vetustas ipetigines sanat.
Glutinum ex similagine, et polline, quo chartæ glu-
tinantur, sanguinē excreantibus prodest, si liqui-
dus ac tepidū cochlearis mensura detur sorbendū.

Hordeum. Cap. LXXVIII.

Hordeum optimum est candidum purū me-
que: id minus quā triticum alit. Ptisac-
na tamen ob cremorem in decoctione red-
ditum, plus alimenti præbet, quā polenta ex hor-
deo facta. Contra acrimonias atq; gutturis scabri-
tias, exulcerationesq; pollet. quibus etiā triticea pti-
sana præsidio est: sed plus alit, magisq; vrinā mo-
net. Lac abūde suppeditat, si cū feniculi semine de-

DIOSCORIDIS

cocta sorbeatur. Hordeum absterget, urinā ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumore concoquit. Farina hordeacea decoquitur in malsa aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq; discutiat: duricias cum resina, & simo columbarum concoquit: cum melioto autem, et papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorum inflationes cū lini semine, foenograeco, et ruta, illini iuuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo, et impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut uino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus, cū cotoneis aut aceto prodest. decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita lepris medetur. Cremor uero farinae ex aqua, atq; cum pice, et oleo decoctus, puri mouēdo est: cum aceto subactus itidē, et cū pice, cōtra articulorū fluxiones prodest. Farina ex his aluū cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum. Cap. LXXIX.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit, renes & neruos tentat membranis, praesertim cerebrum uescientibus, officit. inflationem parit, uitiosum succum creat, elephantiasin gignit, persusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi. Cap. LXXX.

Fit & ex hordeo potus, quē curmi nominant,

LIBER SECVNDVS. 80

eoq; saepe potu pro uino utuntur: uerum dolorē capitis mouet, malū succum gignit, neruis nocet. Con similia etiā potius genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quae occidentem spectat, & Britannia.

Zea seu semen. Cap. LXX XI.

Zea duorum generum est: una simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iungit. Vulgo splet a. Et gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quam hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

Craffior farina. Cap. LXXX II.

Crimnon craffior est ex zea triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abundē alit, facile conficitur, aluum uehementius adstringit, si zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. Cap. LXXX III.

Eidem generi siligo adscribitur, sed minus alit, quanto nutrit: in panes, ut zea cogitur. Fit quoque ē siligine craffior farina, quam Graeci crimnon uocitant.

Athera. Cap. LXXX IIII.

Athera ex zea fit tenuissimē molita: est autem sorbitio, quasi liquida pulicula, infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

Tragos. Cap. LXXX V.

Tragos quandam halice frugis figuram gerit: multo minus, quam zea nutrit, quod multum aceris habeat, quare egrius conficitur.

DIOSCORIDIS

aluumq; magis emollit.

Auena. Cap. LXXXVI.

AVena, genicula quædam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeum. Pulte huius aluus sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza. Cap. LXXXVII.

ORyza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum suppressit.

Halica. Cap. LXXXVIII.

Halica fit ex zeu, quam dicoccon appellauimus: plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet, stomacho longe vtilior. decocta in aceco illitaq; lepras tollit, vnguium scabritias extricat, incipientibus & gilopys medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium. Cap. LXXXIX.

Milium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum, urinam cit. Torretur milium, seruensq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foveatur, auxilio sit.

Panicum. Cap. XC.

Panicum, frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. eodemq; modo in panes subigitur:

LIBER SECVNDVS. 81

subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nō trit, & stringit.

Sesama.

Cap. XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus, halitus graui statem facit, quoties inter mandendum commisuris dentium inhaesit: neruorum crassitiem illitē discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ morsibus: capitis dolores, qui estuatione concitantur, ex rosea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, praesertim inflammationibus oculorum doloribusque prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium.

Cap. XCII.

Lolium, quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, putrescentia vlcera, gangrenasque emarginat: sanat cum raphanis, sale & aceto ferros lichenas, & ex aceto, et sulphure viuo, lepras: strumas quoque discutit, cum fimo columbino, & lini semine decoctū in vino: rūpit, quae egrius ad coctionem perducuntur. Decoctū ex aqua mulsa, utilissimè ischiadicis illinitur: si cū polēta, thure, myrrha, aut croco suffiatur conceptionem adiuvat.

Amylum.

Cap. XCIII.

Amylum ex eo appellatum est, quod si ne mola fiat. Optimum ex trimestri natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciendi amyli haec est: Purgatum trimestre triticum madefacit quinque die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum

I.

DIOSCORIDIS

fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis vnà excludatur, vbi mollissimum esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teritum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximēdi, reliquumq; quallo sportisq; siccatum tegulis nouis cōfestim torreatur flagrantissimo in sole: nāq; si paulisper vdim maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cavaq; vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lachrymā atq; obsonijs admiscetur. Fit etiā amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subacta farinae modo manibus subigitur: pressaq; feruētissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius ī medicina vsus, ad alia tamē cōueniēs.

Fœnumgræcum. Cap. XCIIII.

Fœnigræci farina vim habet emolliendi discutiendique: in aqua mulsa decocta aduersus tā internas, quā externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, sicū anserino adipe pesti vice subiiciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentiētibus. Decoctum eius prodest aduersus tenebras,

LIBER SECVNDVS. 82

foetidamq; dysentericorum proluuiē. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos & genitaliū cicatrices absterget.

Linum.

Cap. XCV.

Linum vulgò notum est, cuius semen easdem, quas foenum graecum, vires habet. Discutit, et emollit omnem intus forisq; inflammationem, cū melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: vitia cutis in facie varosq; crudum tollit, illitum cū nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiasq; discutit: vlcera, quæ serpunt, fauosq; cū vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pectorij extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituat: tussim lenit, venerem stimulat: si farina piperris, & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum vulnūq; erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vulnū inflammationes in defensionibus perquā vtile.

Cicer.

Cap. XCVI.

Cicer sativum aluo idoneum est, urinam ciet, inflationem parit, colorem commendat, menses ac partus expellit, lac auget, cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, verrucosas infectiones, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginesq;: contra carcinomata, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, cum melle & hore Cicer adeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur rictinū.

L ij

DIOSCORIDIS

tur: utrunq; cit vrinas, dato cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vesicam, & renes. In verucarum formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas tagunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se precipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs sativo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod sativum præstat.

Faba.

Cap. XCVII.

Faba inflationem excitat, ægrè concoquitur, tum multuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cū suo cortice esitata, dysenterias, et cœliacorum profluvia sistit: contra vomitiones cōuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cōcolores facit, turgentes grumoso lacte mamas, etiam si inflammatione tententur, adiuvat: lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum fœnigræci farina & melle discutit: cum rosa autem, thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, vnasq; reprimit: subactum vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertēdas fluxiones, frō

LIBER SECVNDVS. 83

ti illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quò tardius purem erumpat, pueris imò vètri illinitur: vitiligine purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescent, & minus alimenti capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo ipositi cortices, strumas discutunt: decocto earum lana inficiuntur. Faba depto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi, solet sanguinis defluxionibus ab hirundine concitatis: nanq; eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. Cap. XCVIII.

Aegyptia faba, quam aliqui Ponticā vocāt, in Aegypto & plerunq; prouenit: in Asia èt Ciliciæq; laculus inuenitur. Folia habet ampla & etiam si ad arborum frondes cõparentur, caulem cubitalẽ, digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaueris amplitudine: & vbi flore exuitur, fert folliculos vesparum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullæ modo, prominet. Ciborion aut Cibotion ideò nomināt, id est arculam, quoniã feratur ipsa, humenti glebæ madata, et ita in aquã demissa. Radice firmatur harum dine crassiore, quæ cruda coctãue estur: ei colocasia nomen est. Faba virens manditur, et exiccata nigrescit, vulgare magnitudine superat. Adstringedi facultatẽ obtinet, et stomacho vtilẽ: disentericis, cœliacisq; prodest, in sparsa, polenta vice, lomẽ

* ωλες
OTOS id ē
plurima
* Sic
Plin. lib.
21. c. 15
Græcus
habet,
ὡς πέντα
στον id ē
ἵσταρ γα
λερι.

DIOSCORIDIS

to: datur quoq; in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si tenui inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

Cap. XCIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, egrè coquitur, stomachum malè habet, eūq; & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi: qua ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primaq; aqua intercoquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmōi inutilis: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis aut mespilis, sorbifue, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quæ post decoctionē abijciuntur, vel ruarum rhois, quæ absoniis insparguntur. verū acetū cum eo diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionē stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum polenta, et illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in

LIBER SECVNDVS. 84

aceto duritias & strumas discutit, cū cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, et hic quæ serpūt, igni sacro, permionibusq; ut antea dictum est. cōtra mammas, in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

Phasioli.

Cap. C.

Phasioli inflāt, spiritus ciēt, egre coquūtur. Virides cibo aluū emolliūt, ad vomitiōes idonei.

Eruum.

Cap. CI.

Eruum paruus frutex omnibus cognitus, an-
gusto folio, tenuis, semina in valvulis habēs, Officinis
e quibus farina sit, nomine eruina, ad medendi oroibus,
usus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluū greca ap
esu turbat, sanguinem per vrinam extrahit, elixo pellatiōe
boves saginantur. Parandæ farine ratio hæc est: vocatur.
Vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscen-
dōque aqua respergunt, donec sufficienter combi-
bant: postea torrentur, vsque dum hians cortex
disrumpatur, molitaq; farinario cribro incernun-
tur, postremò farina reconditur. Hæc aluo utilis
est. vrinam ciēt, meliorem colorem efficit, sangui-
nem per vesicam aut aluum cum torminibus elio-

L iij

DIOSCORIDIS

cit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cū melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie & maculas totūq; corpus emendat: nomas, gāgre nas, duritiasq; serpere nō patitur: mām arum duritias emollit, atra vlcera, quæ theriomata vocāt fauosq; emarginat, carbunculos rūpit: cum vino subacta illitu morsibus viperarū, canū, hoīumq; medetur: vrinae difficultates tenesmosq;, ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptū, sumptumq;, conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Lupini.

Cap. CII.

S Atius lupinus notus est: cuius farina cū melle delinctu, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, et cū sua amaritudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta & pipere potum: quare lienosis prodest. Eodē vlcera tetra, quæ theriomata vocant, gangrenas, incipientem scabiē, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, uiriligines, maculasq; fouere vtilissimum. Menses et partus extrahit, cum myrrha et melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liorēsq; corrigit, inflammationes cum polenta & aqua mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit, strumas in aceto cocta illitaq; dissipat, carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua,

donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamæleontis, ita vt tepente decocto abluantur. Cit vrinā radix cum aqua cocta. Lupini triti vbi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidiū detrahunt, & cibi auiditatem faciunt. Gignuntur & syluestres lupini, satiui similes, sed omnino minores, qui eadem, quæ satiui possunt.

Rapum.

Cap. CIII.

DEcocta rapæ radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerem stimulat: decocto podagræ, pernionesq; fouentur, cōtritoq; rapo atque imposito iuuantur: si excauatæ radici rosaceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet, Cymæ eius decoctæ māduntur, & vrinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodina vocāt, idoneum est: potum contra venena salutare est, venerem concitat. Rapum muria conditum, minusimenti sufficit: sed multo magis appetentiam recreat. Syluestre rapum in aruis nascitur, & fruticosum incubi & Vox ti altitudinem assurgens, ramosum, læue: in cacumine folia fert lævia, digitali latitudine, aut maiora: & fructum in siliquis calyculatis: cumq; eorū inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina parua concipiuntur, feris nigra, intus alba.

DIOSCORIDIS

Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, utimur: præsertim q̄ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solēt.

Napus.

Cap. CIIII.

COcta napi radix inflat, modicum alit. Semē eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

Cap. CV.

Radix (que Græcis raphanus dicitur) exal-
facit, flatus gignit, ori suavis est: sed stoma-
cho aduersatur, ructus ciēt, urinam pellit, aluo
aptior: summo tamen cibo sumi debet, quò magis
eius distributionē adiuvet: quum aut præsumitur,
cibum suspendit: quare vomituris cōmodissimē da-
tur ante cibum. Sensuum aciem excitat: decocta cō-
tra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pecto-
re, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vo-
mitiones mouet: hydropicis cōmodissimē illinitur,
lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & uomas
amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur, alo-
pecias ad pilum reducit, lentigines cum loliacea fa-
rina emendat, his qui fungis strangulantur, tam
cibo quàm potu salutaris est. Semē vomitiones fa-
cit, urinam mouet, menses cit, lienem extenuat, cū
aceto illitum gangrenas validissimē emarginat:
coctum cū aceto mulso anginis perquam utiliter
gargarizatur, cōtra cerastis morsus, potum ex vi-
no, auxilio est. Sylvestris raphani, quam Romani

LIBER SECVNDVS. 86

armoraciam vocāt, folia satiuo similia, sed magis
lampsanam imitantur: radix gracilis, & tenera, & mala
subacris. Tam foliū quā radix in olera recipitur: & id est,
sed hæc excaesfacit, vrinam concitat, æstiosa est. mollis.

Sifer.

Cap. CVI.

Sifer vulgo cognitū, cuius radix decocta ori gra-
ta est, & stomacho utilis: vrinam ciet, & ap-
petentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. Cap. CVII.

EX generibus rumicis, oxylapathum vocant,
quod in acutum tendit, dura habens extre-
ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi lapatiū.
dissimilis. Tertium genus syluestre, paruum, plan-
tagini proximum, humile & molle. Quartum est
quod alij & oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon
vocant. Folia eius syluestri ac exiguo rumici simi-
lia, caule non magno, semine subacuto rubente, sa-
acri, in caule & agnatis appendicibus, emicante.
Omnium decocto olere aliis emollitur. Crudi illi-
tu, melicerides, rosaceo aut croco adiecto, discus-
tiuntur. Syluestris & oxylapathi, & eius, quam
oxalida nominant, semen ex aqua aut vino utili-
ter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum af-
fectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod
si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu pa-
tietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, le-
pras, impetigines, & scabrosos vngues persanant:
sed antea locus aceto & nitro in sole perfrican-

DIOSCORIDIS

dus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si
 foveatur, aut in solijs balnearū conficitur. Coctæ
 in vino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem
 mulcent, strumas parotidasq; discutiunt, lienem cū
 aceto extenuant. Aliqui amolien. lis strumis radi-
 cum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tri-
 tæ & admotæ fœminarum profluvia sistunt: cum
 vino autem potæ regio morbo medentur, calculos
 vesicæ comminuunt, menses cient, scorpionum iētis-
 bus auxiliantur. Hippolapathonolus est magnum,
 in paludibus nascens: easdem habet vires, quas su-
 pradiēta rumicis genera.

Lampfana. Cap. CVIII.

L Ampfana sylvestre olus est: plus alit quàm ru-
 mex, & stomacho vtilius. Cuius folia can-
 lesq; coquuntur in cibo.

Blitum. Cap. CIX.

B litum estur oleris modo, aluo vtile est, nullius
 in medicina vsus.

Malua. Cap. CX.

M Alua sativa, esui longè aptior sylvestri: sto-
 macho aduersatur, aluum iuuat, sed multò
 magis caules: interaneis & vesicæ vtilis. Cruda fo-
 lia cum salis exiguo manducata, ægylo pas ex mel-
 le sanāt: verum cū cicatricem trahere cœperint,
 ea demum citra salem vtendum est. Cōtra aculea-
 tos apium vesparumq; iētus illita efficax est. eadē
 cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlce-

LIBER SECVNDVS. 87

ra manantia in capite furfuresq; cū vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia, tritaq;, vtilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in sefione mollit prodest erosionibus vesicæ, et intestinorum, vuluæ, sedisq;, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia venenā auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est, lac euocat. Semen in vino potum addite loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

Atriplex.

Cap. CXI.

Atriplicem aliqui chrysolachanō vocant, cognitum olus est. Duo eius genera, syluestre et satium. Coctum estur, vt olus. Aluum mollit, panos discutit, siue crudū, siue coctum illinatur. Semē cum aqua mulsa potum, regium morbū sanat.

Brassica.

Cap. CXII.

Brassica satina aluo est idonea, si modo leuiter ferue facta edatur (nam percocta aluū sistit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur) stomachum autem malè habet: acrior est æstiuā. In Aegypto propter amaritudinē nō estur. Cecutiētibus, & tremulis esse prodest: summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxā restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condita stomacho inimica est, aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus aluum mollit: cum vino quoque

DIOSCORIDIS

epotus viperarum morsibus auxiliatur: cum fœ-
nigræci farina podagris & articulorum vitijs il-
linitur: prodest & sordidis vlceribus & vetustis
illitus caput purgat naribus infusus: menses extra-
hit cum loliacea farina inditus. Folia per sese illi-
ta, aut cum polenta trita, conferunt inflammatio-
nibus, tumoribusq;: epinyctidis, ignem sacrum, le-
prasq; sanant, carbunculos ex sale rumpunt: fluen-
tēs capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus
depascentia vlcera, gangrenasq; valent, lienosisq;
ex aceto cruda profunt. Mansa, deuorato succo, re-
tusam vocem instaurāt. Decoctum eius potu, aluiū
& menses ciet. Flos post cōceptionem in pessō sub-
ditus, partum abortu vtiat. Semen eius, præsertim
quæ in Aegypto nascitur, potum timeas repellit: in
antidota theriaca additur. faciei cutem lētiginesq;
expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, et
adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolo-
res mitigant.

Brasica syluestris. Cap. CXIII.

Syluestris brassica, maritimis præruptisue
locis, magna ex parte gignitur: satiuæ simi-
lis, sed candidior, hirsutiorq; , amara: cuius
cyma in lixiuia cocta, ori non insuavis. Folia illitu
vulnera conglutinant, & inflammationes tumo-
resq; d'scutiunt.

A N N O T A T I O.

Contendunt doctissimi quique eā esse

herbam, quam vulgò Soldanam, aut Soldanellam vocitant: quæ certè aristolochiâ rotundam, vt à Dioscoride hic depingitur brassica marina, folijs adamussim repræsentat. Quòd autem in descriptione prælonga quoque adiiciatur, mendosum planè suspicamur, ac fortè pro $\mu\alpha\chi\rho\alpha$ vt Græci codices habent, legendum $\mu\iota\chi\rho\alpha$ id est, parua: quod & ipsum Soldanæ nostræ pulchrè respondet. Quomodo enim folia brassicæ marinæ prælonga rectè dixeris, si aristolochiæ rotundæ folijs similia? quæ cum ex eius descriptione, tum oculata fide non in longitudinem protensa, sed circinata fere esse rotunditatis, sæpe cõperimus. Suū tñ cuique in hac re esto iudiciū.

Brassica marina. Cap. CXIIII.

Marina brassica à satina prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeūt, singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed paucò, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, vehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniâ cum pingui carne.

Beta. Cap. CXV.

Beta duorum generum est, è quibus nigra coquitur cum lenticula, vt ventrem sistat: quod

DIOSCORIDIS

* Anti- magis radice eius præstat. * Candida aluo vti
 qui hoc lis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem,
 genus be quem habet in se, noxi succi est. Vnde succus earū,
 te, ut au cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium do-
 thor est loribus auxiliatur. Decoctū radice & foliorum,
 Theo = furfures lendesq; deterget permiones fotu mitigat.
 phrastus Crudis folijs vitiliginis, nitro antea perfrictas, alo
 Siculum peciarū inanitates, scapello prius exasperatas, atq;
 uocarūt: depascentia vlcera, illini prodest. Eruptionibus pa-
 quorum pularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.
 exemplo

Portulaca.

Cap. CXVI.

extrita
 una tan-
 tum lite
 ra Sicla
 hodie di-
 citur.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus, in-
 flammationibus oculorum, cæterisq; cū polen-
 ra Sicla ta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igne, vesti-
 hodie di- cæ doloribus, auxilio est: commanducata dentium
 citur. stupores sedat: stomachi & intestinorum estuatio-
 nem, fluxionesq; mulcet: renes et vesicam adiuuat,
 etiam si erosionem sentiant: veneris impetus exol-
 uit: succus epotus simili effectu prodest, in febris
 valens. Cōtra teretes ventris tineas, cruentam ex-
 creationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & pro-
 fluvia sanguinis, percocta efficax est. Item contra
 sepi morsus. Ocularibus medicamentis utilissimè
 commiscetur, interaneis fluxione laborantibus, atq;
 vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores,
 quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo foue-
 tur: eruptiones papularum in capite, cum vino emē-
 dat:

dat: vulneribus que ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

Asparagi.

Cap. CXVII.

Officinis

Corruda, siue sylvestris asparagus, vulgaris spara-
est notitie. Huius cauliculi in cibo cocti ven-
gus.

trem emolliunt, vrinam cient. Radicis decoctum co-
tra vrine difficultatem, regium morbum, renum
vitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit: cō
vino aut, phalangiorum morsibus auxiliatur. Si
decocti succus super dente contineatur, eius dolori
medetur. Semen potum ad eadem valet. Canes, vt
aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagiū
etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis,
atque defossis: quod quātum equidem sentio, planē
a veritate abhorret. * Altilis aut asparagus mul co codice
tis ramis fruticat, folijs fœniculi, lōgis, numerosis: hæc ad
radice rotunda, grandi, spongiam habete. Huius te sylvestrē
neri cauliculi triti in vino albo, renum dolores se-
quoque
dāt. Assus aut coctusue, vrine stillicidium, difficu-
aspara-
tatemq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino gum res-
aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cū ferūtur,
ficis aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat: nec fit al
coxendicis cruciatus stranguriamq; leuat. Alliga-
tilis men-
ta radix, aut haustum eius decoctum, conceptum tio. Mar
adimit, & sterilitatem adfert.

cello aut

Plantago.

Cap. CXVIII.

uidentur

DVo plātuginis genera: minor folia habet an- adulteris
gustiora, minora, molliora, leuio-
na.

M

DIOSCORIDIS

ra: cauliculo anguloso in terram inclinato: floribus
 pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera
 * Oleris maior, letior, virentiorq; latis constans folijs, * ole
 nomine racei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit,
 per anto angulosus, subruher, à medio ad verticem tenui se=
 nomasi à mine circūdatus: radicibus nititur teneris, hirsutis,
 Brassicā candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nasci=
 intellige. tur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo
 Nec enī vtilior magna est. Vim habet folia exicatoriam,
 simplici= constringentē: quare omnibus malignis vlceribus,
 ter ad q= & fluxioni opportunis atq; elephāticis, sordidisq;
 libet ole= illata profunt: profluvia sanguinis, vlcera quæ ser
 ra, quo= puit, epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibent:
 rū diuer vetera vlcera & inequalia cicatrice obducunt, chē
 sa admo roniam sanant, sinus conglutinant: morsibus canis,
 dum fa= ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidi
 cies, fo= bus, strumis, & gylopijs, illita cum sale profunt. Co
 lia plan= Etum cum aceto & sale olus, dysentericis, cœlia
 taginis cisq; sumptum subuenit. Datur & in locum betæ
 referri cum lenticula coctum. Et ad aquam inter cutē, cui
 possunt. leucophlegmatie nomen est, datur & herba deco=
 eta post aridas epulas, sic vt media antecedit: co
 mitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorū suc
 cus, colluta subinde oris vlcera, purgat: cū cimolia
 aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus pro
 dest, lippitudinibus & aurium doloribus idem suc
 cus instillatur. Additur quoq; in oculorū collyria.
 Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectioni=

bus, potu confert: clystere dysentericis infunditur, contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subijcitur, etiã si vulua fluxione laboret. Semẽ ex vino potũ, alui fluxiones et sanguinis excreationes sistit. Decocta radix et māducatu, & collutione, dentiũ dolores sedat: eadem cū folijs, vlceribus renum et vesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cū tribus vini cyathis, & pari aque modo, tertianis auxiliari: et quatuor, quartanis. Sunt qui radices gestamine, discutiẽdis strumis vtantur. Lauer seu Sium. Cap. CXIX.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu, calculos rumpunt, atque excernunt: vrinas cient, menses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. Desio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm menthe, nègra, & ad erucam accedentia. Officinis
Berula.

Sisymbrium. Cap. CXX.

Sisymbrium (aliĩ serpyllum sylvestre vocant) in solo inculto nascitur, menthe hortensis similitu Balsamidine, odoratius, latiore, folio. Inseritur coronis. Calta. facienti vim habet: contra stillicidia vrinæ, calculosq; semẽ ex vino bibitur: tormina et singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut tẽporibus illiuntur: itẽ contra vesparum apiumq; iẽctus. Vomitiones potu cohibet. Alterum sisymbrij genus, quod Vulgò na
sturiu
aqua ti
cum.

M ii

DIOSCORIDIS

aliqui cardaminam, alij sion appellant. Ea herba
riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, proue-
nit: quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod
gustu cardamum, id est nasturtium, repræsentet.
Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ mo-
do finduntur. Id excalfacit, urinas mouet, crudum
estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, nocti-
bus impositum, matutinisq; detractum.

Crithmum. Cap. CXXI.

Critimum, seu potius, ut aliqui, crithamō, fru-
tcosa & vndique foliosa herbula est, cubiti
altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, et
petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus,
ueluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso gu-
stu, flores candidi sunt, & semen, ceu roris marini,
odoratum, molle, rotundū, quod siccatū rumpitur:
habet intus tritici modo nucleū: radices digiti crassi-
tudine, tres aut quatuor, grati odoris & iocundi.

Radix, semen, et folia incocta vino, potu urinae dis-
Fuchsiso ficultati & regio morbo auxiliatur: menses cient,
Corno estur crudum coctū melle in olere, seruatur etiam in
cerui uul muria.

gō dictū. Coronopus. Cap. CXXII.

* στροπε **C**oronopus oblōga herbula est, per terrā * re-
peritur, id ē, fissis folijs: coquitur in olere. radicē habet
est, stramine tenuē, adstringentē, q̄ in cibo celiacis facit. Prone-
ta. nit in aggeribus, et locis incultis, & secus vias.

Sonchi duo genera: sylvestrior quidam est,
 & magis spinis horret: * alter teneritate * Vulgò
 quadam mollescit, cibus expetitus, anguloso rostrum
 caule, & inani, interdū rubente. folijs in ambitu per porcinū.
 intervalla dissectis. Vtriusque vis refrigerat, modi- * Vox ex
 cè adstringit: unde estuanti stomacho & inflāma Plinio re
 tionibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rosio posita.
 nes sorbitione mitigat, lac elicit, in uellere appositus
 sedis ac uulue collectionibus opitulatur. Tam her-
 ba quā radix illita uibratis à scorpione ictibus
 subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, lac-
 tis constans folijs: caulem in ramos exeuntē folia
 distinguunt, sed ad eadem pollet:

A N N O T A T I O.

Non video, quanuis & Græcus codex
 sic habeat, quō Seris satiua hortēsi, quod
 planè est idem, stomacho utilior dicatur:
 ut subesse errorē non parum suspicemur.
 Marcellus, qui aut integrius usus fuit exē
 plari, aut locū, quem & ipse corruptū iu-
 dicabat, restituere conatus est, sic vertit:
 latioribus folijs altera satiua & in cibus
 gravior.

Seris siue intybus. Cap. CXXIIII.

Seris duum generum est: altera sylvestris, quæ * Offici
 picris & cichorion uocatur: * altera satiua, nis sca-
 latioribus folijs, constat, stomacho quā hortenſis viola.

M ij

DIOSCORIDIS

utilior. Quæ iterum in duas species digeritur: una folio latiore prodit, lactucarū simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraq; refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: aliu sistit cocta, si cū aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quādoquidem æstuantē ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cū radice illita, percussit à scorpione subuenit, igni sacro cū polenta medetur. Succus cū cerusa, et aceto, valet ad illitus eorū, q̄ refrigerationē desiderant.

Condrilla. Cap. CXXV.

Condrilla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulē, flores, & folia habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronuntiarunt, verum tenuior tota est in cuius ramulis, gūmi mastiches simillimū & tuberculo fabæ inueniri solet: quod cū myrrha tritū, & linteo appositum, instar oliuæ, fœminarum menses trahit. Tusa cū radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod itē tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoveatur. Cōtra viperas in vino pota proficit. Succus decoctæ, in vino, aut per sese potus, aliu sistit. Aliud habetur chondrilla genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulem succo

* μενθαι
κυρμαία
id est, ma-
gnitudi-
ne fabæ.

madentē lacteo radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi vim habent. Succus incōmodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in letis, & cultis.

Cucurbita. Cap. CXXVI.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramēta eius infantibus contra capitis ardorem, quā syriasin vocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflāmationes podagrasq; refrigerant. Succus ē ramentis tussis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat: totius feruefactæ, et expressæ succus, cū melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinū in cucurbitam recētem excauatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum lenigabit.

Cucumer satiuus. Cap. XXVII.

Satiuus cucumis aluo & stomacho perquāmt utilis habetur: refrigerat, corruptionē non sentit, vesicæ prodest, olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semē modicē vrinam mouet: cum lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibis, vrinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti admota, oculorū fluxiones auertunt. Succus cum semine adiecta

DIOSCORIDIS

farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, qua faciem repurgant, & nitore afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, dragmæ pondere, vomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundū coenam uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quoque illita cum melle ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant.

Lactuca. Cap. CXXVIII.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur: somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: uerū decoctæ magis alunt. stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinū imaginationes in somno, compescit, & ueneri refragator. Ipsæ uero frequentiores in cibo, claritati oculorum officiunt: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur, muria cōdiuntur. Cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscuntur, succo aut lacti syluestris lactucæ similem.

Lactucæ syluestris. Cap. CXXIX.

Syluestris lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora: amaro gustu est, & uiribus aliquantum papaueri similis: unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema caliginemq; repurgat, contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum

LIBER SECVNDVS. 93

allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit, contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter, quàm satiuæ, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac uenerē arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est insolatum.

Gingidium. Cap. CXXX.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia nascitur: herbula syluestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, sub amara. Oulus hoc crudum, coctum, conditumue estur magna stomachi utilitate. urinæ cit. Decoctum ex uino potum uesicæ prodest.

Scandix. Cap. CXXXI.

Scandix, syluestre oulus est, amarum, sub acre: quod crudum coctumue manditur, stomacho et uentri utile. Decoctum in potu, uesicæ, renibus, & iocineri confert.

Caucalis. Cap. CXXXII.

Caucalis, quam alij syluestre daucum uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbellata, suauiter olente. Crudum, coctumue olerum modo estur: urinam mouet.

Eruca. Cap. CXXXIII.

Ruda eruca uenerem largiore cibo concitat.

Nostrū

Cerefo =

lium.

* & λᾱ

σπῶ, id

est, pluri

mum.

* & πικρό

τερον, non

est. ἀκραι

γον.

Scādix,

Actio li-

ber. i. au-

thore,

agreste

olus est,

gingidio

simile,

acre &

subama-

rum.

DIOSCORIDIS

Semen eodem effectu prodest: vrinam cito concoctioni prodest, aluo perquā cōmodata. Semine ad cōdimenta vtuntur: quod, vti in longū tēpus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerūt in pastillos. Gignitur etiānum syluestris eruca, maximē in Iberia, q̄ occidētē spectat cuius semine pro sinapi incole vtuntur. Vrinā vehemētius pellit, multo satius acrior. Ocimum. Cap. CXXXIII.

Officinis
Basilicō.

Ocimum vulgō cognitū. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, vrinam pellit, lac euocat: egrē tamen conficitur. Illitum cum polline polētæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: et cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrinā, inflatisq; naribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quo l idem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem māducatū, et in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Orobanche. Cap. XXXV.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, et interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergēs

ex radice digiti crassitudine, & cū ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quedam legumina nasci constat, & ea strangulare: vnde orobanche sibi cognomentum vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. Leguminis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. Cap. CXXXVI.

Barbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, breui est caule, folijs croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. Cap. CXXXVII.

Ornithogalum cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cū hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthii. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

Tubera Cap. XXXVIII.

Tubera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs flauescetes: vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortenſis. Cap. CXXXIX.

Hortenſis smilax, frutex, cuius semen à nonnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamen: tenues caules, & capreolos, vicinis

DIOSCORIDIS

* Graecis fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt
 ē ēst ut topiarias ſcenas repraeſentare uideantur: ſiliquas
 πέρξ δὲ foenigraci proferunt longiores & tonſiores, in qui-
 β ποπυ bus ſemina renū ſimilia, ſed inaequali colore reclu-
 ζοῖτα, duntur, * quae quadam ex parte fulueſcunt. Sili-
 quod rez qua cocta, cū ſemine in oleribus, aſparagi modo,
 etius for eſtur. Urinam ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

Medica.

Cap. CXL.

M Edica, cū recenter prodijt, folijs &
 caule trifolio pratenſi ſimilis eſt: pro-
 cedens uero folia contrahit, caules edēs
 trifolij, & ſiliquas corniculorum modo intortas,
 in quibus ſemen lentis magnitudine dependet. Id
 intelliga ſiccatum, iucundi ſoporis gratia, conditaneo ſali-
 mus Smi admisceſtur. Viride, quibus refrigeratione opus eſt,
 lica hac illitu ſuffragatur. Herba tota pro gramine utuntur,
 diuerſi qui pecora alunt.

Aphaca.

Cap. CXLI.

A Phaca in aruiſ nasſitur, altior lente, tenuis
 bus folijs: ſiliquas lenticula maiores fert, in
 quibus terna quaternae ſemina nigra, lente mi-
 tamē ex nora, continentur: quae adſtringendi uim habent:
 parte ful quare torrefacta, ſtomachi aluiq; fluxiones ſi-
 ueſcentia ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

precreare.

Porrum capitatum.

Cap. CXLII.

C Apitatum porrum inflationem facit, no-
 xium ſuccum creat: tumultuoſum ſom-
 num parit, urinam ciet: aluo accommo-

datur, extenuat, oculorū aciem hebetat, menses pel strem u-
 lit: sed lēdit exulceratā uesicam, renesq;: cum pti- citant.
 sana uero coctum, esu pectoris uitia extrahit. Co-
 ma eius in aqua maris, & aceto cocta, in desseſſio-
 nibus, ad præclusiones uulue, et duritias, utilis ha-
 betur. Porrum bis aqua mutata coctū, tum frigi-
 da maceratum, dulcescit, & multò minus inflat.
 Semen acrius est, & quandam adstrictoriā uim
 habet: quare succus cum aceto, addito thure aut
 manna, sanguinis profluvia sistit, maximè si nari-
 bus erumpat. Venerem stimulat: cōtra omnia tho-
 racis uitia tabemq; pro delinētū efficax est: arte-
 riam esu purgat, sed si assiduè estur, uisus obscuri-
 tatē inducit: stomacho aduersatur. Succus ex mel-
 le potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxi-
 lio est: ipsum quoq; cum aceto aut thuris polline,
 lacte aut rosaceo, utiliter aurīū doloribus, & so-
 nitui instillatur. Varos tollunt folia illita cū uua
 rhois, qua ad obsonia utuntur: epinyctidi meden-
 tur: crustas ex sale illita rumpunt, ueteres sangui-
 nis reiectiones colibēt, si binis drachmis & aqua
 li baccarum myrti pondere bibantur. Ampelopra-
 sum stomacho magis aduersatur, et plus porro ex-
 calfacit: urinam & menses uehementius ciet. Id
 contra serpentium morsus esse conuenit.

Cæpa.

Cap. CXLIII.

CAepalonga acrior est, quàm rotunda, item
 flaua quàm cādida, & sicca, quàm uiridis,

DIOSCORIDIS

& cruda quàm cocta aut sale condita. Omnes ta-
 men mordent, flatus gignunt, appetentiâ inuitant,
 sitim mouent, & extenuant: fastidium pariunt, et
 expurgant: aluo vtilis sunt. Eæ detractis purgamen-
 tis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; ex-
 cretionum exitus reserant, subditæ pro balanis.
 Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus,
 argemmis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus
 auxiliatur: angina eodem perunguntur: suppressos
 menses pellit, caput purgat naribus infusus: canis
 moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum
 aceto aut perunctas in Sole, vitiligines sanat: &
 cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos
 cum sale reprimat: contra calceamentorum attri-
 tus, cū gallinaceo adipe vtilis est: citæ aluo prodest:
 in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad pis-
 rulentas aureis, & eliciendum earundem aquam,
 valet: alopecie earum succo perfricantur, qui cele-
 rius, quàm alcyonium pilos euocat: largiore cibo ce-
 pa capitis dolores ciet, cocta q; vehementius vrinâ
 pellit: eos lethargicos efficit, qui valetudinibus ad-
 uersis, ea etiam cocta, plus æ quo nescantur: elixa,
 & cum passis uuis, & fico illita, tubercula conco-
 quit, & celerrimè rumpit.

Allium. Cap. CXLIIII.

Allion quoddam satium atq; hortense habe-
 tur, quod in Aegypto, singulari, ut porrū, ca-
 pite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum:

LIBER SECVNDVS. 96

reliqua uero magna, & candida, ex pluribus coag-
mentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas, Graeci
nominant. Aliud est syluestre, quod Ophioscoro-
don, id est anguinū, uocant. Vis allij acris est: excal-
facit, mordet, excernit, aluū turbat, inflationes fa-
cit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatū permouet,
summā corporis cutē exulcerat, aciem oculorū
esū hebetat. Eosdē effectus praebet anguinū, quod
& elaphoscorodon dicitur: latas uentris tineas in
cibo sumptum abigit, urinas detrahit: contra uipe-
rarum ictus, & priuatim haemorrhoi, prodest, ita
ut non aliud magis, si cū uino iugiter assumatur,
aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum
morsus & illitu, et cibo ualet. Magnae & allio uti-
litates contra aquarū mutationes: uocē clarificat,
peterē tussim crudum coctū melle lenit: potum autē
cum origani decocto, pediculos, et lentes enecat: cre-
mati cinis illitus sugillationibus cū melle, et alopecū-
cīs cum nardino unguine, medetur: eruptiones: papu-
larum cū oleo & sale sanat: uirilgines, lichenas,
lentigines, ulcera capitis manantia, lepras, & fur-
fures, cum melle eximit: cum thure, & teda deco-
ctum, dentium dolorem leuat, si in ore cōtineatur:
contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficul-
neis frondibus, & cumino illinitur. Feruesfacta co-
mae ius, sceminarum desessioibus additum, menses
& secundos partus extrahit. Allium eiusdē gratia
suffitur. Factum ex eo, & nigra oliua intritum

DIOSCORIDIS

quod myttoton uocant, esurit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis uile. Scorodoprasum magnitudine porrum equat, qualitatum porri, & allii particeps: unde promiscuas sibi uires ex utroque uendicanit, effectus allii, & porri prebens: inefficacius tamen, Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

Sinapi.

Cap. CXLV.

Sinapi hortense, aliqui napi uocant. Eligi debet adultum, ualde rufum, non magnopere siccum. sed quod fractum interne uirescat, & ueluti quodam succo madeat, caesium colore: siquidem recens id genus, tempestiuum habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra praeduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamque arterie scabritiem, succus ex aqua, & melle, conuenienter gargarizatur: Sternutamenta ciet, tritum & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur. Foeminas uulue strangulatu oppressas excitat: lethargicis, de raso capite, illinitur cum ficis admistum, donec rubescat.

* καὶ locus, & ad coxendicium cruciarius impositum, * ad
 ἐπὶ λήναις lienes, & omne genus dolores confert, cum permu-
 καὶ καὶ καὶ tande ualitudinis causa, ex alto uitia extrahenda
 λη αἵς sunt. Alopecys illitum, medetur, faciem purgat, su-
 πρὸς αὐτὸν χρὸ gillata cum melle, adipe, aut cerato rapit. Ferae impe-
 ρισαὶ ἀλγὴν tiginis & leprae, eo cum aceto perunguntur: con-
 ρισαὶ tra febrim circuitus aridum bibitur, aut potui,
 polenta

polenta modo, inspargitur: extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuentibus, vtiliter admisceri solet: tritum, grauitati aurium & sonitui. cū fico impositum prodest. Succus ad hebitudines oculorū & genarum scabritias magna vtilitate illinitur. Expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

Nasturtium. Cap. CXLVI.

Nasturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem stimulat, sinapis & eruce simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle, lienem extenuat, fauos expurgat pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur, tumores collectionesq; discutit, emittit furunculos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem effectus, licet minor.

Thlaspi. Cap. CXLVII.

Thlaspi, herbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram versis, suppinguibus, in cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo in latus se pandens

N

DIOSCORIDIS

* *Dioscoridis* te: semine nasturtij incluso * lenticulae vasis effi-
des, id est gie, nisi quod infringitur, (vnde nomen accepit) flos
disci fi- albiat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;
gura.

Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem vtrinque
extrahit, potum acetabuli mensura: prodest ischia-
dicis infusum: sanguinem potu educit, internas sup-
purationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat.
Alterum thlaspi tradit Cratenas, quod aliqui Persi
con sinapi vocant, latis folijs, radicibus magnis:
utile ischiadicorum infusioni.

Draba. Cap. CXLVIII.

Alij ara-
bis.

* e' x' b =
des, id est
virgas.

D Raba herba ad cubiti altitudinem assurgit, te-
nues spargens * ramos, & ex utroq; latere
folia, ceu lepidum, sed molliora, & candidiora: in ca-
cumine vero sambuci umbellam gerit, candidos flo-
res habentem. Herba haec cum ptisana coquitur, in
Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere
obsonijs admiscetur.

Iris. Cap. CXLIX.

E Rysimon, Latini irionem vocant, iuxta vrbes,
rudera, hortosq; nascitur, folijs eruce sylue-
stris: cauliculis in lori modum lentis et obsequosis:
floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, vt
foenograeco, cornicularis: semine nasturtij, exiguo,
vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax
est, & si purulenta extussumtur: regio morbo, &
coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cum
melle datur: illinitur ex aqua aut melle vtiliter ca-

LIBER SECVNDVS. 98

cis carcinomatis, parotidibus, duritijs mammarū,
& testium inflammationibus. In totum extenuat,
et calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua
madescat atq; torreatur, vel linteo illigatum, pin-
sita, farina oblitum perassetur.

Piper.

Cap. CL.

Piper in India nasci, breui arbore traditur: quæ
inter initia, prælongum fructum, veluti filie
quam promit, quod longum piper est: habet intus
aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfe-
ctum piper euadit. Id aut suis temporibus dehiscēs,
pādensq; sese racemos emittit, grana ferētes qua-
lia videmus. Ea acerba cādidū piper faciunt, aptū
ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus
quæ contra venenata parantur: theriaca vocant.
Longum vero vehementius mordet: & quoniam
prius, quàm ematurescat, decerptum est, subama-
rum relinquitur, antidotis & theriacis medicami-
nibus expetitur. Nigrum vero, utpote quod tem-
pestiua maturitate collectū fit, odoratum esse cō-
stat, candido suauius, acrius, & origratius, necnō
ad condimēta vtilius. Sed candidū, & adhuc in-
acerbū vergēs, antè dictis infirmius est. Eligi opor-
tet grauissimū, plenum, nigrū, sine multis rugis, re-
cēs ac minime fursurosum. Inueniuntur etiānum ī
genere nigri semina nutrimēto defacta, cassa ina-
nia, minimiq; pōderis, quod vocāt brasma. Vis om-
niū excalfacit, vrinā ciet, cōcoquit, extrahit, discu-

N ij

DIOSCORIDIS

tit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur. P
per, februm horroribus circuitu repetentibus, siue
potu, siue illitu, subuenit: serpentium morsibus au-
xiliatur, partus extrahit. conceptum adimere crea-
ditur, statim à concubitu suppositum: iussi, omni-
busq; pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu, suc-
currit: angine eo & melle conuenienter perungun-
tur: potum cum recentibus laurij folijs, tormina di-
scutit: cum vna passa manducatū, pituitam à ca-
pite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appe-
tentiam mouet, concoctionē adiuvat, ad intinctus
esculētorum additum: strumas cum pice discutit,
vitilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, vt * lē
* φαι, tacula, motum torretur. Non est huius arboris ra-
nō φαι, dix gingiber, vt aliqui existimauere, sicuti paulo
post ostendemus. Nāque piperis radix costo simi-
lis est, ora gustantium accendit, salinam ciet. Hæc
lienem reprimat, cū aceto illita, vt pota: caput etiā
purgat, manducata cum semine pedicularis here-
ba, quam staphidem agriam vocant.

Gingiberis. Cap. CLI.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglody-
tica Arabia magna ex parte nascens: qua vi-
rente, ad multa, perinde atque nos ruta, vtuntur,
& primis potibus & eduljjs admiscet. Huius ra-
dices, cyperi modo, parue sunt, candicantes, &
odoratæ, atque piper sapore imitantur. Eligi
debent quæ teredines non noverunt. A multis

tamen ob id & conduntur, quòd celeriter cariem sen-
tiant, ac fictilibus in Italiam asportantur. Gingibe-
ris cibo conueniens est, & cum condimento assumi-
tur. Excalfactoriam vim & excoquentem habet:
aluum leniter emollit, Stomacho utilis est, efficax
aduersus ea, quæ oculis caliginem offundunt. In an-
tidota addi solet. In summa, piperis viribus re-
spondet.

Hydropiper.

Cap. CLII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stas-
cunt, aut pigro lapsu repunt: caulem edit ge-
niculatum, & prædurum, multis alis concavum: fo-
lia menthæ, maiora, molliora, candidioraq;: gustu
piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam fru-
ctum acrem, in surculis paruis, prope folia racema-
tim coherentem. Folia cū semine illita tumores ve-
teresq; duritias discutit, sugillata delēt: quæ post-
quam inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admi-
scentur. Radix parua, nullius in medicina momēti.

Ptarmica.

Cap. CLIII.

PTarmica exiguus frutex est, surculos habens
paruos, multos, & rotundos, abrotono non dis-
similes, & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in
cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotū-
dum, quod suo acri odore sternutamentum excitat:
vnde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugil-
lationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissi-
mè mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

N iiij

DIOSCORIDIS
Radicula seu lanaria herba.

Cap. CLIIII.

Cēsetur
ea quā
uulgō sa
ponariū
dicunt.

S Truthium herba uulgō nota, qua purgādis
lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix
est acris: urinam ciet: prodest tussi, iocinero
sis, orthopnœ & ex melle sumpta, cochlearis mensu-
ra. aluum soluit. Eadem cum panace & capparis
radice calculos frangit, & cum urina exturbat. di-
ritiam lienis absomit: menses imposita trahit, par-
tus efficaciter enecat. Cum polenta autem & ace-
to illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina
hordeacea, & vino decocta. Miscetur et malagma-
tis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa. Sterni-
tamenta mouet, per os purgat, trita cum melle, &
naribus infusa.

Cyclaminus. Cap. CLV.

* πορφυ
ειζορτα,
purpura
scētibus.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea,
varia, in quibus suprà infraq; albicant
maculæ: caule nudo, quaternos digitos æ-
quante: floribus in eo * purpureis, rosarum effigie:
radice nigra, & aliquantum lata, ut rapum vide-
ri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam
aquamq; detrahit: menses potu appositūue ciet.
Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur,
abortum fieri. Partum appensa accelcrat: contra ve-
nena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illi-
ta contra serpentium ictus, remedio est: immista vi-
no inebriat: regium morbum discutit, tribus drach-

LIBER SECVNDVS. 100

mis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum, qui ebibit, multis vestibus contectum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectioni autem sudores fellei colore inveniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deijcienda quoque alui excrementa, in vellere sedi subijcitur: illito vmbilico & imo ventre coxarum tenuis, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & retusa oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduam sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absomit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, perniionesq; foueri congruum est: ipsaq; in oleo vetere feruefacta, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cere momento, ut strigmenti crassitudinem vnguentum contrahat, cum primis vtile perniionibus. Radix, scille modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

N iij

DIOSCORIDIS

Altera cyclaminus. Cap. CLVI.

Est & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophylon vocant: folijs hederæ, sed minoribus geniculatis caulibus, crassisque; circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per urinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur. reliquias à partu purgat.

Dracunculus. Cap. CLVII.

Dracunculus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non dissimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis, succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum absument: carcinomata illitum sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit: orthopnoeis, ruptis, vulsis, tussi, destillationibus, auxiliatur: humores pectoris ex-

creatu facile reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delin- gatur: vrinam pellit, venerem excitat, cum vino po- ta. phagedenas vlcerum, & quæ cacoethe vocan- tur, trita cum melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eijciendos partus fieri solent: qui radice suas ma- nus perfricauerunt, à viperis ferri negantur: illita ex aceto, vitilignes emaculat. Folia recentibus vul- neribus, linamentorum vice, conuenienter imponun- tur: decocta in vino pernionibus apposuisse prodest: casens folijs inuolutus, à putredine defenditur. Suc- cus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctâne, ad sano- rum vsus, pro olere recipitur: in Gymnesijs insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Ra- dix messibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, siccatur in vmbra, & ita recon- ditur.

Arum.

Cap. CLVIII.

ARON, apud Syros lupha vocitatum, folia emit larues of- tit dracunculi, sed longiora, & paucioribus ficinis. distincta maculis: caulem suppurpureum, dodran- talem, pistilli specie, à quo croceum semen exit. ra- dice dracunculi alba, quæ decocta estur, vtpote cū minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & aride per se decocta manduntur. Radix, semen & fo-

DIOSCORIDIS

lia, dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fumo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arifarum.

Cap. CLIX.

Arisarū exigua herbula est cuius radix olea magnitudinem implet, longè maioris quàm aron acrimonia: vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radice, genitale animalis cuiuscunque in perniciem agitur.

Hastula regia.

Cap. CLX.

Offici-
nis A=
phrodi-
los.

HAstula regia vulgaris notitiæ est, folijs maioris porri: caule læui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt: vrinas & menses epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissimè, verum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida, & depascentia, māmaram quoque & testium inflānationes, tubercula, furunculosq; decoctis in facie vini bulbis, recentibus inflātionibus ex polēta auxiliatur. Radicis succus adiecto, vetere uino dulci, myrrha & croco decoquitur, sitq; perquàm vtile oculis medicamentum ad purulētās.

aureis per se: & cum thure melle, vino & myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem: infusus, * * * * * dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alo * * * * * pecias ad pilum reducit. Oleum in excanatis radi- * * * * * tibus igni decoctum, illitū exulceratis perionibus & ambustis igni, conducit: & surditati, instillatū in aurem, auxiliatur. Candidam vitiliginem, * lin * proae teo antea perfrictam in sole, illito radix emendat. * * * * * Semen floresq; in vino poti, scolopēdræ et scorpionū * * * * * venenis, mirū in modum resistūt: aluum purgant. * * *

Bulbus esculentus. Cap. CLXI.

Esculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur: Stomacho & aluo utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarus verò & scillinus, Stomacho aptior est, & concoctionē adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt: venerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt: luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrenas & podagras ex melle aut per se, hydropicorum tumores, & canum morsus cū melle & piperis polline illiti cohibent, sudores compescunt: Stomachi dolores mitigant: fursures & vlcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt, sugillata varosq; per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle vel aceto, emendant, fractis auriculis vnguibusq; ex polenta medetur. ijdē

DIOSCORIDIS

calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus, impositi: cremati verò, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atque trasq; cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus uomitorius. Cap. CLXII.

*β'αβω**B**ulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, & cortice nigro. Ea radice mansa, aut decoctum eius potum, vesicae malis medetur. vomitiones movet.

Scilla. Cap. CLXIII.

Officinis
squilla,
Varronis
more.**S**cilla vim acrem atque feruentem habet: assatam ad multa vtiliorem esse constat. Poliline ad crustam subacto, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: quae exempta si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quae prius fiunt: nam quae ita non assatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quae in furnum demittatur. Summi etiam solet quod maximè est medium, direptis vixio tenuis tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata saepius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat: traiectaq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidem parte se contingant: his scilla segmi

nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum, vtiz-
mur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ
in oleo feruesacta, aut cum resina liquefacta im-
ponitur: decocta in aceto demorsis à vipera, cata-
plasma est. Ad singulas assæ parteis adiectis octo-
nis tosti salis, cochlear vñ aut alterũ damus ieiun-
nis, ad emolliendam aluũ: in potu aut & odoratis
medicaminibus, & quibus vrinam ciere volumus
hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus
regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis,
& ore reijcientibus tres obolos, in delinctu ex mol-
le sumpsisse satis est. Coquitur cum melle, et estur
eorundẽ gratia, maximè vt cõcoctionem adiuvet.
Strigmenta per aluum extrahit. Cocta & simili
sumpta modo, eosdem præbet effectus: sed cauendus
scillæ vsus his, qui intestinum sentiunt vlcus. Ad
pensiles verrucas & perniones, tosta efficaciter il-
linitur. Tertium semen, & in carica aut melle de-
uoratum, aluum emollit. Scilla tota in limine ias-
nuæ suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

De Pancratio. Cap. CLXIII.

P Ancraticum, quod aliqui scillam appellant, ra-
dice est magni bulbi, subrufo colore, aut sup-
purpureo, gustu amaro ac feruente: folijs lilij, sed
longioribus. Scillæ vires & preparationem ha-
bet, eodẽque pondere in morbis efficaciter assu-
mitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas in-
est. Radicis succus cum erui farina digeritur

DIOSCORIDIS

in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

Capparis. Cap. CLXV.

Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneae, rotunda: fructum oleae similem, qui cum dehi- scens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongae figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosus spargit, grades, numerosasq;. Tenui plerumq; solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis et fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat. Stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quam cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absorbet, & urinam cruentamq; ex crementum emit: bibitur utilissime in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & conuulsis: menses ciet, caput purgat Dentium dolore sedat semine ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadem proficit: ulcera omnia vetera, & sordida, & quae occaluerunt, expurgat: lienosis com farina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur. cum aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias discutunt. Aurium vermiculos infusus succus enecat.

Aphrica, & præsertim Marmarica capparis, vehementer inflat. Apula vomitus facit, & quæ à Lybico, & quæ Rubro mari defertur, mirum in modum acris est: si quidem in ore pustulas excitat gingiuasq; osse tenus exest: quare in cibis non ab re damnatur.

Lepidium. Cap. CLXVI.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula Cēsetur vulgò nota: muria cum lacte seruatur. Vis fo piperisoli-
liorum & acris & exulcerans: quapropter ischia torum.
dicis trita, præsentissimum est auxilium, si cū hele-
nii radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis si-
mili modo prodest. lepras eximit. Radix appensa
collo, dolore dentium liberare exi stimatur.

Ranunculum. Cap. CLXVII.

Complura ranunculi genera: vis tamen oībus Vulgò a-
vna, acris, & vehementer exulcerans. Nam piū risus
vñū coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis
pinguibus: flore luteo, interdū purpureo: caule gra-
cili, cubitum alto: ra. lice alba, exigua, amaraq;,
multis capillamētis, hellebori modo, fibrata: nasci-
tur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius,
longiori caule, pluribus foliorum incisuris, * ple * πλε
runq; in Sardinia proueniēs, quā acerrimum, quod στερ, αλ ε,
sylvestre apium appellant. Tertium minimū, odo= copiosu.
re graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore la-
eteo. Folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exul-
cerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare

DIOSCORIDIS

ungues scabros extricant, scabiem eximunt, Stigmata delent: formicantes verrucas, & pensiles, alopeciasq; paulisper illita tollunt. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritaq;, Sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Anemone. Cap. CLXVIII.

Duo anemones genera, vnum sylvestre, alterum in cultis nascens. Cuius multae species: vna paeoniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, vut purpureum. Harum folia coriandro similia, caeterum scissa tenuius in terram inclinatur: caule languinosi, tenues, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut coerulea. radix oleae magnitudine, aut amplius paulo grandescit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, et multis radicum capillamentis. Acrior est, qua nigra habet folia. Vis vtriusque acris: ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commantuscata radix pituitam trahit: decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida vlcera abstergit. Folia, & caules, si cum priscana decocti edantur, copiam lactis praebent: menstrua ciunt, vellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonen nominari eupatorium

ri eupatorium putent: quoniam à syluestri anemone, argemone & papauer, quod rhœada appellât (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas vero candidiorem & acrem. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

Argemone. Cap. CLXIX.

Argemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florē puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, et summis partibus latum: radicem rotundā: succū croci colore, acrem, dimittit. Argema et nubes expurgat. Folia illitu inflammationes cōpescūt.

Anagallis. Cap. CLXX.

Duo anagallidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi

O

DIOSCORIDIS

vim habet: inflammationem arcet, adactos corpori
aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput gar
garizatu purgat: & naribus infusus, dolorem den
tium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: arge
ma cum melle Attico emendat: retuse oculorū aciei
auxiliatur: contra viperarum morsus, iocineris &
renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt
eam, quæ cœruleum edit florem, prociduum sedem
reprimere: quæ uerò phœniceum, illitis euocare.

Hedera. Cap. CLXXI.

Hedera differentias multas in specie fortis
tur, summas autem genere treis. Nam
quedam candida est, altera nigra, tertia
helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, ni
grum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam
vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet
viticulas, & folia parua, angulosa, & * concin
niora. Hedera omnis acris est, & adstringens: ner
uos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad
dysentericos, in vino bis die potus: ambustus cum ce
rato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta,
aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū
& corymborum succus, cum irino vnguento, mel
le aut nitro, naribus infunditur, & contra veteres
capitis dolores & caput eo cum aceto, & rosaceo per
fundi utile est: purulentis auribus, aut dolentibus,
cum oleo medetur. Nigris hederae succus, aut epoti
corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbant lar

* εὐθι
ρῶτερον
non εὐθι
ἴσται.

* ἀρμῶ
ζω καί.

gius sumpti. Acini quinque triti, cal factiq; in punicini mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillū, illiti corymbi. Folia in vino decocta, illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoethe sint: vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus. decocta. Mouent menses triti & subditi corymbi: ydem poti, post purgationes foeminarū, drachmæ pondere, concipiendi spem adimūt. Pediculus oliorū melle irrigatus ac uulue indicus, menstrua et partus extrahit. Instillatus succus putrida tedia nariū, graue olētiamq; emēdat, et sanitati restituit. Lacryma hederæ psilothrū est: illitu pediculos enecat. Succus radicū in aceto potus, contra phalāgia prodest.

Chelidoniū. Cap. CLXXII.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranunculī, mollioribus tamen, & colore caesijs: flore uiole albe, secundum singula folia prodeunte: in eo succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus. grauit̃er olēs: radix superne singularis, inferne in multa crocea capillamenta fibatur: siliqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Succus in aereo uase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso

DIOSCORIDIS

& vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpunt: imposita cum vino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirundinum exoriatur, et discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excæcatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. Cap. CLXXIII.

Vulgò
Scrofula
ria mi-
nor.

Chelidonium minus, quod triticum sylvestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: folijs hederae, multò rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in grauiorum tritici modum acervatim congestas: quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones modo, summam cutem exulcerat: psoras et scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum, magnificè id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. Cap. CLXXIIII.

Varie
de Othō
nā sentē
tiæ.

Othonnam aliqui maioris chelidoniae succum esse aiunt, quidam glaucij. Alij succum floribus corniculati pipaueris expressum. Alij permixtos cœruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaueris succos, esse contendunt. Alij Troglodyticae cuiusdam herbae succum, quæ othonna vocatur: na-

sciꝑ; eam in eo Arabia tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs eruce, perforatis cribri modo, & veluti à tineâ derosis, squallore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidã anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorũ medicamentis adiicitur, vbi expurgare est opus: mordet enim & absterget omnem caliginem quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

Auricula muris. Cap. CLXXV.

MVris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarũ sinu prodeuntibus: flosculo, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægylopiâ sanat. Sunt qui al sinem, muris auriculam vocitent.

Glastum. Cap. CLXXVI.

Satium glastum, quo insectores lanarum vtuntur, folium habet plantagini simile, verum pinguis nigriusq;: cuius caulis duum cubitorum altis

DIOSCORIDIS

** L. 10
 r. 10
 id est, te
 niores.*
 tudinem excedit. Illita folia tumores omneis discus-
 tiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis proflus-
 uia sistunt, ignem sacrum, phagedenas, putrescens-
 tia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre gla-
 stum satiuo simile est: folia fert maiora, lactuca-
 ceis proxima: caules * prætenues, multifidos, qua-
 drantenus rubentes: in quorum cacumine folliculi
 multi dependent, quandam linguarum effigiem re-
 ferentes, in quibus semen flore tenui, luteo. Eadem
 quæ & supra dicta præstat: potu & illitu lienosis
 auxiliatur.

Telephium. Cap. CLXXVII.

*Vulgo
 Crassu-
 la ma-
 ior, &
 faba in-
 uersa.*

Telephium herba portulacæ similis est, &
 caule, & folijs: alas binas in singulis fo-
 liorum gericulis annectit, ramuli à radi-
 ce semi septeniue prodeunt, folijs referti cœruleis,
 crassis, lentis, ac carnosiss, flore luteo, aut candido.
 Nascitur inter vites, & locis cultis vere. Folia senis
 horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea
 hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto
 etiam in sole vitiliginem tollunt, sed ubi inarues-
 runt, absterguntur.

SECUNDI LIBRI FINIS.

P E D A N I I 108
D I O S C O R I D I S

A N A Z A R B E I , D E M E D I -
C I N A L I M A T E R I A ,
L I B E R I I I .

I o a n n e R V E L L I O S u e s s i o n e n s i
i n t e r p r e t e .



V P E R I O R I B V S , c h a e
r i s s i m e A r e e , c o m e n t a r i j s , t r a d
i d i m u s d e a r o m a t i b u s , u n g u e
t i s , o l e i s , a r b o r i b u s , e a r u m f r u c
t u b u s & l a c r y m i s , i t e m d e a
n i m a l i b u s , c e r e a l i b u s , o l e r a c
e i s , & h e r b i s a c r i m o n i a p r a e
d i t i s . I n h o c a u t e m t e r t i o r a d i c e s , s u c c o s , s e m i n a ,
h e r b a s , & q u e v e r n a c u l a & i n t e r s e c o g n a t a c e n
s e n t u r , q u a e q ; p l u r i b u s s c a t e n t r e m e d i j s , p r o s e q u e
m u r .

A g a r i c u m .

C a p . I .

A G a r i c u m r a d i x f e r t u r l a s e r p i t i j s i m i l i s ,
s e d f a c i e s u m m a s o l u t i o r , & r a r i o r e f u n
g o s o q ; t o t a c o n t e x t u . D u o e i u s g e n e r a :
s c e m i n a , q u a e p r a e f e r t u r , r e c t i s i n t u s v e n a
r u d i s c u r s i b u s c o n s t a t . m a s r o t u n d u s e s t , & u n d i q ;
c o p a c t i o r . V t r i q ; g u s t u s i n i n i t i o d u l c i s , m o x e x d i
s t r i b u t i o n e i n a m a r i t u d i n e t r a n s i t : g i g n i t u r i n S a r
m a t i e r e g i o n e , q u a e A g a r i a d i c i t u r . S u n t q u i r a d i c e
O i i j

DIOSCORIDIS

esse plantæ affirmant: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadã putredine. Gignitur in Galatia Asiæ, & Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet: efficax est contra tormina; cruditates, & rupta: prodest itidem cõtusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso, febrim non sentientibus. febriculosis verò, in aqua mulsa. Arquatis quoque, suspiriosis, iocineris, renumq; vitio laborantibus, dysentericis. Atẽ si vrina egrè reddatur, si vulue strangulatus vrgeat, si pallor membra decoloraret, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio Stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acida ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: foeminis, quas inflatio vulue vexat, vtiliter æquali modo datur. Horrores soluit datum ante febrium accessiones: aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus vitijs conuenit, pro viribus, & etate datum, nunc

ex aqua, nunc ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum.

Cap. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhapōticum vocāt, Ignora =
provenit in ijs, quæ supra Bosphorū sunt re = tur. Nec
Gionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centau =
rio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, ali quod
quantum lævis, sine odore. Optimum habetur, quod Reupon =
teredines non sensit. si gustatu cum remissa adstri tici no =
etione lentescat, māducatumq; colorem reddat pal mine ho =
lidum, aut ad crocum inclinantem. Id epotum facit die indi =
ad inflationes, Stomachi imbecillitatē, & omne ge catur.
nus dolores, ad cōuulsa, lienosos, hepaticos, tormina,
ad renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus inten =
ta præcordia, & vuluæ mala, coxendicum dolores,
sanguinis excreationes, sospiria, singultus, dysente =
rias, & coeliacorum affectus, contra februm cir =
cuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis
valetudinibus eodem, quo agaricum, pondere, et cū
eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin ali =
ter, ex aqua mulsa. si tabem experiuntur, ex passo:
si lienis exercet in aceto mulso si dissolutio est sto =
machi, id est cū cibi tenax non est, manditur, &
sine sorbitione vlla deuoratur. liuentia, lichenasq;
tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omneis ve =
teres ex aqua oblitum dissipat. summa eius vis ad =
stringens cum aliquanto calore.

Gentiana.

Cap. III.

DIOSCORIDIS

* Gra-
cus Gen-
tidi.

Gentiana inuentio prima assignatur * Gentio
Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit.
Folijs partim proximè radicem, iuglandi plantagi-
niue similibus, subrubris, partim à medio caule, &
praesertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule
cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex
interuallis maioribus foliato, binum saepe cubitorum:
semine in calycibus lato, sine pondere, glutoso, sa-
tis ad sphondylii semen accedente: radice longè ari-
stolochiae, crassa, amara. Nascitur in sublimibus
montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radice
excalfactoria, & adstringens: contra morsus ser-
pentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vi-
no pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, late-
rum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, &
conuulsis, prodest hepaticis & stomachicis, pota-
cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita,
partus eijcit: imposita, ut lycium, vulneraria est,
& ulcerum cuniculatim depascetium medela. Suc-
cus praecipue eodem affectu prodest: oculis inflam-
matione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs
acribus immiscetur. Radix vitiliginem absterget.
Succi extrahendi ratio haec est: Cotusa radix quin-
que diebus aqua maceratur: postea in eadem tan-
tisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refri-
xit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum
mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

Aristolochia.

Cap. IIII.

Aristolochia nomē ex eo sibi adaptavit, quod existimetur optimē puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotūda, quæ fœmina vocatur, folijs hederaceis: præstanti odore cū acrimonia, mollibus, subrotūdis, multis ab vna radice germinibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, grauitè olet. Longa, mascula appellatur: nōnullis dactylitis, longiore quā rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauitè olēte, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotundæ, in orbē conglobata, rapi modo. Longæ verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nōnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiānum tertia longa, quæ clematitis vocatur, ramulos habēs tenuēs, refertos folijs subrotūdis, minori semperuino similibus: flores rutæ: radices longiores, tennes, crasso cortice odoratoq; vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis cōuenientes. Rotunda ceteris venenis resistit. Longa verò aduersus angues, & venena, drachmæ pōdere ex vino bibitur et illinitur pota cū pipere, et myrrha, menses, partus, et omnia vuluarum onera eūcit: eadē efficit subdita in pessa.

Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, suspirijs, horroribus, lienī, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit, ossium squamas illitu

DIOSCORIDIS

adimit, vlcera putrida exest, & sordida expurgat: cauat cum iri, & melle explet, gingiuas, & dentes extergit. Clematitis ad eadem pollere creditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix.

Cap. V.

Liquiri =
tia offici
nis.

* maxis
id est, lon
gas.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus. folijs lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummeis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquis lentium modo habet, rufas & * paruas: radicibus longis, vt gentianæ, coloris buxæ, sub acerbis & dulcibus: quæ densantur in succum, lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur: verum oportet vt lingua subditus eliquescat, & stuâti stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illitus accommodatur, commanducatus ori prodest: recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygij: commodissime inspargitur.

Centaurium magnum. Cap. VI.

Censetur
Rheupon
ticum of
ficinarum.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos ceruleus: semine cnico simile, ceu lanæ floccis

LIBER TERTIVS. III

quibusdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo pregnans, cū adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam et Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuētibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: cæteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramenta eius in collyrij formā vuluæ subdita, menses atque partus extrahunt. succus eadem præstat, vulneribus prodest: nam recens tussa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescūt, si tussa si mul decoquatur, In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtūtur.

Centaurium minus. Cap. VII.

Centaurium, limnesion aliqui vocauerunt, quoniam niam rigua amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rute, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tussa, suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrices obducit: bilem crassosq; humores per aluiū exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur. trahit enim sangui-

DIOSCORIDIS

nem & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat: in uellere appositus, menses & partus extrahit: epotus peculiariter nervorum vitijs succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba semine pragnas, & diebus quinque madefacta, decoquitur, donec superemineat aqua: mox ubi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem gravidamque contundunt, atque succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignee rude assidue mouentes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus uasis adhaerescat, deradunt, reliquoque humori permiscunt. Noctu diligenter operiunt: nanque ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quae autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta (ut in gentiane mentione retulimus,) preparantur: sed quae ex corticibus humidis, aut contusis herbis factitantur, in sole, uti antea dictum est, coguntur. Sic est thapsia, sic est madragora reliquisque similibus succus sic ex acerbis uuis melligo elicitur. Lycium tamen, & absinthium, hypocistis, & consimilia, decocta, eo, quo diximus, modo coguntur.

Chamaeleon albus. Cap. VIII.

Chamaeleon albus, iuxta ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis uiscum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche utuntur mulier

LIBER TERTIVS. 112

res: folia habet silybo aut carduo similia, * aspe= * Sic Pliniora, acutiora, nigroq; chamæleone ualidiora: cau= ni. gra= lem non promit, uerum ex me.lio spinas, echini ma= cus co= rini, aut cinare modo, erigit: flores purpureos, ucluti dex wæ papporum lanugines emittit: semen cnici simile: ra xúττα, dicem in latis collibus crassam, in mōtosis uerò gra id est ciliozem, in profundo albam: aliquátenus aromati= crassio= cam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli men ra: ni sura, latas interaneorum tineas pellit. Bibitur autē forte in uino austero, cum origani feruesacti succo. Hy= τρᾶχούτε dropicis commodissimè drachma in uino datur, et= pa legen enim eos extenuat: contra difficultatē urinæ deco= dū: quod etum propinatur. Hausta in uino, serpentium uene ex her= nis resistit: occidit canes & sues: mures itē necat, barū col subacta cū polenta aut aqua, & oleo madefacta. latione,

Chamæleon niger. Cap. IX. si quādo

Chamæleon niger, folijs scolymo similis es uidere cō set, nisi minora, tenuioraq; , ac rubro di= tingat, stincta uiderentur: caulem emittit dodrā facile di talem, crassitudine digitali, subrubrum: & in um indicaue bella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, uer= ris. sic colores: radice crassa, nigra, densa, interdum exce sa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mor= det. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tra Etibus, & maritimis. Radix trita, addito atramen ti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiē abigit: eadem, cū sibi sulphur & bitumen ascie nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abs=

DIOSCORIDIS

terget Decoctum collutione dentium: dolorem miti-
gat: cum pari pipere & cera oblita radix, dolent
denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto deco-
cta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scripto-
rio stylo feruens admoueat: vitia cutis in facie, uir-
tiliginesq; cum sulphure emendat: erodentibus me-
dicamentis admiscetur: phagedenas, tetraq; vlcera
Nominis illitus sanat. Quare chamæleo vocetur, à varietate
ratio. foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem:
hic viridia, illic albicantia. alicubi cœrulea, nonnus-
quam rubra inueniuntur.

Crocodilium.

Cap. X.

Crocodilium chamæleontis nigri figurā ha-
bet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui,
aliquantum lata, odore, ut nasturtij, acuo-
to. Feruescens in aqua & pota radix, sanguinem
copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos eu-
denter adiuvans. Semen ei rotundum inest, duplex
uti scutum, quod suapte vi vrinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris. Cap. XI.

**Virga
pastoris
vulgo.**

Dipsacum, aculeatarum generis est, caulem
habet altum, spinis horridum, folijs lactuce,
spinosis, binis genicula singula complectentibus,
prelongis, ceu quasdam bullas intus & extra acu-
leatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum
sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsa-
ci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine cau-
lis, singula circuli capitula insunt, oblonga, echin-
nata

nata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissecta q; medullatenus, vermiculos ostēdunt. Sanat rimas sedis, fistulas q; si tusa & decocta in vino radix, usquedum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, verrucis q; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba.

Cap. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulē supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantē, intus cauum: in cacumine capitulū inest spinosum, echin marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semē cœnicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & qui cruēta extussiunt, efficax est: vrinā, cit tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen convulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica.

Cap. XIII.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæteras q; fluxiones radix etiamnum valet. Proue-

P

DIOSCORIDIS

nit in asperis.

Carduus.

Cap. XIII.

Est gallo-
rum Ar-
tichau.

C Arduus, Græci scolymon vocant, folia char-
maleonis habet, aut albæ spine, nigriora, &
crassiora: caulē longum edit, foliosum, capite spi-
noso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolen-
tiam alarum totiusq; corporis emēdat: item si de-
cocta in vino bibatur. Copiosam autem urinam
foetidamq; expellit. Herba cū recens tenerescit,
in olera, asparagi modo, transit.

Poterium.

Cap. XV.

P Oterium, Iones neurada vocant, largē frutis-
cat, cortice obductum tenui, spinis horridum,
lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tes-
nuibus, tragacantha proximis: folijs paruis, rotun-
dis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius
usus, sed gustu acuto et odorato. Nascitur in aquo-
sis, et collibus. Radices demittit binū ternūue
cubitorū, neruosas, & firmas: quæ proximē terrā
recisæ, dant succum gūmi similem. Tusa, præcisis
neruis & vulneribus glutinandis illinuntur. Deco-
ctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

Acanthium.

Cap. XVI.

* Addi-
tū ex Pli-
nio.

A Canthium albæ spine simile, folijs nuclea-
tis per extremitates, & lanugine araneo
sa obductis: ex qua collecta & neta, vestes bō-
bycinis similes texunt. Folia vel radices ad reme-
dia episthotoni bibuntur.

LIBER TERTIVS. 114

Acanthus. Cap. XVII.

Acanthus, Romani paderotam vocant, na- Officinis
scitur in hortis, petrosis, & riguis: folia ha- Bracavv
bet multò lactucaceis latiora, & longiora, eruce sina.
diuisura, nigricantia, pingua, lævia: caulem binū
cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope vera-
ticē ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nucæ
menta quædam oblonga referentibus, spinosis, è
quibus flos prolit albus: semen oblongum, luteum:
caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mu-
cosis, rubris, & glutinosis: quæ vstis igni & luxa-
tis artubus illitæ subueniunt: potæ urinam ciunt,
sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sen-
tientibus, mirè prosunt. Nascitur et sylvestris acā-
thus, scolymo similis, aculeatus, breuior quàm sa-
tiuus, & is qui hortis prouenit: cuius radix ad eā-
dem, ad quæ superior, efficax.

Anonis. Cap. XVIII.

Anonis, quam aliqui ononida appellant, ra- Vulgò,
mes habet fruticosos, dodrantaes, aut pau- Resta bo-
lō maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis uis.
alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticu- * Suspi-
le, tenuibus, pusillis, ad rutæ aut * pratensis loti, cor lotū
folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non in- sylvestre
incundè olentibus. Muria conditur, antè quàm intelligē
spinosa fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus dum: ac
spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent: ra- ob id for-
dicem mittit candidam, quæ excalfacit, & exte- tē pratē-

P ij

DIOSCORIDIS

sem dici, nuat: huius cortex ex vino potus, urinam ciet: calcu quod tri los comminuit, margines vlcera erodit. Radix cū folij pra decoquitur in posca, dolorem dentiū colluti. e miti tēsis cō= gat. Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare stet folijs creditur.

vt vo =

Leucacantha. Cap. XIX.

lumine **L** Eucacantha, prædita est radice cyperi, valida quarto à **E** amara, quæ manducata dolorem dentium Dioscori sedat: veteri laterū dolori, atq; ischiadicis prodest, de depin= decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadem ruptis gitur. & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdē præbet effectus.

Tragacantha. Cap. XX.

T Ragacanthæ radix lata & lignosa, summo cespite nititur, vnde surtulos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spi Officinis nas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiam nū Draga= tragacantha, lacryma, quæ, vulnerata radice ma gantum. nans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medicamēta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas vo ces, cæterasq; destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoq; linguae liquescit, & in passo made= facta, drachmæ pondere bibitur, contra renum do lorem, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto et eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryngium aculeatarum generis est. Cuius fo- Nūc cor-
lia in principio, sale condita, in cibos recipiunt rupto vo-
tur: lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, cabulo
gustu aromatica. Sed ubi adoleuerunt, circa cōplu Iringū di-
res caulium eminentias in spinas aculeantur, in citur.
quorum summitatibus globosa capitula, durarum
acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim cir- * Per an-
cumuallantur, quorum colos aliās viridis, aliās al- thericū
bus, interdum cœruleus inuenitur. Radix oblonga, caulē A-
lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitu- sphodeli-
dine, odorata. Nascitur in asperis & cāpestribus. cui aptis-
Vim habet calfactoriam: pota menses & vrinas simè cō-
pellit, tormina inflationesq; discutit. contra iocine- paratur
rum vitia, serpentium morsus, & hausta venena, Aloe, hic
cum vino prodest. Bibitur aduersus plurima, cū se intelligi-
minis pastinace drachma vna: appensa illitāue, mus quā
tubercula discutere proditur. Pota cum hydromeli vis Dio-
te radix, opisthotonicis & comitialibus medetur. scorides i-

Aloe.

Cap. XXII.

Asphode

Aloes folium scillæ similitudinē habet, cras- li siue ha-
sum, pingue, modicè latum, rotūdum, retror stule re-
sus pan lum: folia vtrinq; ex obliquo longioribus gie histo-
interuallis striantur, & in spinulas desinunt retu ria, eius
sas truncasq;. Caulis emittitur non dissimilis * florē hoc
antherico: flos albus: fructus hastule regie cognā appellari
tus: graui tota est odore, & gustu amarissima: ra nomine
dice vna, ceu palo, in terrā depacta. Plurima præ tra lat.

P ij

DIOSCORIDIS

pinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur. alterum ad iocineris imaginem vergit. Eligi debet * *synce*
 * *Plin.* cera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum ex-
 pinguis, pers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta
 qui non facile liquefcens, eximie amaritudinis: improba-
 κατὰ γὰρ, tur nigra & fractu contumax. Gummi eam adul-
 vt nostri terant: quod deprehenditur gustu, amaritudine, et
 codices valido odore. eoq; argumento, quod digitis friata
 habent, non ad minima vsq; frustra resoluitur. Nec desunt,
 sed λιπαρὰ qui acaciam immisceât. Natura eius est spissare,
 γὰρ vide exiccare, somnum allicere, & corpora densare, al-
 tur legis uum resolvere. Stomachum repurgat binum co-
 se. chlearium mensura, in aqua frigida aut egelida
 pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum
 purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ ponde-
 re in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel
 melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis per-
 fectæ causa, tribus drachmis sumitur: alijs purga-
 torijs medicaminibus admista, præstat vt minus
 stomachum infestent: sicca glutinâdis vulneribus
 inspargitur, vlcera ad cicatricem perducit, cohi-
 betq; : eadem peculiariter exulceratis genitalibus

medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabrae lippitudines, pruriginesq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pēnaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur, vt quod sit arenosissimū, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Abfynthium. Cap. XXIII.

Absynthiū, aliqui bathypicron herba vulgò cognita. Præstātius in Ponto, & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi et adstringēdi: bilem expurgat, quæ & stomacho et ventri inhæsit: urinā cit, & crapulam præsumptū arcet. Ad inflationes ventris, et stomachi dolores prodest, cū seseli et nardo Gallico potum: fastidia discutit, et arquatos sanat madefacti dilutū, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cū melle appositum. Cōtra fungorū strāgulationes conueniēter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cū vino itē cicula, et muris aranei morsibus, et draconis marino.

P iiij

DIOSCORIDIS

Angina eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorū caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs et iocineri, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoq; longa valetudine laboranti, cum rosaceo: cū ficis autem, aceto & loliacea farina, aquæ inter cutē lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absynthiten vocant, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cū febris carent: alioquin in æstate propinant, & acceptam huic vino incolumitatem referunt. In sparsum arcis absynthium, vestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentū librarium diluto eius tēperatum, literas à murium erosionē tuetur. Existimatur liquamentū eosdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniā stomachū malè habet, & capitis ciet dolorem. Sūt qui cocta amurca, liquamentū adulterāt. Marinum Absynthium. Cap. XXIII.

Absynthium marinum, quod aliqui seriphū vocant, copiosissimum in Tauro monte: iuxta Abroxta Cappadociam & in Taphorisi Aegypti gitonū magnitur: quo Isiaci pro oliue ramo vtūtur. Herba ē rē intelli tenuis, & abrotoni parui similitudine, referta minge. nutulis seminibus, subamara, stomacho inimica.

Ea graniter olet, et cum quadam calfactione adstringit: per sese, aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum laeuigat: cum edulio autem vel lenticula decocta, eadem prestare potest. Peccra maximè pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absynthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Sātonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absynthio non dissimile, verum subamarum est, nō adeò seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

Abrotonum. Cap. XXV.

Abrotonum duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim, incis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodit, suauiter olet, cum grauitate quadā & amaro gustu: id genus Siculum esse cōstat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis vti absynthiū. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atq; in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritū & feruefactū ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialiū venenorum antidotū est: horroribus ex oleo illinitur: serpētes & substratu & nidore fugat: contra ictus eorum cum vino po-

DIOSCORIDIS

tum prodest privatim efficax contra scorpionū & phalangiorum venena: oculorum inflammationibus commodè illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane tritum cū farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit: irini compositionibus admiscetur.

Hyslopum. Cap. XXVI.

Hyslopum, herba nulli nō cognita, duum generum est, montanum & hortense. Optimum est Ciliciū. Vim habet extenuandi & calfaciendi: decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumonicis, diuturna tussi, suspiriosis, destillationibusq; & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Idem facit, si cū melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctū ex aceto mulso epotum: & ad subducendam aluum cū ficis viridibus detritis manditur, vehementiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit: colorem in corpore fouet lieni, & aque inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex vino illinitur: cū feruente aqua impositum, sugillata discutit cum decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat: inflammationes auricularum vaporis suffitu discutit.

Stoechas. Cap. XXVII.

Offici= Stoechas iuxta Galliam in insulis eiusdē nominis, Stenis è regione Massilie gignitur, unde cognomen chas Aratum accepit. Herba tenuibus surculis, comæ thyni, bica. longiore folio, subamara gustu, et aliquantū acris.

Cuius decoctū hyssopi modo, ad pectoris vitia effici-
cax est. Antidotis miscetur. Viscera omnia & vni-
uersum animantis habitum extenuat, ab obstru-
ctionibus & sacris liberat.

Origanum. Cap. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod & cuniculā
vocant, folium habet hyssopo non dissimile:
umbellam aut non in rotā speciem orbiculatā, sed
veluti multifidam, semine in summis virgis haud-
quaquam denso. Excalfacit: unde decoctum cū vi-
no potum, demorsis à serpente conuenit. Si cicutam
aut meconion hauserunt, ex passo: si gypsum aut
ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, con-
uulsis, hydropicis, cum fico esui datur. Aridum ace-
tabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humo-
res per aluum extrahit: menses ciet, & iussi cum
melle linctum medetur: ad pruriginem, psoras, re-
giumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Suc-
cus virentis tonsillas, vuam, & oris vlcera sanat,
& per nares, ex oleo irino infusum, trahit: aurium
dolores cū lacte mulcet. Conficitur ex eo, & capis,
et rhois frutice, quo ad obsonia vtuntur, vomitoriū
medicamentum, his omnibus in cupreo vase per dies
bis videnos insolatis, dum caniculæ sydus flagrat.
Herbæ aut substratu serpentes fugantur. Quæoni-
tis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo simi-
lior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis
ei origani Heraclei, sed multò inefficacior. Syluestre

DIOSCORIDIS

origanum, aliqui panaces Heracion, alij cunilam
vocat, ex quibus est Nicader Celophonius. Folijs
est origani, ramis tenuibus, doratē altis, in qui-
bus umbelle anethi insunt, flores candidi: radix te-
nuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente,
folia & flores ex uino poti auxiliantur.

Tragoriganum. Cap. XXIX.

Tragoriganum tenuis frutex est, sylvestri ser-
pillo aut origano similis, folio & ramulis.
Quibusdam in locis latius virentiusq; inuenitur,
& latioribus folijs, satis glutinosum. Alterū exili-
bus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prasiū
vocaere. Optimum est Cilicium, & Cretense, &
Smyrneum, & in Chio cooq; proveniens. Omnia
excalfaciunt, urinam cient, aluo accōmodantur,
decocto poto bilem deijciūt, lienosis ex aceto bibere
prodest, cōtra pota ixiæ venena in vino bibuntur,
menses trahunt: peripneumonicis, tussientibus, ex
melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorū po-
tio est: quare cibum fastidientibus & stomacho
acida ructanti, imbecilloq; traditur. Itē si a mari-
tima iactatione nausea et æstus præcordiorū exci-
tetur. tumores vero cum polenta illita discutunt.

Pulegium. Cap. XXX.

Pvlegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat,
calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac par-
tus eijcit: pulmonis vitia ex melle & aloe potum
extrahit, & convulsis auxiliatur. nauseas stomas

LIBER TERTIVS. 119

chiq; intercisiones, ex posca permulcet: atrā bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissimè cōtra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti cinere corroborat: illitum cum polenta inflammationes omneis sedat, podagris per se subuenit, impositum vsque dum rubescat locus: cum cerato varos extinguit, lienosis cum sale vtiliter illinuntur: decoctum eius ablutas pruriginis mitigat, conuersas vuluas corrigit, contra inflationes duritiasq; vulue, n de- sessiones conuenienter adiicitur. Vocant aliqui blechona, quoniā dum floret, gustatum à pecoribus, balatum concitat.

Dictamnium. Cap. XXXI.

Dictamnium, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretēsis herba est, acris, leuis, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia quæ sativum pulegiū, sed efficacius multò. nam non potum modo, sed appositū quoq; aut suffitum, defunctos partus eicit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbe pastu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polēta tritus. Herba impactos pedibus reliquoue corpori aculeos, illitu reficit. Ad lienis dolorem efficax habetur: si quidē ipsum imminuit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit, partus accelerat. Succus cum vino

Græcus,
Dicta =
mum: ac
sic etiam
Plinius.

DIOSCORIDIS

potus, contra serpentium morsus praesidio est. Tanta
herbae facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae
venenato ictu saeviunt, appensaque contactu exanimet.
Vulneribus ferro illatis, & venenatis mor-
sibus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam
ab instillatione statim in potu assumatur. Quod
pseudodictamnium vocant, multis in terris nasci-
tur, antea dicto simile, sed minus quam illud acre.
Eosdem effectus praebet, sed inefficacius multo. De-
fertur a Creta alterum dictamni genus, folijs si-
symbrum, ramis maioribus: in quibus flores sylue-
stris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisym-
brium & saluam iucundissimus. Efficax ad eas-
dem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris et
medicaminibus, quae aduersus serpentium iniurias
conferuntur, theriaca vocant.

Salvia.

Cap. XXXII.

Salvia siue eleliphacon, frutex est ramosus, lon-
gus, virgas habens quadrangulas, & canas:
folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora,
crassiora, & quae sensim attritarum quasi vestium
scabritie referant, hirsuta, subalbida, perquam iu-
cundo odore, sed graui: semen summis in caulibus
sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur.
Menses cit & urinas, decoctum foliorum ramoso-
rumque potus, & partus extrahit, et pastinaca ma-
rinae ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnerum
sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat: testium pri-

ritus sedant rami foliaq; , si & decocto eorum fo- & σὺν
ueantur. πινω ἢ

Mentha. Cap. XXXIII.

Mentha, cognita herba est, calfaciendi, adstrin-
gendi, atq; exiccandi vim habet. Sistit san-
guinem, potio ex aceto succo: lineas in ventre tere-
tes enecat, venerē stimulat, singultus, vomitiones,
cholerasq; sedant terni ramuli cum acidi granati
succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta
illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet:
mammæ, si tendantur, aut lacte turgeant, compe-
scit: cum sale, canum morsibus illinitur: aurium do-
loribus cum aqua mulsa subuenit: vulvæ ante coi-
tum admota, cōceptioni resistit: lingvæ scabritiem
confricta leuigat: coire lac, densariq; in caseum nō
patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In
summa, stomacho utilis est, & in condimentis pe-
culiarem gratiam habet. Sylvestris mentha, Lati-
ni menthastrū vocant, hirsutius est folio, & pror Mentha
sus maiore, quàm si symbrū, odore magis viroso: Strum.
quare minus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha. Cap. XXXIIII.

Ex calaminthæ generibus quedam montibus Calamē
familiaris, folia ocimi habens, incana, surcu thum of-
los, & caules angulosos, purpureum florem: Alte-
ra pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre
pulegium ideo appellarunt, quòd odore ipsum
emuletur: nepetam Latini vocitant. Tertia men- Nepeta.

DIOSCORIDIS

thastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruentia, & acria: radix supernacua. Nascitur in cāpestribus, asperis, & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, et vrinās expellit: ruptis, coluulsis, orthopnoeā, torminibus, choleris, horroribusq; auxiliatur: regium morbū expurgat: præsumpta in vino, venenu resistit: tineas ceteraq; interaneorum animalia, cum sale et melle pota, enecat: nec secus cocta crudāne, si teratur. Elephanticos esitata adiuvat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accēsa aut substrata, serpētes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & sugillata tollūt. Calamintha ischiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, summā cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

Thymum.

Cap. XXXV.

THymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs, multis & angustis circundatus: capitulis in cacumine, flore purpurascente refertis. Gracili solo, & petroso prouenit. Vim habet hanc, vt cum sale & aceto potum, pituitā per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit: vrinās ciet: cum melle in ecleg

in eclegmate, faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissolvit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit: ischiadicis cum vino, & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum, qui recte valent.

A N N O T A T I O.

Herba, quam Medici pro satureia hodie usurpant, hyssopi folio, thymum magnitudine longè exuperat, ut non esse genuinam, ac hic descriptam, satis eius historia conuincat.

Satureia. Cap. XXXVI.

Satureia triuialis notitiæ est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamè, & tenerior: desert spicam florum plenam, coloris herbacei. Eadè potest quæ thymum, si modo cõsimili sumptitetur. Aptus sanis usus: Est etiãnum quædam satina, syluestri prorsus minor, q̃ propter mitiorem acrimoniam, cõmodius in cibos recepta est.

Serpillum. Cap. XXXVII.

Serpillum duorum generum est: Hortense odore sampsuchum imitatur, atq; in coronas addi solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terrã attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores: in maceris multo procerius assurgit. Sylue-

Q

DIOSCORIDIS

stre, xygis appellatum, non serpit, sed in altitudine
 increscit, ramulos edens tenues, surculosos, folijs re-
 fertos, longioribus quam rutæ, & durioribus, angu-
 stis: flores iucunde olent, gustanti acres: radicis nul-
 lus usus. Nascitur in petris, satius efficacius, atque
 magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius.
 Menses trahit, urinam potius ciet: torminibus, ruptis,
 vulsis, & iocineris inflammationibus, auxiliatur:
 & aduersus serpentes potius illitue: capitis dolores
 mulcet coctum, adiecto rosaceo, & madefactum
 in aceto: maxime vero phreniticis, et lethargicis con-
 uenit. Cruentus vomitus sedat succus, drachmis qua-
 tuor ex aceto potus.

Sampfuchum. Cap. XXXVIII.

Sampfuchum in Cypro, & Cyxiceno laudatissi-
 mum: secundum sibi locum vendicauit Aegy-
 ptium. Amaracum gens Sicula, et Cyxicena appel-
 lat Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius
 calaminthæ, quæ tenui folio constat, hirsutis, &
 rotundis: suauissimum odorem spirat, ideo coronis
 inseritur. Vis eius excalfaciens: Succus decocti po-
 tus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos
 urinae difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex
 melle arida folia, sugillata tollunt: menses subditi
 in pessio trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto &
 sale illinuntur: luxatis tumoribusque, cerato excepta
 imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tu-
 moresque cum polline polenta illini prodest. Acopis ma-

lagmatisq; calfaciendi gratia commiscetur.

Melilotos, siue fertula Campana.

Cap. XXXIX.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam: inflammacionem omnem emollit, praesertim quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum aut addito oui luteo assato, aut sceni graeci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intyboue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, et cruda, & cocta cum aliquo ex antea dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum.

Cap. XL.

Marum herba cognita vulgo, surculosa, flore origani, folijs multo candidioribus, flore odoratiore. Vim habet si symbrio consimile. Substringit enim, & modice calfacit: qua de causa illitu serpentina vlcera sistit, et in calidas illitiones additur. In iuxta Magnesiā & Tralleis copiosissima gignitur.

Acinos.

Cap. XLI.

Acinos aut aconos à Graecis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis, odore

Q ij

DIOSCORIDIS

rata, sed hirsutior qua coronæ factitantur, à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis.

Cap. XLII.

* iuodns
id est odo
rata. **B**accharis herba * fruticosa, q̄ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicāte, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squallidumq; solū amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diurnæ tussis, & vrinæ difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilissimè datur in vino. Recens radix apposita, partū extrahit puerperis eius decoctū in desensionibus prodest: in diapasmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, vtpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu prosunt: oculorū inflammationibus, māmis tumentibus à partu, egypcijs incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta.

Cap. XLIII.

Ruta montana sylvestrisq; sativa et hortensis acrior est, & in cibis damnata: sativa vero quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraq; vrit, calfacit, exulcerat: vrinā ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibove lethæ

tium medicamentorum antidotum est, si semen ex
 vino, acetabuli mēsurā, ebibatur. Folia per se prae
 sumpta, aut cum nuce iuglande, aridisq; ficis, inef
 ficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes
 simili modo sumere conuenit: genituram cibo po
 tūe extinguit: cum anetho sicco decocta tormina
 sedat. Facit ad pectoris laterumq; dolores, difficul
 tatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, co
 xendicum articularumq; cruciatus, & horrores fe
 brium circuitu repetētes, pota vt antē dictū est. Atē
 ad inflationes coli, vuluæ, rectiq; intestini, cū oleo
 decocta, & infusa. Foeminas vuluæ strangulatio
 liberat, si à genitali, sede tenus cum melle subiicia
 tur. Feruesfacta ex oleo, & pota, vētris tineas ex
 cutit: articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cu
 tem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur,
 decocta in vino ad dimidias parteis, et oblita. Cru
 da conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores ocn
 lorum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cū
 rosaceo, & aceto illita auxiliatur, profluentē nari
 bus sanguinem sistit trita & indita, testium in
 flammationibus cum laureis folijs imposita, et erio
 ptionibus papularum cum myrto, & cerato pro
 dest. Cum pipere aut, uino, & nitro affricta, albæ
 vitiligini medetur. Cū eisdem illita fornicationes
 tollit, & uerrucas, quæ thymi florē representant:
 contra impetigines cum alumine, & melle utilissi
 mē imponitur. Succus in mali punici calyce calfa

DIOSCORIDIS

Etus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum sceniculi succo ac melle peruncti iuuatur: ignem sacrum, vlcera quae serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerusa persanat: mansu, alliorum caparumque acrimoniam domat. Montana, si copiosius estur, interficet. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Oportet itaque eam vinctis antea manibus, et facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis inspersum feles arceret. Adijciunt eam, quae in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est: in antidota commodè additur: contra incontinentiam urinae tostum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylvestris ruta sativae similis est. Prodest comitialibus, & coxendicis doloribus: menstrua movet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Sylvestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

Sylvestris ruta. Cap. XLIIII.

Vocant etiamnum sylvestrem rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asiae finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice, multos emittit cauliculos: folijs multò, quam alterius ruste longioribus, tenerioribusque, odore gravi: flore cā

dido: capitulis in cacumine paulò maioribus quàm
sativæ rutæ, quæ tribus maximè partibus cõstat:
in quibus triangulũ semen, subrusum, gustu ama-
rum recluditur, cuius est vsus. Semen autumnno ma-
turefcit: quod cũ melle, vino, croco, & fœniculi suc-
co, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculo-
rum aciem. Sunt qui eam harmalam vocent, Syri
besasan. Qui Cappadociã incolunt, moly, quoniã
quandã cũ moly seruet similitudinẽ: radice nigra,
flore candido. In collibus, & leto solo prouenit.

Moly. Cap. XLV.

Moly folia habet graminis latiora, humi spar-
sa: florem albæ violæ similem, sed minore,
ac magnitudine violæ purpureæ respondentem, la-
tius coloris: caulem candidum, quaternum cubito-
rum, in cuius cacumine inest aliquid, quod allij spe-
ciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in
modum valet ad aperiendas vuluas, si trita cum
rino vnguento, in pessa subiiciatur.

Panaces. Cap. XLVI.

Panaces nonnullis heracleũ dicitur, ex quo
opoponax colligi solet. Plurimum in Bœo-
tia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq;
cõpendij, & quæstus, qui ex eo liquore factitatur,
gratia studiose colitur. Folij est asperis, in terra ia-
centibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea ac-
cedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis: cau-
le, vt ferulæ, altissimo, qui lanugine quadam in-

Q iij

DIOSCORIDIS

canescit, folijs etiam minutioribus obsitus, muscae-
rũs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine
odorato feruenteq;: radices habet multas ab origine
una, candidas, graueolentes, crassi corticis, & sub
amari gustus. Nascitur in Cyrene Libya, & Ma-
cedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti cau-
lium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui
siccatus in summa cute croceum colorẽ contrahit.
Effluentem aut succum excipiunt, folijs excanato
solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo cau-
le mesibus inciso, profluentem succum eximunt. Me-
liores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq;: siccæ,
quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gu-
stu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed
ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Ma-
ximè in hoc succi genere probatur, quàm amarissi-
mus, internè albus, aut subfulvus, foris ad croci co-
lorem inclinans, leuis, pinguis, friabilis, tener, sta-
tim in aqua eliquescent, graui odore. Niger impro-
batur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut ce-
ra: sed synceri experimentum est, si digitis in aqua
friatus resolvatur, & lactescat. Excalfacit, mol-
lit, extenuat: horroribus febrium circuitibusq;: uul-
sis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio uri-
ne conuenit. Contra uesicæ scabiem ex aqua mul-
sa aut uino bibitur: menses trahit, foetum enecat,
inflationes, quæ uulnam malè habent, duritiasq;:
ex melle dilutus, discutit: ischiadicis illinitur, aco-

pis & capitis medicaminibus admiscetur, carbon-
culos rumpit, podagricis cum uua passa illitus sub-
uenit: dolore dentium liberat, canis inditus: oculorū
aciem illitu excitat. Ex eo & pice optimum fit em-
plastrum cōtra bestiarum morsus, quæ in rabiem
efferantur. Radix in ramenta conscissa, uulue ad-
mota, partus extrahit: ad uetera ulcera efficax est,
nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illina-
tur. Semē cum absynthio sumptum, menses pellit:
cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ
uenenum ei aculantur, & contra uulue strangu-
lus in uino bibitur.

Panaces Asclepij. Cap. XLVII.

Panaces Asclepij caulem à solo emittit tenuē,
cubitalem, geniculatum, circa quem folia fœ-
niculi funduntur, sed maiora tamen hirsutioraq;
odorata: in cacumine umbella, ubi flores emicant
aurei, odorati & acris gustus: radix parua est &
tenuis. Auxiliarem uim habent flores & semina,
cōtra ulcera, phagedenas, & tubercula, si trita cū
melle imponantur: aduersus serpentes ex uino bi-
buntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syl-
uestre origanum uocant, aliū cumilam, de qua in
origani mentione diximus.

Panaces Chironium. Cap. XLVIII.

Panaces Chironium, in Pelio monte maximè
prouenit: folium eius amaraco simile: flos au-
reus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu

DIOSCORIDIS

acris. Pota radix serpentium veneno resistit, illita
oma, eadem præstat.

Ligusticum. Cap. XLIX.

Galenus
Ibysti-
cum.

Ligusticum, quod alij panaceam, alij panaces
vocant, plurimū in Liguria nascitur in mon-
te Apennino, Alpibus contermino: unde nomen tra-
xit. Panaces incolæ non ab re appellant: quoniā &
radice & caule, heracleotico panaci simile sit, &
viribus eisdē præditum. Gignitur in altissimis aspe-
risq; montibus, ac vmbrosis, maximè uero iuxta
fluenta. Cauliculum fert anethi, geniculatum, te-
nuem, & in circuitu folia fertulæ campanæ, mol-
liora, odorata, prope verticem graciliora, & longè
magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semē
dependet nigrum, solidum & oblongum, fœniculo
proximum, gustanti acre, & aroma olens: radix
candida, heracleotici panacis similis, odorata. Ra-
dicis seminisq; vis excalectoriam, concoquens: pro-
dest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones.
Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus
turgeat: & contra serpentium ictus: urinas & mē-
ses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita
radix. Semen cū radice oxyporis & medicamentis
decoquentibus admiscetur: ori perquàm utile: qua-
re pro pipere vtuntur eo indigenæ, a l obsonia. Adul-
teratur semino quodam simili, quod facile gustus
discernitur: amarum enim est. Alij semen fœniculi
aut seselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

Pastinaca.

Cap. L.

Pastinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara. caulē rectum, scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferè ad croceum accedente: radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua movet. Iis convenit in potione, quos urinae difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutē subiit: serpentium morsibus ictibusque prodest: presumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuvat. Radix urinam pellit: venerē stimulat, partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedenas ulcerū purgāt. Satiua ad eadem pellet, efficacior tamen, & cibo aptior.

Seseli.

Cap. LI.

Seseli Massiliense folia foeniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum: degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent: potu stranguriae & orthopnoe medentur, suffocationibus mulierum comitialibusque prosunt, menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent, tussim veterem sanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus utile, & contra perfrictiones in itineribus, cum pipere

Recentioribus Si-
ler mon-
tanum.

DIOSCORIDIS

& uino bibitur: capris, cæterisq; pecudibus, datur in potu, quo facilius suos fœtus enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmatibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponnense folia habet cicutæ, latiora, et crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carum, & idem, nosius pendet. Eisdem uiribus præditum est: nascitur id est, in tur in asperis, riguis, & collibus: inuenitur & in Ida mon insulis.

te,

Creticum seseli. Cap. LII.

TOrdylum, quod aliqui Creticum seseli uocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbuli surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinae difficultatē bibitur, potu cit menses. Succo seminis, caulisq; uirentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Hic omnis

Sison.

Cap. LIII.

Sison exiguum semen est, in Syria natum, apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lieute descri nis uitia bibitur, urinae difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Quo in condimentis,

cum cucurbita, & aceto, indigenæ utuntur. In cæ-
cumine granula multa gerit.

Anisum. Cap. LIIII.

ANisum in summa excalfacit, exiccat: oris ha-
litum iucundiolem facit, doloris lenamentum
præstat, urinam ciet: aquam, quæ subijt cutem, dis-
sipat, potum sitim cohibet, animalium uenenis ad-
uersatur: ualet ad inflationes, aluum & alba fœ-
minarum profluuiâ sistit, lac ad mammas elicit,
uenerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum na-
ribus: cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis au-
ribus medetur. Melius semper recens, plenum, non
sursurosum, odore præstans, Inter prima laudatum
est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum. Cap. LV.

CArum, semē est uulgaris notitiæ. Excalfacit,
urinam concitat, stomacho utile, os commen-
dat, concoctionem adiuuat, utiliter miscetur anti-
dotis & oxyporis: anisi uicem præbet. Radix co-
cta, pastinacæ modo manditur.

Anethum. Cap. LVI.

ARidis anethi comæ seminisq; decoctum, potus
lac euocat, inflationes & tormina sedat,
aluum uomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus le-
nit, oculorum aciem hebetat, & genituram restin-
guit assidue potum. Fœminis uulue malo oportu-
nis, ad desefiones utile, * condylomata illitus eius
cinis tollit.

τὸ δὲ
καὶ ἐν κα-
ταπλα-
σθῆν

DIOSCORIDIS

Cuminum satium. Cap. LVII.

Cuminum satium ori gratū est. sed multò magis Aethiopicum, quod Hippocrates regiū appellauit. Secundum locum tenet Aegyptum: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut lolij farina ceratoue, Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum sanguinis profluvia sistit. Colorem bibetium aut perunctorium mutat in pallorem.

Syluestre cuminum. Cap. LVIII.

Syluestre cuminū, plurimum efficaciusq; in Lybia & Scia & Galatie Asia, atq; Carthagine Hispania Graecia gignitur: frutice paruo: dodrantali caute, ac tectus: sed nui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, veluti serrectius ratis, & gingidij diuisura. In cacumine capitula Marcel = quina, aut sena habet. mollia, rotunda: in quibus est lili, Gala semen acerosum, gustu satiuo acriore: nascitur in Asia. collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesq; item contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto sedat, stomacho vtile, quem humor vexat, sugillata tollit, si manducatum cum melle, & uua passa illinatur: testium inflammatio-

nibus, adiectis eisdem illitū medetur. Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis floribus promit cornicula in sublime exerta, in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpētium morsibus præsidio est. Calculosis & ijs qui vrinae stillicidio vexantur, aut cōcretum sanguinem cū lotio reddunt, auxiliatur, sed apij semen feruesfactum postea bibendum est.

Ammi.

Cap. LIX.

Ammi * Aethiopicum cuminum appellant, * ἐνίοτε καὶ τὸ γένος
 * plerique hoc natura diuersum esse ab illo * οἱ δὲ βασιλεῖς
 existimāt. Vulgò notum est: semen exile, multò mi * πρὸν κύριον καλῶσιν, ἢ οἱ
 nus cumino, origanum * respiciens. Eligendum est * τῇ γένει
 purum, minime fursufosum. Vis ei excalfactoria, * σκε
 feruens, & exiccans: facit ad tormina, vrinae diffi * σκε
 cultatem, serpentis iētus, cum vino potū. menstrua * σκε
 ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medica * σκε
 mentis, quæ ecdoria vocant: vt inde exortis vrinae * σκε
 difficultatibus resistat. Sugillata cū melle tollit, * σκε
 lorem potu aut illitu mutat in palliorem. Suffitum * σκε
 cum uua passa aut resina, vuluas purgat.

Coriandrum.

Cap. LX.

Coriandrum, aut corianum, vulgaris est noti * σκε
 tie, vim refrigeratorem habens. Quare illi * σκε
 tum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulce * σκε
 ribus quæ serpunt, medetur: epynictidas cum melle * σκε
 uel uua passa, testium inflammationes, carbunc * σκε
 culosque sanat: cum faba fresa, strumas & lue * σκε

DIOSCORIDIS

ἰατρικόν,

bercula discutit: tineas interaneorum expellit & semen cum passo potum, et genituram adauget: largius autem sumptum, mentem non sine periculo mouet, quare continuo, & copiosore usu abstinendum. Succus cum cerusa, spumaue argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

Hieracium.

Cap. LXI.

Hieracium magnū, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex intervallis rariusculè diuisa, similia soncho per ambitū: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi, habet, & modicè substringendi: unde illitū, stomacho æstuati, inflammationibusq; prodest. Succus erosionē stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à scorpiōe ictibus auxiliatur. Hieracium parvū, folia eodem modo obtinet ex intervallis diuisa per ambitū, cauliculos teneros, uirētes, in quibus lutei flores, orbē circinātes, emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

ANNOTATIO.

Capitula cicutæ. Legitur in Græcis, corruptè ac nullo planè, si quid est in iudicij, sensu, κεφαλαία μηκωνίου παρεμφερή. id est, capitula succo papaueris similia. Videtur autē locus ex Theophrasto ac Plinio quo Oreoseliaon cicutæ folio describunt, hoc modo posse restitui: φύλλα κωνείω πα

ρεμφερή,

πεμφεγῆ, id est, folia cicutæ non absimilia:
quo d cum alijs satis aptè cohæret. Velim
tamen in hac re, vt & alijs omnibus, suo
quenque vti iudicio.

Apium.

Cap. LXXII.

Hortenſis apij herba ad eadem, ad quæ coria
num, conuenit: inflammationibus oculorū, Noſtrū
cum pane aut polenta illinitur: æſtuantem ſtoma- Petroſeli
chum mulcet: māmaram duritiā ex lacte cōcre num, vt
to contractā reprimi: vrinā ciet, ſiue crudam, ſiue colligi-
coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potum, ve tur ex no-
nenorum noxæ reſiſtit, quum vomitiones excitet: tis Plinij.
aluum cohibet. Semen vehementius vrinā pellit
contra ſerpentium venena, aut epotā argenti ſpu-
mā auxiliatur: inflationes diſcutit. Admiſcetur me-
dicamentis, quæ dolorum leuamenta præſtant: the-
riacis quoq; , ac tuſſis remedijs. * Eleoſelinum in * Apiū
humidis naſcitur, ſatiuo grandius, & ad eadem officina-
efficax. Oreoſelinum, cauē eſt dodrantem alto, ab rum.
radice tenui exeunte: per cuius ambitum ramuli,
* et capitula cicutæ, multò tamē tenuiora: ſemine
cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui: naſcitur
in petroſis & montibus. Vrinam ciet, ſemine ac
radice in vino potis: menses trahit. Antidotis,
necnon medicamentis vrinam cientibus, & excal-
factorijs, inferitur. Nec allucinari nos oportet, exi-
ſtimātes oreoſelinum eſſe, quod in ſaxis prouenit:
aliud enim eſt petroſelinum. Petroſelinum in Ma-

R

DIOSCORIDIS

cedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammij
 odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit
 ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes,
 & tormina prodest: laterum, renum, & vesicæ do
 loribus in potu subuenit. Admiscetur antidotis vri
 * Gale- uam cientibus Hipposelinum, * Latini olusatrum
 nus smyr appellant, aliqui smyrnion, quanuis aliud sit, quod
 nium. de proprie smyrnion dicitur, vt paulo post referemus.
 quo se= Est autem maius & satius apio candidius: caule
 quæti ca. alto, cauo, molli, habente veluti lineas: folijs latiori
 Romanis hus, in puniceum vergentibus: coma roris marini,
 sic dictū florum plena, dependentibus in cacumine corymbis,
 fuisse, li. antè quàm deflorescat: ea semine turget nigro, ob
 2. de A= longo, acri, solido, aromatico: radix dimittitur odo
 lim. fa= rata, candida nec crassa, quæ os cõmendat. In vni
 cult. tra= brosis & palustribus enascitur. olerum generis, vt
 dit. apium. Radix cruda coctæue estur. Folia cum cauli
 bus decocta manduntur, & per se aut cum pisci
 bus preparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim
 hanc habet, vt poto semine ex mulso vino menses
 cieat: argentes calfacit potu aut illitu: vrinæ stilli
 cidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Smyrnium. Cap. LXIII.

S Myrnion, quod in Cilicia petroselinum vocat,
 plurimum in Amano monte gignitur. Caulem
 habet apij, & stolones multos: folia latiora, sub
 pingua, ad terram infracta, robusta, odore medic
 cato, cum quadam acrimonia incunda colore in

luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, vt anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, sapore aspero, sicut myrrha, ita vt alterum alterius loco cedat: radix quoq; odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, et collibus, atq; squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbae, et seminis excoalsfacere. Folij muria maceratis ad obsonia vtuntur, aluum sistunt, radicem contra serpentium ictus bibere cōuenit, tusses & orthopnoeas mitigat, vrinae difficultati medentur: recentes tumores, collectiones, duritiasq; discutit, illita & vulnera ad cicatricem perducit: partus abortu vitiat, si feruefacta subiiciatur. Semen, lienis, renum & vesicae vitij prodest: menses & secundas pellit: commodè datur ischiadicis in vino, * Intelligit inflationes stomachi lenit, sudores ciei, & ructus, genō co- Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra ronariā febrium circuitus.

Elaphoboscum. Cap. LXIIII. num: sed

Elaphobosco fœniculaceus caulis est, & aut eā, quæ rorimarino similis, geniculatus: folijs duū simplici- digitorum: latitudine, vt terebinthi, prælongioribus, aliquantum asperis, circumfractis: adnata nocte ap- multa habet, ferentia umbellas anethi similes, & pellatur. semina eiusdem: florem subluteum: radice ternum de qua digitorum longitudinis, & crassitudinis vnius, c. 70. huius candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro oleris ius libri.

R. ij

DIOSCORIDIS

manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium morsibus resistere.

Fœniculum.

Cap. LXV.

Fœniculū si herba edatur, aut semen cū ptisanā bibatur, mēmas lacte replet. Comæ decoctū in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinā excitet: contra serpentium ictus in vino cōuenienter bibitur: mēses: ciet: in febris nauscam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices et cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandā oculorum aciē commodē temperantur. Extrahitur succus ad eadē valens, etiam semine viridi, ramulisq; et radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad occidentē spectat, succum reddit gummi similē. Caulem medium, dū herba floret rustici demetunt, igniq; admouēt, quod facilius vt caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue hipponiathrum.

Cap. LXVI.

Est & sylvestre fœniculum, magnum: fert autem semen canchryi simile, cuius radix iucunde olet, potaque stranguriæ medetur: menses imposita ciet: ventrem sistit, radice aut semine poto, & contra serpentium morsus auxiliatur, calcus

losq; comminuit, & regium morbum expurgat: la-
 etis abundantiam facit decoctum foliorum hau-
 stum, et fœminas à partu purgat. Traditur aliud
 hippomarathri genus, longo, exili, & angusto fo-
 lio: semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-
 calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo
 respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum. Cap. LXVII.

DAUCUM aliqui Daucium vocant. Creticum fo-
 lijs fœniculo simile, minoribus & tenuiori-
 bus caule dodrantali, vmbella coriandri, flore al-
 bo: semine acri, candido, hirsuto, suavisimi odoris
 in mandendo: radix digitali crassitudine & dodra-
 tis longitudine adolescit: in saxosis nascitur, & lo-
 cis sole illustratis. Aliud eius genus, sylvestri apio si-
 mile, acre, odoratũ, aroma olens, feruentis gustus.
 Probatissimũ Creticũ. Tertium assignatur genus
 folijs coriãdri, floribus albis, capite & semine ane-
 thi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini,
 acri. Omniũ semẽ excalfacit: potum vrinã, menses,
 & partus extrahit, torminibus liberat, veterẽ tuf-
 sim mitigat: phalãgiorũ morsibus potũ in vino au-
 xiliatur: tumores illitu discutit. Seminis dũtaxat ò
 alijs generibus inualuit vsus: in Cretico, etiã radi-
 cis, quæ maximè cõtra venenatorũ iniuriã in vino
 bibitur. Delphiniũ. Cap. LXVIII.

DELPHINIUM, surculos emittit à radice vna
 sesquipedales, aut maiores, à quibus folia

R iiij

DIOSCORIDIS

exerunt parua, tenuia, diuisa, prelonga, quæ delphinorum effigiem repræsentant: unde tractum nomē est. Flos violæ albe non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo non aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque ignis uos torpescere: semota uerò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est delphiniū, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Pyrethrum. Cap. LXIX

Pyrethrum Romani saliuarem vocant, folia caulemque emittit ut daucum syluestre & foeniculum: umbellamque anethi, circinate rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit: ideò in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituita extrahit: sudores ciēt, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax est & contra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximie conducit.

Rosmarinus. Cap. LXX.

Canchrys

Dvoris marini genera: vnum fecundum frugiferumque, cuius semen canchrys vocatur. folia foeniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concanum alis: in

cacumine umbellam, in qua semen copiosum, can-
didum, sphondylo simile, intundū, angulosum, acre,
resinaceum, quod in mandendo linguam exurit: ra-
dix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alte-
rum omnino consimile, semen ferens latum, nigrū,
vti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radi-
ce foris nigra, intus si frangatur, alba. Verū id
quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem re-
fert: sed neque caulem, neque florem, neque semen
promit. Nas citur in saxosis & asperis. Trita om-
nium herba communiter hæmorrhoidū profluvia
sistit, sedis inflammationes & condylomata miti-
gat, concoquit strumas & abscessus, qui ad matu-
rationem egrè perducuntur. Siccæ radices cum mel-
le vlcerū purgant. torminibus medentur cum vino
potæ, & contra serpentū morsus conueniunt: men-
ses et vrinas cient, veteres tumores illitu discutiūt.
Tam radice quàm herbe succus, adiecto melle illi-
tus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadē
pollet, si comitiale malum sentiatur, aut vetus pe-
ctoris vitium, auxilio est: regio morbo laborantibus
cum vino & pipere datur: sudores mouet, cū oleo
perunctum: ruptis & conuulsis prodest podagris,
cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur: pur-
gat vitiligines, addito aceto quàm acerrimo. Semi-
ne in potionibus vtendum, eius quidem quod can-
chryn non ferat, quippe illud sua acrimonia ar-
teriam exasperat. Rosmarinum cum erica nae

R iij

DIOSCORIDIS

sci, folijs lactuce sylvestris amara asperioribus, candidioribusq; radice breui, Theophrastus author est: potuq; id ipsum alterutra parte purgare. Cancchrys vim habet excalfaciendi, & vehemēter excicandi, quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die solvatur.

Rosmarinum coronarium. Cap. LXXI.

Rosmarinum, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia. subter incana, supernè virentia, & diu Mar graui odore. Excalfactoria vi præditum est: regiū cellus, cū sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & vbi laborans exercitationi se crete odora diderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoq; vnguento admisceri solet.

Sphondylium. Cap. LXXII.

Sphondylium folia quadāntenus platani & panacis habet: caules foeniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, et magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit: medetur iocineris vitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vulnarum strangulationi. Vternosos suffitu reuocat: cum alio cōmodè infunditur capitibus phrenia.

vicorum, & lethargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentina vlcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrassa eadem, & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula.

Cap. LXXIII.

F Viridi ferula medulla pota utilis est ad cruentas excreationes, coeliacosq; & contra viperarum morsus in vino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur sudores ciet, vincto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: maria condiuntur. * Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitorum: folia fœniculi, longe asperiora, & latiora. qua ab imo caule vulnerata, sagapenum efficitur.

* Desunt in codice nostro greco, ac anti-

Peucedanum.

Cap. LXXIII.

P Eucedanum, caulem emittit tenuem, gracilentum, fœniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq; flore luteo: radice nigra, crassa, gravi odore, succosa. gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; è plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidem confestim evanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentia-

quissi-
mis qui-
busque
Marcello
teste.

DIOSCORIDIS

tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac, quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti est mādāgora: verum inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusque adherens. Præfertur succus est Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum peucedanum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, comulsi: omnibus, in vniuersum, vitij nervorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veternosi renocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. Canernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissime ex ovo assumitur, suspirijsque, & torminibus, et inflationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absorbet, difficiles partus mire adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, & vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida ulcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerato, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pape calido, aut anetho resoluitur.

✱Herba doctis omnibus pro melanthio recepta, foliis fœniculum potius quàm senecionem uidetur imitari, ut certè locum hunc esse aut depravatū, aut uerum ignorari melanthion, sit suspicandum.

Gith, seu Melanthium.

Cap. LXXV.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos dodrantes excedens: folijs ✱: ut senecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurfantibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit. discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentiginēs, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum: circumsarificatos clauos excutit, cum vetere urina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto, & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum: urinā & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit, difficultatem spirandi cum uino potum leuat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

D I O S C O R I D I S
Laserpitium, & Laser. Cap. LXXVI.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix excalfacit: in cibis egrè concoquitur, vesicae noxia: sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat cibis aut sali permista. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. praefertur autem rufum, translucens, myrrhae emulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenai cum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeò ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabae lomento: quod maleficio deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia masseton vocauerunt. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dens

LIBER TERTIVS. 135

tium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circunligatur, aut cum hyssopo, sicis coctis in posca, os colluitur: ijs prodest, quos bestia in rabiem efferrata momorderit, vulneribus immissum: valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quæ virus eiaculantur potum, aut illitum: scorpionum plagis oleo dilutum circunlinitur: gangrænis præcoercitis immittitur: & cum ruta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos callosq; prius circunrasos vellit: cerato aut aridorum sicuū carne præmolitum, recentes lichenas ex aceto sanat. Et ex crescentia in carne, polyposq; , si aliquot diebus cū atramento sutorio, aut æruginè illinatur: extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur: grauem, subitoq; iræcescentē vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: vnam illitum cum melle reprimat: anginis ex aqua mulsa vtilissimè gargarizatur. rescentes eo, letiore colore mangonizat: tussi commodè in sorbili ouo datur, et pleuritici, in sorbitionibus in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis: horrores discutit cum vino, pipere, & thure potū: nervorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum: hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha potū: cœliacos adiuvat, in acino vna sumptum: cum lixi

DIOSCORIDIS

uio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq;
prodest: ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut
ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem
proficitur, sed multo inefficacius: cum aceto mulso
manditur, ad expediendam arteriam, maxime cū
vox retunditur. eo cum lactucis vtuntur: exitq; in
vicem eruce. Fertur & altera m. i. gularis in Li-
bya nasci, radix la serpitio similis, sed minus cras-
sa, acris & fungosa, ex qua non profuit succus:
eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. Cap. LXXVII.

S Agapenu ferulaceæ herbe succus est, quæ
in Media nascitur. Optimum est traslucēs,
fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio
quid inter laser & galbanū redolens, gustu acri.
Prodest laterū, et pectoris doloribus, tussibus vetu-
stis, conuulsis, et ruptis. Crassam pulmonis pituitā
expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lieno-
sis: itē contra neruorum resolutionē, perfrictōes,
& febrium circuitus in potu: in vnguenta probe
admittitur: menses pellit, sed fœtum exanimat, cū
hydromelite potū: prodest ex vino haustū serpētū
ictibus. olfactū ex aceto, vuluerrū strāgulatus ex-
iccat, oculorū cicatrices, offusā caliginē, hebetudi-
nes, suffusioesq; detergit. Resoluitur vt laser, ruta,
aqua, et amaris nucibus. aut melle, aut calido pæ.

Euphorbium. Cap. LXXVIII.

Euphorbium Libycæ arbor est, ferulæ spec

ciem habens, quæ * in monte Atlante iuxta Mau * Ita
ritaniā inuenitur. Ea acerrimo succo turget: cuius Plin. græ
eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos cus in
ventres elutos, arbori circumlingāt, & eminus cau tmo-
lem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde
atq; vase quodam, in ventriculos copiosus lactis
humor effluit, præter id quod humi sparsum, vul-
nus ei aculatur. Duo succi genera: vnum orobi ma-
gnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ven-
triculis concrevit, atq; vitreum spectatur. Eligen-
dum est translucens, & acre. Euphorbium adalte-
ratur sarcocollæ, & glutini mistione, sed difficile
quidem experimentum: quippè cū leui gustu, os
accēsum diu detineat, adeo vt quicquid ori obijcia-
tur, planè euphorbium resipiat. Eius inuentio tem-
pore Iudæ regis Iubæ cognita extitit. Succus illius
suffusiones discutit: potus tota die exurit: quare
melli collyrijsq; pro acrimoniæ ratione admisceri
debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera po-
tione haustus. squamas ossium eadem die exiit:
verum eo vtentes, necesse est linamentis aut cera-
tis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Ali-
qui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente ni-
hil molesti passuros, si icisa osse tenuis capitis cute
tritrus succus infundatur, vulnusq; postea cōsuatur.

Calbanum. Cap. LXXIX.

G Albanum succus est nascentis in Syria fe-
rule, quæ nonnulli metopium vocant. Ma-

DIOSCORIDIS

ximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effi-
 giem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens
 nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, graui odore,
 neq; valde humidum, neq; nimis aridum. Adultera-
 tur faba fresca, resina & ammoniaco. Galbanum
 excalfacit, vrit, extrahit, discutit: menses ac par-
 tus trahit appositum vel suffitum: lentigines aceto et
 nitro perunctas tollit: deuoratur ad tussim veterē,
 difficultatem spirandi, suspiria, rupta, cōulsa: ad-
 uersatur toxicis, potum cum vino & myrrha. si-
 mili modo sumptum mortuos partus extrahit: im-
 ponitur lateris doloribus, & furunculis: comitia-
 les, & vuluæ strangulatus, & vertiginosos olfa-
 ctu suscitatur: si vratur, fugat nidore serpentes, &
 perunctos feriri non patitur: serpentes cum oleo
 & sphondylo circumpositum, necat: dentium dolo-
 rem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat. vrinæ
 difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potio-
 nes amaræ nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pa-
 ne, mulsæue, aliàs meconio, cre, vsto, aut felle liqui-
 do. Si purgare Galbanū voles, in feruentem aquā
 demittito: namq; cum liquefactum fuerit, eius sor-
 des fluitabunt: quas hoc modo facile separabis:
 mundo linteo raroq; alligatum in fictili aut ærea
 pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: oper-
 toq; vase in feruidam aquam demittito: sic enim
 syncerum veluti per colum eliquescet, et lignosum
 in linteo remanebit.

Ammoniacum.

Ammoniacum. Cap. LXXX.

Ammoniacum, ferule succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus trhausma, id est, friaturam appellant: quod vero terram, & calculos collegit, phyrama. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiesque; discutit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachmae potere haustum: articulorum coxendicumque; doloribus liberat: auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeat: cruentam urinam pellit. albugines oculorum absterget: genarum scabritiam absument: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisque durities sedat: discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. Cap. LXXXI.

Sarcocolla, lacryma est arboris in Perside nascetis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones in-

S

DIOSCORIDIS

hibet : emplastris inseritur . Adulteratur admisto
gummi .

Glaucium. Cap. LXXXII.

Glaucium, succus est herbae, quae ad Hierapolim
Syriae nascitur, folijs ferè corniculati papave-
ris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris
tetri, gustus amari : tota croceo succo madet. Folia
in olla fictili semisfrigidis clibanis calfaciunt indi-
gena, usque dum flaccescant, deinde contusis succum
exprimunt : cuius est usus ad oculorum medicamen-
ta, utpote cum inter initia refrigeret .

Glutinum. Cap. LXXXIII.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan vo-
cant, praestantissimum Rhodiaceum, quod ex
bubulis corvis conficitur, id candidum est, & trans-
lucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum
in aceto, impetigines leprasque cutis delet : ambustis
igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erig-
pere non patitur. vulneribus prodest, melle aut ace-
to madesactum.

Glutinum piscium. Cap. LXXXIIII.

Ichthyocolia, gluten piscium, vèter est piscis ceta-
cei. Praestat candicans, natione Ponticum, sub aspe-
ru, minimè scabrum, et quod celerrimè liquefcit. Vti-
le emplastris, capitis & leprarum medicaminibus,
& tetanothris, quae cutem faciei erugant, et extēdunt.

Viscum. Cap. LXXXV.

Viscum optimum est recens, intus porraceum,

LIBER TERTIVS. 138

extra fuluum, quod asperi nihil, aut surfurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fruticis folio: contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plevisque alijs arboribus: quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad maturationem perducit: cum resina autē, & cera pari, epinyclidas in splenio sanat: vetera vlcera abscessusq; quos cacoechi vocant, ex thure molli: lienē cum calce, gagate, aut Asio lapide coctū, & impositum absomit: cum sandaracha, aut auri pigmento illitū, vngues extrahit: mistum cum calce, & vini fece, suam vim intendit.

Aparine. Cap. LXXXVI. Vulgò

Aparine ramis multis, & paruis fruticat, asperguas peris, quadrangulis, per intervalla orbiculato foliorum ambitu, ut in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concavum, albū, umbilici figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximendos à lacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra viperarum phalāgiorumq; morsus auxiliatur: infusa aurium dolori medetur. Herba cū axungia trita strumas discutit.

Alyssum. Cap. LXXXVII.

Alysson exiguus frutex est, vnicaulis, sub-

DIOSCORIDIS

asper, rotundis folijs fructu duplicium scutorū effigie, in quo est semen, quadāntenus latum. in mōtibz, et asperis locis emicat. Eius decoctū singultus sine febris, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. Cap. LXXXVIII.

Asclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, lōga: radices numerosas, tenues, odoratas: floris virus graue: semen securidacæ. nascitur in mōtibz. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ māmārumq; vlcera, quæ cacoethe vocāt, illinūtur.

Atractylis. Cap. LXXXIX.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multò longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaq; qua foemine pro fusis vtuntur: capitula in cacumine spinis horrent. flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere, & vino teruntur vtilissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudesce.

Polycnemum. Cap. XC.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs origani caule, ut pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamē in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinādis recēs, aut aridū cum aqua, efficaciter illinitur: se l quinto die solui debet. Ad vrinae stillicidia ruptaq; cum vino bibitur.

Clinopodium. Cap. XCI.

Clinopodiū frutex est folijs serpyllo similis, surculosus, duūm dodrantū altitudine. nascitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti speciem lecti pedū præbent. Bibitur herba & succi eius decoctū, ad convulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, eijcit, aliquot diebus potū. aliuū sistit decoctū ad tertias, potūq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum. Cap. XCII.

Leontopetalon, caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concauum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemone similes, punicei coloris: folia brassicæ, sed papaveris diuisura. radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis et fegetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota: nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

DIOSCORIDIS

Teucrium. Cap. XCIII.

* Chamædry =
os.

Teucrium, siue, vt alijs placet, teucrium, herba est virga referens effigiem, * trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; vbertini provenit. Recens cum posca, aut arida feruesfacta ius, potu lienem potenter absomit: lienosis cum aceto et ficis illinitur: item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. Cap. XCIII.

* Plin.
colore:
quod &
ipsum
herbæ
pulchrè
cõgruit.

Chamædry Cræcis, alijs chamædrops, Latinis trissago dicitur. sunt qui eam teucrium appellare, propter eam quam cum teucrio, servat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis frutex dracunculæ, folia habens exigua, amara, * effigie et diuisura quercus flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tußibus, indurato lieni, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: cit menses: partus extrahit, lienem ex aceto pota consumit: aduersus serpentium venena ex vino, potu, illitq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est calfacere.

Leucas. Cap. XCV.

Leucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen quàm sativa habetur.

Vtraque ex vino contra animalium venena, præcipue marinorum opitulatur.

Lychnis. Cap. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ simili, sed purpureo, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bilē per alium detrahit, semine duobus drachmis poto: ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium. Cap. XCVII.

Lilia coronamentis se dedunt, Lyria à quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, nervos & priuatim uulnæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruefacta, ambustis proficiunt: aceto condita, uulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inasata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, uulnam emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervis præcisis, luxatisq; medetur: uitiliginēs, surfures, & lepras emendat: ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen pitum

S iij

DIOSCORIDIS

morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris se
 * πορφυ men & folia cum vino illinuntur. Tradunt & *
 πα, id est rubra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Paphy=
 purpu= lie, efficacissima vnguentis nascuntur.
 rea.

Ballote. Cap. XCVIII.

Vulgò **B** Alloteu, nomine alio nigrum marrubium vos
 Praestum cant: caules edit quadrangulos, nigros, subhir=
 foetidū. sutos, complures ex vna radice. folijs maioribus
 quàm marrubij, hispidis, cingentibus per interval=
 * στρο= la caule, * subrotundis, graueolentibus, apiastro pro
 γυλο πι= ximis. vnde aliqui apiastrū eam vocauerunt: candi
 πα, id est, di flores vniuersi uerticillato ambitu caule coronāt.
 rotundio Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex
 ribus. sale illitis: feruēti cinere flaccescūt folia, vt cōdylo
 Plinius mata reprimāt: purgāt et sordida vlcera cū melle.
 nigriori

Apiastrum. Cap. XCIX.

bus:
 quod **M** Eliphophyllon siue melithæna, id est, a
 magis piastrum, id sibi nomen vsurpauit, quo
 arri det. liculi et folia ballote, de qua paulò antè diximus,
 Melissa similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsu=
 officinis. ta spectarentur: citreum malum olent. Folia cum
 vino pota aut illita prosunt contra ictu phalangio
 rum, scorpionumq; item aduersus canis morsum.
 Decocto eorundem gratia, foueri prodest: desessio=
 nibus foeminarum ad ciundos menses conuenit, den
 tes eodem in dolore colluuntur, dysentericis infundi
 tur. Fungorum strangulationibus folia, addito ni=

tro, potu auxiliantur: torminibus & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Marrubium.

Cap. C.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, cādicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem æquat: subrotundū, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex intervallis: flores verticillato ambitu, asperi. Nasquitur propter ædificia, ruinas, & rudera.

Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eicit. Mulieribus a partu non purgatis datur, vt menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut a serpētibus demorsi sunt: vesicam renesq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia nomasq; sistūt, laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuvat: naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys.

Cap. CI.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris incundi, & complures virgas

DIOSCORIDIS

ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur
in montibus et asperis. Vim habet excalfactoria et
acre foliorum decoctum potu pellit mēstrua et secundas
Phyllitis. Cap. CII.

Phyllitis, folia promit runci similia, longiora,
& viridiora, sena aut septena, recta, quae
parte anteriore leuia cernuntur, à tergo autē pen-
siles quasi vermiculos tenues ostendunt: in umbro-
sis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo:
neq; caulem, neq; florem, neq; semen profert. Folia
in vino pota serpentium morsibus aduersantur:
quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dy-
senteria aut resoluta alius exercet. potui dantur.

Phalangium. Cap. CIII.

Phalangium à quibusdam phalangites voca-
tur & ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresue, in
diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, mul-
tas incisuras habens: semine nigro, lato, ad lenticu-
le dimidiata figuram, multò tenuiore: radice par-
ua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur: pro-
ninus. uenit in collibus. Huius folia, semen, flos tum vino
pota, auxiliantur contra scorpionum phalangio-
rumq; ictus: tormina quoque discutunt.

Trifolium. Cap. CIIII.

Trifolium, Graeci triphyllon, alij oxytriphyl-
lon, alij menyantes, alij asphaltion, vocant.
Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas
habens tenues, iunceas & nigras, unde ranculares

* οἱ δὲ
καὶ τὰν-
την λευ-
κὰ καὶ γα-
πιαλοῖσι
* Itaque
ninus.
Graecus
παχυ-
id est,
crasso.

evascuntur appendicule, in quibus terna singulis
 germinationibus exeunt folia, loto arbori similia:
 ijs recenter enatis rutæ odor inest: vbi autem adole
 verunt, bitumen olent. Florem edit purpureum, se
 men quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera
 extremitate exertum, antennæ modo corniculum
 gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & fo
 lia in aqua pota pleuritidis, urina difficultati, comi
 tialibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sen
 tiunt, foeminis quoque vulvæ vitio opportunis, au
 xiliantur: menses ciunt: ternæ drachmæ è semine
 dari debent, è folijs verò quaternæ. Contra serpen
 tium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præ
 sidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis,
 foliorumq; decoctū fotu dolores eorum sinire, quos
 serpentes percusserint: qua autē aqua sanatus quis
 fuerit, si ea quispiam alius foveatur, qui vlcus ha
 buerit, perinde afficitur vt à serpente demorsus.
 Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum
 vino potui dedere: et ī quartanis, quaterna, vt q̄ fe
 briū circuitus discuteret. Radix antidotis īseritur.

Polium.

Cap. CV.

DVo genera polij: montanum, cui teuthris
 nomen est. & cuius est vsus. Tenuis frutex
 est, candidus, dodrantalis, semine refertus: capi
 tulo in cacumine quandam corymborum speciem
 præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili,
 graviter olente, non sine quadam suavitate. Alter

DIOSCORIDIS

rum fruticosius, non vsque adeò valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefacti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto: stomachũ malè habet: caput doloribus afficit, aluũ & menses ciet: substratũ suffitũ ue serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

A N N O T A T I O.

Scordii hoc loco depicti uberrimus ubique est prouentus, ut non iniuria eorũ sit explosus error, qui alliũ syluestre, aut obuiam quamcunque herbam alliũ subolentem, hoc esse opinabantur. Est autẽ præter id, Plinio libr. 25. cap. 6. authore, aliud quoddã genus latioribus foliis ac menthastris effigie, cuius nuper in monte quodã ad Viennã ingens se copia nobis obtulit: nec alia sanè nota, quàm foliorum cũ menthastris similitudine, à scordio huic authori descripto, differre obseruauimus.

Scordium. Cap. CVI.

Scordium in montibus & palustribus nascitur, folijs trissaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus: quadrangulis caulibus, subrubro flore. Herba vim excelsæ etoriam habet: urinam cit. Cocta recens aridãue cũ vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, et urine

LIBER TERTIVS. 143

difficultatē, binis drachmis cum hydromelite: cras-
samen purulentum pectore expellit. Facit aride fa-
rina ad veterem tussim, rupta, conuulsa, si cum na-
sturtio, melle & resina misceatur in eclegmate: in-
flammata modicè præcordia, cerato excepta, re-
creat: cum aceto acri aut aqua podagris conuenien-
ter illinitur: menses imposita mouet: vulnera cōglu-
tinat. vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatri-
cem perducit. Sicca excrescentias in carne cohibet.
Succus ad eadē vitia bibitur. Inter prima efficax
Ponticum natione, Creticumq̃.

Tusfilago.

Cap. CVII.

Tusfilagini folia sunt maiuscula quàm hede-
ra, sex aut septem à radice, subalbida à ter-
ra, supernè virentia, in plures angulos excutia, cau-
lis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo vnà
cum caule confestim excutitur: inde nonnulli his va-
care existimauerunt. Radix tenuis est & superna
cua: nascitur in amoenis & riguis. Folia ex melle
trita igni sacro & omnibus inflammationibus illi-
tu medentur. Aride fumus per infundibulum hian-
ti ore raptus, hos sanat, qui sicca tussi atque ortho-
pncea infestantur: pectoris vomicas rum, it. Eundem
effectum præbet suffita radix. Decocta in hy-
dromelite, & pota emortuos partus eijcit.

Vulgò
ungula
caballi =
na.

Artemisia.

Cap. CVIII.

Artemisia magna ex parte in maritimis na-
scitur, absynthii modo fruticosa, maioribus

DIOSCORIDIS

& pinguioribus folijs, ramisq; : huius quidem genera duo . Vnum latius habitiusq; , folijs virgisq; latioribus . Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente tenuibus, flauo colore: hæc incundior quam præcedens efflat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat: feruefacta conuenienter in muliebres desessus adiunguntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; : item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos comminuant: remoratam vrinam cient. menses pellunt publi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadē quæ in seßio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia.

Cap. CIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudine trium palmorum: folijs rute, circa imum caulē exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquā florem pariunt, odore vinoso, suauis: radice tenui: sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys.

Cap. CX.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem

LIBER TERTIVS. 144

odorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnoeas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium.

Cap. CXI.

Geraniō folijs anemones, diuisuris longioribus: Gradice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ, in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cū suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus.

Pes colubinus
vulgo.

Gnaphalium.

Cap. CXII.

Gnaphaliū folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam.

Typha.

Cap. CXIII.

Typha folium edit *cyperidi simile: caulem album, leuem, æquabilem: florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominans. Huius herbæ flos suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

* Intelligē quālibet. i. cyperū vocant.

Circæa.

Cap. CXIIII.

Circæa, quam & dircæim aliqui vocant, folijs est hortensis solant, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine miliū, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrātali radice, tri-

DIOSCORIDIS

plici fermè aut quadruplici, candida, odorata, ex-
calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento
perflatis. Radicis tusæ pondo quatuor, in sextarijs
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-
tur, potuq; triduo vulvas expurgant. Semen in sor-
bitionibus datum, lacte mamas nutricum explet.

Oenanthe. Cap. CXV.

Videtur
nostra
Filipen =
dula. **O** Enanthe folia habet pastinacæ: florem candi-
dum. caulem crassum, palmi altitudine: semē
triplicis radicem magnam, in multa rotunda ca-
pitula extuberantem: nascitur in petris. Caulis eius
& folia, cum mulso vino pota secundas eijciunt.
Radix è vino, vrine stillicidio conuenit.

Conyza. Cap. CXVI.

Vulgo
pulica =
ria.

C Onyza duo genera. quæ parua vocatur, odore
prestatiore est: maior vero frutice altior & fo-
lijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oleæ simi-
lia, hirsuta, pingua. In maiore caulis binii cubitorum
altitudine attollitur, in minore pedem æquat. Flos fra-
gilis, lutei coloris, subamarus, qui in pappum abit: ra-
dices supernacule. Suffitu substratuq; frutex totus
serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Fo-
lia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tus-
berculis, ac vulneribus. Flores & folia cum vino
ad menses partusq; eijciendos bibuntur: item contra
vrine stillidia, arquatum morbum, & tormina. co-
mitiales pota ex aceto adiunant. Decoctum in desessio-
nibus medetur. vuluæ malis. Impositus succus abor-
tum

tum facit. Ex oleo efficaciter horroribus & oblini-
tur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & ter-
tium conyza genus, caule crassiore, ac molliore: fo-
lijs media inter maiorem ac minorem amplitudi-
nis, minimè autè pinguibus: multò gravioris hæc
est odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prone-
nit locis non riguis.

Hemerocalis, siue lilium sylvestre.

Cap. CXVII.

Hemerocallis folium & caulè habet lilij, por-
raceo colore: flores in caule per singulis exor-
tus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuisura, quo-
ties dehiscere cœperunt, colore perquã pallido: radix
magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum melle
& lana de pessa apposita, aquã educit & sangui-
nem. Folia trita mamarum inflammationes à par-
tu contractas, oculorumq; collectiones mitigant.
Radix et folia igni ambustis vtilissimè illinuntur.

A N N O T A T I O.

Leucoion, si nominis etymò spectes,
albam significat violam: solet tamen &
pro lutea, cœrulea ac purpurea vsurpari.
Nunc officinis Arabum ferè sequacibus,
Cheiri nuncupatur.

Leucoium, siue viola alba.

Cap. CXVIII.

Leucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus
differentia quedam: namq; aut cœrulei, aut

T

DIOSCORIDIS

albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruefacti in desefſionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menſtrua expellunt: ſanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas ſedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menſes, ſecundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratæogonum. Cap. CXIX.

Videtur
genus
Perſica =
riæ, non
macula-
tum.

Cratæogonum, ſiue, vt alijs placet, cratæonon, folijs melampyro ſimile eſt, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorū: ſemine milij: naſcitur magna ex parte in opacis & frutetoſis, ſummopere acre. Traditum eſt à quibuſdam, hoc ſi bibat ieiuino ore, ter die poſt mēſes purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & vir modo conſimili, totidē diebus ante coitum hauriat, virilis ſexus partum futurum.

Phyllum. Cap. CXX.

Phyllum, quod & eleephyllon vocatur, duum generum eſt: quod autem thelygonum appellāt, in ſaxoſis muſci modo gignitur, folio oleæ, ſed magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili: florem album profert: ſemen papaueris maiuſculum: Sed arrhenogonum cætera huic ſimile, ſolo fructu diſtat: habet enim racemoſum quiddam deflorenti

bus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculini sexus facere partus, ut thelygonon feminei proditur. Horum Crateus author est: sed huiusmodi historiâ tenus, mihi produxisse visum est.

Testiculus. Cap. CXXI.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocant, folijs circa imam caulis partem in terra stratis, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, leuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi: ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem femina, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam vero, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosi & sabuleti. Testiculus alio nomine serapias, Andrea auctore vocatur, quoniam radix ad multa utilis sit. folijs est porri, latioribus oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili. quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitus inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent: sanantq; putredinesq; , & oris vlcera caecoethe: aluum sistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo canis, produntur.

Officiis
falso
satyrio,
de quo
seq. cap.

T 4

DIOSCORIDIS
Satyrium. Cap. CXXII.

Satyrium aliqui trifoliū vocant, quoniā tria fert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florem lilij effigie, candidū: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam intus ut ouū, candidam, gustanti dulcem, et ori non ingrati: quā in vino nigro austero libere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dū cōcumbendi inces sit cupiditas, si quidem ea proniores ad venerē fieri affirmant. Est et alterum satyrium erythronium siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente: quod fertur, non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si omnino in anu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in vino.

Horminum. Cap. CXXIII.

Vulgò
Gallitri-
cum.

Horminū herba est, folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentie siliquis similes prodeunt, quæ ad radicē spectant, in quibus diuersum semen recluditur: si quidem in syluestri rotūdum, fuscumq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argamas albuginesq; , & illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahunt acu

lei ex corpore. Idem effectus est illi & herbae. Sylvestre magis viribus pollet: quare vnguentis, praesertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. Cap. CXXIIII.

HEdysaron, quod vnguētarij pelecinum, id est securidacam vocant, frutex est, folijs ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim a mulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho vtile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nasitur in segetibus & hordeis.

Onosma. Cap. CXXV.

Onosma, * oblonga folia habet, ad similitudinem anchusae, longitudine quatuor digitorum, * *ὅσπερ ἀνὰ*
& vnius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine *οἱ δὲ φλοῖον*
caule, sine semine, sine flore: radice nititur longa, tenui, infirma, rubescens: gignitur in asperis. Folia *νῆτιν, οἱ δὲ ὄνον*
in vino pota partus extrahunt. Praegnant, si eam *καλῶσι.*
supergradiatur, abortum facere dicitur.

Nymphæa. Cap. CXXVI.

Nymphæa nascitur in paludibus & stagna Nunc Nectibus aquis, folijs fabae Aegyptiae, minoribus nupharibus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente: cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput extuberat: nigro semine, denso & lato, lento

DIOSCORIDIS

gustus: caulis est levis, niger, minime crassus, Aegyptæ fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumnò secatur. Sicca cum vino pota cœliacis, dysentericisq; auxiliatur & lienem absomit. Radix stomachi ac vesicæ doloribus illinitur, vitiliginis ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecyis medetur. Eadem cōtra veneris in somnia bibitur: si quidem ea prorsus adimit, pota assidue aliquot diebus, genitaleq; infirmat. Idem semē potum efficit. Nymphææ nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bœotiæ Aliarto. Est & altera nymphæa, cuius flos blephara dicitur, folijs antè dictæ, radice alba, scabra flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen & radix, contra fœminarum profluvia efficaciter ex vino bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

Andro faces. Cap. CXXVII.

Androfaces herba est amara, tennes spargēs iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur: gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini poto, & herbæ decocto: podagris utiliter illinitur.

Cete= Asplenum. Cap. CXXVIII.

Asplenum, aliqui scolopendrion vocant, alijs splenion, alijs hemionium, folijs est multis,

*scolopendrea animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisq; siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semē habet: folia * filiculæ modo diuiduntur, subter flauescētia hirsutaq; supernè viridia. Vim hāc habēt folia in aceto feruesfacto, vt per dies quadraginta pota, lienem absumant: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese aut cū muli liene appensa. Tradunt noctu, silente lina, huius rei gratia effodiendam.*

*Polipodum.

A N N O T A T I O.

Ruellio & Fuchſio lingua ceruina nūc appellata: quam alij minus rectè fortassis, Phyllitida suspicantur, de qua suprà Capite C II.

Hemionitis. Cap. CXXIX.

Hemionitis, quā aliqui splenion vocāt, folium emittit dracunculi, lunæ modo incuruū radicibus coheret multis, tenuibus: nunquā flores, neq; semen, neq; caulem gignit: in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pot. i lienem absumit.

Anthyllis. Cap. CXXX.

Anthyllis duplex est: quædam enim lentissimillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine. radice parua, tenui. Nascitur in alſis terris, & à sole illustratis, non in sulso gurgulio.

T iiij

DIOSCORIDIS

* Cha= stu. Altera est folijs ramulisq; * aiuge similis, hirsutioribus tamen, brevioribus, & asperioribus. flore purpureo, odoris admodum gravis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor urine difficultati, renibusq; plurimum prodest. Tritæ, vulvæ pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacte imposta, vulneribus medentur. Quæ autem aiuge similitudinem refert, præter alia, pota cum aceto mulso comitiales sanat.

Anthemis. Cap. CXXXI.

Officinis
camomil
la. Cuius
nominu
varietas
ab inter=
prete o=
missa est

ANthemidis genera tria, tantum flore distantia. rami dodrantes, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis, parvis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medie aureis, foris secus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rute: nascitur in asperis, et iuxta semitas: colligitur vere. Vim habent radices, flores & herba excalfaciendi, extenuandi q; potu, & in sessione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq; aduersus inflationes, et ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgat: iocinerum vitia sanant: decocto earum vesicæ foveantur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hanc propriè heranthemon vocat. Ea, cui leucanthemo nomē est, itē quæ chrysanthemō dicitur, vehementius urinā ciunt. Aegylopijs illitæ medentur: cōmāducantē ulcerum eruptiones in ore

sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, te-
runturq; in farinam, ab abigendos febrium circui-
tus. Flores & folia recodi debent, & priuatim tu-
sa, in pastillos digeri: radix quoque siccari, dumq;
ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo
floris aut radice pars vna, modo contra floris par-
tes duæ & herbæ vna, permutatim duplicato pon-
dere, alternis diebus: bibere autem oportet in vino
mulso, diluto.

Parthenium. Cap. CXXXII.

PArthenium aliqui amacron vocant, folijs est Vulgò
coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, matrica
intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. ria. Sicca
tum, cum aceto mulso, aut sale potum, non secus
atq; epithymum, & bilem & pituitam detrahit:
suspiriosis prodest & melāchoicis. Herba sine flo-
re à calculosis, & anhelatoribus magna vtilitate
bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia
vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro
igni, & collectionibus, cum flore.

A N N O T A T I O.

Non sunt sequendi, qui Cotulam foeti-
dam vulgò dictam pro hoc obtrudunt.
Nam præter quàm quòd folia illius nullā
aut saltem parua cum foeniculo habeāt
similitudinem, flos eius non totus luteus
(quod in illo tamen requiritur) sed per
ambitum albus, ac intus tantum luteus

DIOSCORIDIS

conspicitur. quod haud dubiè Dioscorides, si Cotula illa verum esset Bupthalmum, minimè, vt nec in Parthenio, Narcisso, & Anthemidos, prima specie, silentio prætermisisset.

Bupthalmum. Cap. CXXXIII.

Bupthalthmon (quidam cachlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollèsq;: folia foeniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, vnde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores duritiàsq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. Cap. CXXXIIII.

Pæonia siue glycysside, Græcis aliquibus penthoron dicitur: sunt qui ideos dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia iuglandis habet: infœmina verò, smyrnii more diuiduntur. Summo caule alas in siliquis emittit, veluti & græcas nuces: in quibus, quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris & tenuis & digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba: foemina radicibus cerniglandes circiter septem aut octo inheret, vt in

LIBER TERTIVS. 150

*hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses nucis græcæ magnitudi-
ne pota: si ventris doloribus cum vino auxiliatur.
Valet cōtra regium morbum, & renum, ac vesicæ
dolores. Decocta in vino aluū sistit. Rubra grana
rubenteis menses sistunt, decē vel duodecim pota in
vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus
ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum exi-
mūt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus no-
cturnis vulvæ strāgulationibus et matricis dolori-
bus, quindecim numero pota, ī aqua mulsa, aut vi-
no. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.*

Lithospermum. Cap. CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomē accepit: Vulgò
milium
solis.
folijs est oīeæ longioribus, & latoribus, mollio-
ribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis
rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, li-
gnosis, in quorū cacumine bifidi exortus, cauliculo-
rū speciem exhibent: folijs longis, inter q̄ parvū se-
mē, rotundū, erui magnitudine, duritia lapidea. Na-
scitur in asperis & editis locis. Vim hāc habet, vt
semine cū vino albo poto calculos frangat, pellatq;
vrinam.

Phalaris. Cap. XXXVI.

Phalaris cauliculos emittit xæ culmis simi-
les, à minutis ac nullius vsus radicibus, mul-
tos dum palmorum, geniculis cinctos, gracilio-
res tamen ac dulces: semen candidum, oblongum,

LIBER TERTIVS. 151

ram procumbētia, pauca in caule, in quo flores, ceu
galericuli, hiātibus comicis personis similes, nigri,
& è rictu albam exerētes velut linguam, quæ ad
labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum
lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomentum
arrogauit: radix dauci. Nascitur in sitientibus, &
asperis, Radix ex vino pota vrinam ciet. Altera est
lonchitis, quam aliqui asperam lonchitum dicunt:
folia scolopendrij emittit, sed asperiora maioraq;
ac multò magis diuisa. Vulneribus mirum in mo-
dum prodest, in eisq; inflammationes excitari non
patitur. Pota ex aceto lienem absument.

Althæa. Cap. CXXXIX.

Althæa, quam alij ibiscum vocant, in sylue-
strum maluarum genere est, cui folia vt cy-
clamino, rotūda, lanugine canescunt: flore rosaceo:
bicubitali caule: radice lenta, intus alba. * Althæa
appellatur, quòd inter primas sit utilis, & pluri-
bus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut
aqua mulsa, & per se cū imponitur tusa, effi-
cax est cōtra vulnera: item ad strumas, parotidas,
abscessus, mammarum inflammationes, fracta se-
dis, inflationes, neruorum rigores: siquidē discutit,
& excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit.
Cocta, vt dictū est, adiecto suillo adipe aut anseri-
no, terebinthinæ, vt malagmatis lentor fiat, fa-
cit ad vuluæ inflāmationes, præclusionesq; in pes-
sis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: one

Vulgò
Bismal-
ua, &
Maluan-
scus.
* Ab αλ-
θαιω,
quod me-
deri si-
gnificat.

DIOSCORIDIS

ra vulvae, reliquiasq; à partu extrahit. Decocta &
 succus ex vino potus, succurrit vrinae difficultati,
 calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadi-
 cis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum
 aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccuq;
 tritum, vitiliginis in sale & perunctas emendat:
 * οὐν eodem cum oleo & aceto peruncti, a venenatis nō
 * ξα. feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sangui-
 nis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca autem
 decoctum hibitur, contra omnes vesparum, apum,
 similiuq; aculeatos ictus. Folia cum olei momen-
 to, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat
 aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea. Cap. CXL.

Herba **A**lcea sylvestrium malvarum generi assigna-
 tur: folia habet diuisa, verbenace proxima.
 Simeo- caules treis aut quatuor, cortice cannabino vesti-
 nis ul = tos: florem rose, paruum: radices albas, latas, quin-
 go. que aut sex, cum plurimu cubitales: quae cum vino
 aut aqua potae, dysentericis ruptisq; medentur.

Cannabis. Cap. CXLI.

Cannabis sativa planta magni in vita vsus
 ad robustissimos funes factitandos: folijs fra-
 * Fortè xini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semis
 eupato = ne rotundo, quod largiore cibo geniturā extinguit.
 rium ul Succus ex ea recente, conuenienter aurium dolori-
 gatum. bus instillatur. * Sylvestris cannabis virgas fert

LIBER TERTIVS. 152

althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio sativæ, nigriore & asperiore flore lychmidis, subrubro: semine & radice althææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articularum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

Anagyris.

Cap. CXLII.

A Nagyris * frutex est arboris instar, perz * δὲ δὲ
quàm gravis odore: folijs * agni, virz ἀνὰ θυγόν
gisq; flore brassicæ: semen in siliquis non δὲ δὲ ἀκο
breuibz gignit, subrotundum, firmum, versicolori πον κα
facie, simile renibus, quod durescit vna maturescen λείπει.
te. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt. si * Viticis
partus hæreat & secundæ mensesq; morentur,
drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspi-
riosi datur, & contra capitis dolores in vino. Dif-
ficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu
statim auferantur. Radicis cortex concoquendis di-
scutiendisq; adhibetur. Semen commaducatum vo-
mitiones vehementer ciet.

Cepæa.

Cap. CXLIII.

CEpæa portulacæ similis est, sed nigriora habet
folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota,
vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus, opi-
tulantur: maxime id præstat, si cum decocto radi-
cum asparagi eius, quem myacanthon, hoc est, cor-
rudam vocant, bibatur.

DIOSCORIDIS

Alisma. Cap. CXLIII.

*Vulgò **A**lisma, * alij damasonion appellant: folia
 plātago ei plantaginis, nisi angustiora essent, * laci-
 aquati = niosa, conuexa q; in terram: caule simplici, tenui, cu-
 ca. bito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido,
 *Vox ex pallescente: radicibus tenuibus, vt veratri nigri,
 Plin. ad- acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat
 iecta. tractus. Radix, si drachma vna aut altera biba-
 tur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarūt,
 aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hause-
 runt: torminibus atque dysenterie, per se, aut cum
 pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, et
 contra vitia vulue prodest. Herba sistit aluū, men-
 strua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. Cap. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, lōgiora paulò:
 caulem dodrantalem: florem puniceum: radi-
 cē paruum: nascitur in vliginosis & incultis. Her-
 ba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat:
 cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, si-
 dores mouet.

Hypericum. Cap. CXLVI.

Nostra **H**ypericum alij androsæmon, alij corion, alij
 erfora- chamæpityn appellant, quoniam semen odo-
 a. re resinam imitatur, surculaceo frutice, dodranta-
 li, subrubro, folio rutæ: flore luteo, qui digitis tritus
 sanguineum succum remittit, qua ex causa andro-
 sæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in ro-
 tundo

tundo oblōga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur locis cultis & asperis. Vrinam ciet, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quagdraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron. Cap. CXLVII.

Ascyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distās, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmum vocauere. Vfus seminis ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nā biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed asidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Allinētur & ambustis efficaciter.

A N N O T A T I O.

* Vinoso succo. } Marcellus sanguineo vertit, qui non vt Ruellius οὐδὲν, sed potius εἰματωδὲν, vti capite de hyperico, legisse videtur: quæ fortè lectio magis genuina. Nam & Plinius lib. 27. cap. 4. Androsæmi comam tritam sanguineo succo manare, tradidit.

Androsæmum. Cap. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenui-

DIOSCORIDIS

bus: rubentibus virgis, & folijs ruta, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita & vinoso succo manant: complureis alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasq; circa quas, flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papaveris nigri, insignis lineis. Huius comæ trita resinosum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, vulneribus sanguinem cohibet.

Coris.

Cap. CXLIX.

COris, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semē menses trahit, & vrinas: contra phalāgiorū morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix vino decocta potaq; defectis opem ferre creditur: sed laborantem inter potandum quàm optimè cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex quare pristinam agilitatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys.

Cap C L.

Vulgo
Iua ar-
thritica. **A**iuga herba in terra repens: & incurua similis: folijs semperuiui minoris, multò tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos

LIBER TERTIVS. 154

* densis, odore pinus flore tenui, luteo, vel candido. * ^{σ π ρ}
radice cichorij. Folia septem diebus in vino pota, re ^{κρυπτος}
gio morbo medentur: & quadraginta diebus ex ^{id est sub}
hydromelite, ischiadicos sanant: dantur peculiari ^{curva.}
ter vrine difficultatibus, iocineris, & renum ^{viz} ^{πυκνὰ}
tjys: torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponti id est, fre
cam, perinde atque antidoto cōtra aconitum vtun ^{quenti-}
tur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum ^{bus.}
polenta iure decocti subacta: trita in farinam &
cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta
melle, cum aris squama & resina deijcit: apposita
ex melle, vuluæ vitia extrahit: mammarum duris
tias discutit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpūt,
cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ,
cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis,
prætenuibus, coma supradictæ: flore candido: semine
nigro: hæc etiam pinum redolet. Tertia mas no
minatur, paruula, folijs exilibus albis, pilosis: can
le aspero, cādido: luteis flosculis, semine iuxta alas.
Resipit & hæc pinum. Hæc due vim superioris ob
tinent, sed non usque adeo efficacem.

TERTII LIBRI FINIS.

V ij

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER IIII.

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



RIBVS antè libris, amantissime Aree, tradidimus odora-
menta, olea, arbores, vnguen-
ta, animalia, frumenta, olera,
radices, succos, herbas, semi-
naq;. In hoc autem quarto dis-
seremus de radicibus, & eis,
que restant, herbis.

Betonica.

Cap. I.

Cestron psychotropho vocitatur, quoniam fri-
gidis locis inueniatur. Latini betonicam appel-
lant. Herba est, caulem serens tenuem, cubiti altitu-
dine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mol-
lia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem
maiora: in summis caulibus, semine veluti satureie
spicatum inest. Decerpta huius folia siccantur, pluri-
mos ad vsus. Radicibus nititur, vt veratri, tenuis-
bus. Que ex hydromelite in potu, pituitosam vo-
mitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuul-

sis, mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad laxã dos vteri strangulatus, denarij pondere cum hydro melite. tres in vini sextario drachmæ, contra serpẽtium morsus ebibũtur. Herba magna vtilitate illatis à serpente uulneribus illinitur: aduersus etiã uenena drachma ex uino pota cõuenit: præsumpta ea, si uenenum hauriatur, nihil nocebit: urinã ciet: aluum subducit: medetur comitialibus & insanis, pota ex aqua: & iocineris lienisq; uitij, drachmæ pondere in aceto mulso: concoctionem adiuvat, si quis eam fabæ magnitudine secundum coenam cū melle cocto deuorarit: modo consimili acida ructantibus propinatur. Stomachicis eam manducare et succum deuorare proderit, si postea dilutum uinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis, cum diluti uini egelidi cyatho: ischiadicis, renum & uesticæ doloribus, ex aqua: aquæ inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin aliter, ex mulso: regio morbo laborãtes recreat, menses pellit, orachmæ pōdere cum uino pota: alium purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem cyathis. Facit cum melle ad tabem & purulentam excreationem. Folia sicca tritaq; fictili uase reconduntur.

Britanica. Cap. II.

Britanica aut uetonica, folia habet syluestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstantia: radicem tenuem & breuem: caulem

DIOSCORIDIS

paruum emittit. Folij exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia.

Cap. CIII.

LYsimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales altioresue, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectione supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pessa sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur: uulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

Cap. IIII.

Nunc Cē **P**olygonum mas ramos habet teneros & extinodia. les, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen, repunt: folie rutæ, se. l. molliora longioraq: semine sub omnibus folijs turgescite: unde marem appellari uolunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excreationi, cholera, alui fluxionibus, & urinæ stillicidio: nam urinam aperte ciet. Cum

LIBER QVARTVS. 156

uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur, daturq; in febribus per horā ante significationes: fœminarum profluvia impositu sistit: idem succus purulentis auribus & instillatur. Facit eximie ad ge-
nitallū vlcera, cū vino, adiecto melle, decoctus. Sto-
machi seruire, sanguinis reiectionibus, vlceribus
que serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumori-
bus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. San-
guinaria fœmina fruticat vno caule, arundini tene-
re simili, densis geniculis, & in se tubarum modo
fartis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis
piceæ similes. Radicis nullus vsus: nascitur in ri-
guis. Huic quoque spissandi refrigerandiq; natura,
ad eadem valens, sed inefficacior.

Polygonatum.

Cap. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cu-
bito altiore: folijs lauri, latioribus, & leniori-
bus, sapore mali cotonei, aut punici, cum quadam
adstrictione: flores per singulos foliorum exortus
promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à ra-
dice supputatione: radicem habet albam, mollem,
longā, crebro geniculatam, densam, graueolentem,
digitum crassitudine æquantē: que vulneribus effi-
caciter illinitur. Quinetiā maculas in facie delet. Est quā

Vulgo fi-
gillū Sa-
lomonis.

Clematis.

Cap. VI.

Latini

Clematis humi serpit: leto, pinguiq; solo pro-
uenit, viticulas spargens crassitudine iunci exi-
guas: folio lauri figura & colore, multò minora. vocant.

Vincam

DIOSCORIDIS

Ea cū caulibus in uino pota, alui profluvia & dysenterias sedant: subdita in pessa cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulue medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita serpentum morsibus, iuramentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex acetopotae opitulari. Gignitur in terrenis. Est et altera clematis, que uulgo. uiticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbores, ut smilax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

Polemonia.

Cap. VII.

Polemoniam alij phileteriā, Cappadoces chilio-dynamiam appellant, ramis exilibus, utrinque pinnatis: folijs paulo quam rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut * sanguinariæ proximis, quibus in summis uelut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicanee, * radiculæ simili: nascitur in montosis & asperis. Bibitur in uino radix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua aduersus urinae difficultatem, & coxendicæ cum cruciatibus. Datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum, qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: cumque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

* Poly-
goni.
* Stru-
thio.

LIBER QVARTVS. 157
ANNOTATIO.

*Flores lutei. } Ne moneare sicubi for-
tè, vt nos plerisque locis, cādidis floribus
conspexeris: solent enim pro loci varietate
in vna eadēque herba flores non raro
cōmutari: id quod Dioscorides etiā in
Atractylide, ac multis alijs plantis fatetur.

Symphytum, siue alus. Cap. VIII.

Symphyton petreon, id est alus, nascitur in pe-
stris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus:
capitulis thymi: * surculosum totum, odoratū, * Ita Plī
gustū dulce, saluam ciens. longa radice, subrusa, nius Græ
digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsā et cūs ξυλῶ
potum pulmonis vitia purgat: sanguinem reūciens, id est
tribus, & renum malis, ex aqua datur: ad dysente- ligno-
riam, rubrāq; fœminarum profluvia, in uino deco- sum.
Etum: ad conuulsa uerò & rupta, ex aceto mulso
bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat,
faucibus asperis subuenit, uulnera recentia ente-
rocelasq; conglutinat, & illitu cohibet. Carnes au-
tem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & al-
terum symphyton, quod aliqui pecton uocant: id Nūc Cō
caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassū, solida
leuem, angulosum, ut sonchi inanem, circa quē bre maior.
ni interuacante spatia, folia exeunt angustā, bu-
glosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum
angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarū
sinu prodeuntibus, in quibus & flores lutei, & circ

DIOSCORIDIS

ca caulem velut verbasci semina emicant. Tā caulis, quā folia, aspera lanugine horrēt, tactuq; pruritum concitant radices demittuntur: foris nigrae, intus candidae, viscosae quarum est vsus. Tritae & potae cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt, recentia vulnera illitae conglutinant: carnes quoque, si concoquātur, cogūt additae: inflammationibus, praesertim sedis, cū senecionis folijs vtiliter illinuntur.

Holostium.

Cap. IX.

Holostium herba est pusilla, tribus quatuorue digitis supereminens extra terrā, folijs viticulisq; coronopo aut gramine proximis, gustu adstringentibus: radice alba, praetenui vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis. Vsus eius ad rupta, in vino potae: nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Stoebe.

Cap. X.

Stoebe vulgaris est notitiae: cuius semen & folia stringunt: quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum.

Cap. XI.

Clymenum caule fert fabae, quadratum: folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in iride, & polyporum cirrhis. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum ra-

LIBER QVARTVS. 158

dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: cœliacos, rubraq; fœminarum profluvia, refrigerando infrænât sanguinem naribus erumpentem suprimît. Trita folia, aut si-
liquæ recētibus uulneribus impositæ, ea ad cicatrē
cem perducunt.

Periclymentum. Cap. XII.

Periclymenon simplex fruticat, ex interuallis Vulgò
parua folia habens, ipsum amplectentia, sub. Capriso
andida, hederacea: inter folia surculi exeūt, in qui lium, &
bus bacca, hederæ similes. flos fabæ, candidus, ali- Matri=
quantum rotundis, & quasi in folium procubens: sylua.
semen durum, & quod difficilè euellatur: radice ro
tunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuol=
uens se adminiculis, propter asidentibus. Semen
eius postquam ematuruit collectum, & in umbra
siccatum, si drachmæ pōdere detur in uino, quadra
genis diebus, lienem absūmit, lassitudinē discutit:
sed urinam ciēt, statim à sexto die cruentā. Ortho
pnœæ, & singultui prodest: partum accelerat. Fo-
lia sunt eisdem uiribus prædita, quæ tricenis septe
nis diebus epota, sterilitatē facere produntur: perū=
ctis ex oleo, febrium algores abigunt.

Tribulus. Cap. XIII.

Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effi-
giem portulacæ, tenuioribus, uiticulis in terra
stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris:
iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum

DIOSCORIDIS

genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum
comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pedi-
culo longo: caule parte summa, quam ima crassio-
ri. Adsunt ei & capillamenta quaedam spicacea:
semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; re-
frigerantis & inspissantis est naturæ: idè inflam-
mationes omnes cataplasmate adiuvat. Ulcera in
ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasq;
persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum me-
dicinas, Semen dum recens bibitur, calculosis iuva-
mentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, il-
litæue, ictos à vipera recreat: contra venena cum
vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsam
pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem
habitant, virenti tribulo equos sagināt, et è dulci
semine & esculento panem, quo vescūtur, faciūt.

Limonium.

Cap. XIIII.

Limonion, folia habet betæ, tenuiora et longio-
ra, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectū,
lilio æqualem, seminibus rubris scatētem, quæ gu-
stata adstringunt. Semen tritum, & ex vino ace-
tabuli mēsurā potum, dysentericis coeliacisq; pro-
dest: rubra fœminarum profluvia sistit. Nascitur
in pratis & palustribus.

Lagopus.

Cap. XV.

Lagopus herba sistit aluum in vino pota: aut
in feбри, ex aqua Eadem inguini alligatur, in
inflammatione. Nascitur in segetibus.

MEdion in saxis & opacis nascitur. folia habet * iridis: caulem tricubitalem, & in eo * Alij se florem gradem, purpureum, rotundū: semine cnici, ridis. minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses fœminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum, menstrua pellit.

EPimedium, caulis est non magnus, hederae folijs, dens atq; duodenis, neq; florem, neq; fructū ferēs: radice tenui, nigra. graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increscere non sinunt. Radix conceptū adimit. Folia trita quinis drachmu, post menstruas purgationes, quinq; diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

XYphion, alij phasganon, alij macharonion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo nucronatum, nervosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna pusillorū bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, su

DIOSCORIDIS

perna vberior: nascitur in aruis. Superior cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeo è corpore extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. Menses imposita trahit. Superiore radice ex uino pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradūt. Superiorem quoque utiliter infantium enterocelis, cū aqua potui dare p̄cipiunt.

Sparganium. Cap. XI X.

Sparganion, aliqui xiphidion uocāt: folia habet gladioli, sed arctiora, et in terrā magis procumbentia: in summo caule ueluti pilulae prominent, in quibus semē. Contra serpentis uenena, radix cū uino datur. Xyris. Cap. XX.

XYris, folia habet iridis, latiora, & in cacumine mucronata: quorum medio caulis erūpit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquae triangulares dependent: in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis: simile fabis, rotundū, rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Cōtra capitis uulnera, fractaq; efficax est: aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radice centaurij ac mellis quinta: tumoribus & collectionibus illita cū aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

ANchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleia appellatur, folia habet lactucæ in acumē fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquouersum humi sparsa. spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ estate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore: læto sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est igni sacro cum polenta medetur: lepris & uiriliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, uulue indita. Eius decoctum renum vitæ leni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt alium folia in vino pota. Radice pigmentarij utuntur ad unguentorum spissamenta. Est et altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum uergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ menses sanguineum succum fundunt: in sabulosis nascitur. Vis ei folijsque inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime uiperarum, auxilietur, siue cibo, siue potu siue alligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est et alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota, latas uentris tineas excutit.

DIOSCORIDIS

Lycophis.

Cap. XXII.

Lycophis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactuce, longioribus, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore in ijs paruo purpurascēte: radice rubra, & adstringēte: nascitur in cāpestribus. Cū oleo radix illita, vulneribus medetur: et cū farina hordeacea, ignibus sacris. sudores perūcta mouet, adiecto oleo.

Echium.

Cap. XXIII.

Vulgo
lingua
hircina.

Echion, folia habet prælonga, aspera, aliquantulum tenuia, anchusæ proxima, minora tamē, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; utroq; latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo caule breuiora: flores secūdum folia purpureos, in quibus semina capiti uiperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat, in uino aut sobritione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrum. Cap. XXIIII.

✱ Melan
thij.

Ocimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, ut ✱ gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in uino potum, qua uiperarum ceterarūque serpentium moribus

fibris medeatur. Datur ischia dicis cum melle, vino,
myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & su-
peruacua.

Erinus.

Cap. XXV.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, fo-
lijs ocymi, sed minoribus, parte superna di-
uisis, dodrantalibus surculis quinis senisue,
flore candido: semine nigro, paruo & acerbo: folia
& caules lacteo succo turgent. Semen drachmis
duabus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculo-
rum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & ni-
tro instillatus, aurium dolores sedat.

* Sic
Plin. In
Græco
simplici-
ter, Suc-
co.

Gramen.

Cap. XXVI.

Gramen geniculatis serpit ramulis, à quibus
radices spargit dulces, articulis præcinctas:
folia acuminata, dura, et, vt arundinis parua, lata,
in exilitatem fastigiantur, eaq; iumenta et boves
pascunt. Frita radix illitu vulnera conglutinat.
Decoctum eius in potu, torminibus medetur, &
vrinae difficultatibus. calculosa etiã vesicæ excre-
menta cōminuit. Est & arundinaceum gramen,
priore multo maius, quod iumenta necare traditur
præsertim in Babylone, id, quod iuxta vias nasci-
tur. Quod in Parnaso mote gignitur, densius fruti-
cat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine
paruo, non inuti: radicibus quinis aut senis, digita-
li cr. situdine, candidis, mollibus, robustis, ac dulci-
bus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhe di-

X

DIOSCORIDIS

midio decoquatur, adiſcianturq; piperis & iſuris
tertiæ portionis, probatiſſimum erit oculorum me-
dicamentum: id in ærea pyxide reconditur. Deco-
ctum radicis idem, quod herba, præſtat. Semen ve-
hementius urinam impellit, aluum vomitionesq;
ſiſtit. Natū in Cilicia gramē, quod incolæ cinnā ap-
pellant, boues inflāmat, ſi eo virēti ſæpe paſcātur.

Sideritis. Cap. XXVII.

Nūc herba Iudai **S**ideritim aliqui heracleam vocant. folia habet
marrubij, ſed longiora, ſatis ad frondem quere-
ta, et Te cus aut ſaluie accedentia, minora tamen, & aſpe-
trabil. ra: caules edit quadratos, dodrantē altos, ac quan-
doq; etiam maiores, non iniucundi guſtus, aliquan-
tumq; ſubſtringentis: in quibus per interſtitia or-
biculata vertebrae, vt in marrubio, ſpectantur, &
ſemen in eis nigrum: naſcitur in petroſis. Illita fo-
lia, ſuapte vi, vulnera ſine inflammationis pericu-
lo iungūt. Altera ſideritis binum cubitorum, ramu-
lis exilibus: folio filicis, numeroſo, vtrinq; per oras
diuiſo: pediculo longo, prodeuntibus ē ſummo alae-
rum ſinu ſurculis, longis, tenuibus: capitulo in ca-
cumine orbiculato, aſpero, in quo ſemē continetur,
quā betæ rotundius, aliquantū, ac durius. Huius
vis, foliorumq; ad vulnera, præcipua eſt. Sideritim
aliam eſſe tradunt, quam Crateas heracleam vo-
cat, in macerij, & vineis naſcentē, folijs ab vna
ra lice multis, coriandro ſimilibus, circa cauliculos
dodrātales, teneros, leues, ſubcādidōs atq; ſubrubi

cundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & le-
to. Huius ea vis est, vt quauis recenti vulnere im-
posita, sanguinem supprimat.

Achillea. Cap. XXVIII.

Achillea, quibusdam Achillea sidentis, dodra-
tales aut maiores gerit scapos, fusorum effi-
gie, minutulis folijs circundatos, ex obliquo crebras
habentibus incisuras, sectionibus coriandro similis-
bus, subfuluo colore lentis, odore multo, non insua-
ni, verum medicato: umbella in cacumine rotunda,
floribus candidis & purpureis & aurum emu-
lantibus: provenit leto solo. Trita coma sanguino-
lenta glutinat, & ab inflammationum periculo tue-
tur: erumpentem sanguinem inhibet, et cruenta vul-
ue profluvia, i. vellere. Decocto quoq; insidet scemi-
ne fluxione vulue laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Rubus. Cap. XXIX

Rubus, notitie vulgaris. Viri habet siccu-
di, & adstringendi: capillum tangit. Ra-
morum decoctum, potu aluum sistit, &
feminarum profluvia, presteris morsui accommo-
datissimum. Gingiuas firman, & oris vitijs for-
lia commanducata medentur, cohibentq; illita, vlce-
ra que serpunt. Vlceribus in capite manantibus,
oculisq; procidentibus remedio sunt, & condyloma-
tis et hemorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis,
& stomachi doloribus, trita conuenienter imponu-
tur. Caules cum folijs tumbuntur, exprimiturque

DIOSCORIDIS

succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascētis, quàm optinè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur aluus præmaturi cibo, nec non flore in vino poto.

Rubus idæus. Cap. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. Cap. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus complectitur quodcunq; contigerit adminiculum. Nasceitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorū succus potu deijcit aluum.

Elatine. Cap. XXXII.

Elatine folia habet helxinæ, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis senisue, à radice foliosis, gustu adstringētibus. Nasceitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta soritionis usu dysenteriam sistit.

Eupatorium. Cap. XXXIII. Est Offi

Eupatorium, fruticosa herba est, vnicum effe- cinarum
rens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, Agrimo-
tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum amplio-
ria. earū
rem: folijs per intervalla quinqufolij, aut canna- autē En-
bis potius similibus, quinq; partito aut amplius di-
patoriū
uisis, nigricantibus, & ipsis per ambitū serratis. se-
forte cā
mē medio caule erūpit, pilosum, deorsum spectans, nabis syl-
quod siccatum vestibus inheret. Contrita huius fo-
uestris,
lia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus, quæ æ-
de qua
græ cicatricem trahunt, medentur. Herba & semē præcedē-
in uino potum, dysenteria, iocineris uitijs, & serpē-
ti libro-
tium icribus, liberat. Nec desunt qui aberrantes * * Græ-
argemonem hanc appellarint, cū tamen longē cus Arte
alia sit, uti exposuimus.

Quinquefolium. Cap. XXXIIII. hēt: sed

Quinquefolium ramulos fert festucarum simi esse, vt
litudine, tenues, dodr. itales, in quibus semē. nunc vi-
folia menthæ, quina singulis pediculis, raro plura, des, argē
in ambitu serrata: florem ex cādido pallescentē, au monē le-
ri æmulū. Nascitur in riguis, et aquarijs ductibus. gēdū, ex
Subrubram habet radicē, oblongam, ueratro nigro anemōe
crassiorē. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis deco- (de qua
etæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolo-
li. ij.) nō
res sedat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arte-
obscure
riæ scabritias, gargarizatu leuigat: contra alui cognō
profluvia, & dysenterias auxiliatur: item articu-
scas.
lorum coxendicumq; cruciatibus pota. Cocta in

X ij

DIOSCORIDIS

aceto, & illita, serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit: ignes sacros, reduuias, condylomata, psorasq; sanat. Teneræ radicis succus, contra iocineris, pulmonumq; vitia prodest: item aduersum uenena. Cum hydromelite autem, uel diluto uino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana uero, ternum. in quotidiana, unius. Ea quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus prosunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cum melle et sale, tam uulneribus quam fistulis remedio sunt. enterocelicis auxiliū præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

A N N O T A T I O.

*Spicam lolio similem } Non obscure hinc elicitur Lolium spica esse insignitum. ac proinde explodendam eorum sententiam, qui Nigellam uulgò cognominatam, cuius in segetibus ubique tam uber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidē nō spicam, sed purpureum florem emittit.

Phœnix.

Cap. XXXV.

Phœnix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, * spicam lolio similem: calamos digitorum seuum, radici aduolutos: septenas octos.

nasci spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Harum virium compos, ut in uino austero posita, alui profluvium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinae impetus infrenet. Sunt qui adaligatam in puniceo uellere & suspensam, sanguine suppressere prodant.

Idæa radix. Cap. XXXVII.

Idæa radici folia sunt ea, quæ rusco: circum ea ueluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rodia radix. Cap. XXXVIII.

Ignitur Rhodia radix in Macedonia, costis similis, lenior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momēto imponatur.

Equisetum. Cap. XXXIX.

Equisetum in rignis & scrobibus nascitur: cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se fæcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. Vis herbe spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipsa sistit: prodest dysentericis in uino potus: urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tri-

Vulgò
Cauda
equina.

DIOSCORIDIS

tis folijs, & illitis. Radix cum sua herba tuſſim
orthopnoeam, ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua po-
tis, diſſectiones veſicæ & inteſtinoris, enterocelaq;
in vnum coaleſcere, cogiq; feruntur. Alterum equi-
ſetum caulis eſt rectus, equalis, cubito maior, inas-
nis: comis per interualla breuioribus, cãdidiſſimis,
& mollioribus. Ad cum aceto tritum vulneribus re-
medio eſt, eademq; fungitur facultate.

Coccum infectorium. Cap. XXXIX.

Coccum, quo infectores vtuntur, frutex eſt ſur-
culofus, paruus cui grana ceu lentes adherēt,
que electa congeruntur. Optimum gignitur in Ga-
latia, & Armenia, deinde Aſia, & Cilicia: vltimũ
ex omnibus Hiſpanicum. Viſ huic ſpiſſandi: vulne-
ribus, neruisq; præciſis, conuenienter ex aceto tritũ
illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, è quercubus,
cochlearum exilium ſimilitudine, quod illius regio-
nis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium. Cap. XL.

Tragium nascitur in Creta tantũ inſula,
lentifeo ſemine, folio, & ramis ſimile, ſingu-
lis tamen minoribus, * ſuccus ei lacteus, gummi
non diſſimilis. Semen, folia, lacrymaq; illius ſpic-
cula è corpore eijciunt: omnia quoque corpori im-
pacta, euocant: pota ſtrangurie medentur, calcus
los veſicæ frangunt, menſes trahũt. Modus in ſum-
ptione eſt, drachma vna. Fama eſt, ſylueſtres ca-
pras ſagittis confoſſas, eius herbe pabulo ſpicula.

* Ita
Pli. Græ
cus co-
dex ſim-
pliciter,
ſuccus.

excitare. Est & alterum tragium, quod tragoceros aliqui vocant, folia scolopendrij habet, & radicem syluestris raphani, tenuem, candidam: quã crudam vel coctam esse dysentericis prodest. Folia Nominis autumno, hirci virus olent: exinde sibi tragij nomẽ causa, adoptauit. Prouenit in montibus, & precipitijs.

Tragum.

Cap. XLI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion aut traganon vocant: maximè in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex vino poti, coeliacis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à p̄risque, & in pastillos digesti asseruantur, quibus vtuntur cùm opus est.

Iuncus.

Cap. XLII.

Iunci duo genera: vnum læuis nominati, altiorum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera: vnum sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iuncus, qui vocatur oloschœnos, prioribus carnosior, asperi r̄q;, is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriusque tostum, ex diuino vino potum, sistit aluum, & rubra fœminarum profluvia: urinam cit, capitisque dolores facit.

DIOSCORIDIS

Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus illicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

Cap. XLIII.

Offici-
nis He-
patica.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adhæret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus; oris & linguae defluxiones inhibet.

Paronychia. Cap. XLIIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, pappo similis, minor longitudine, maioribus folijs, illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome. Cap. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat. coma specie corymborum, hyssopo simili: radice hirsuta, ueratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosis opacisq; nascitur. Radix excalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammato male habet: contra purgationes uulvæ, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum. Cap. XLVI.

Chrysogonum dense fruticat, quernis folijs: flore coronarij uerbasci: radix ut rapum exuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ tri-

ta cū aceto, atque impoſita, muris aranei morſibus auxiliatur.

Elichryſum. Cap. XLVII. Alij He=

ELichryſon quidam chryſanthemon, nonnulli lichryſon. Offi-
 & id amaranton uocant, quo deorum ſimula-
 cra coronant: ramulum habet candidum, virentē, cinis
 rectū, firmū: folia intercedentibus ſpatiis anguſta, Stæchas
 abrotono ſimilia: comam aureæ licis in orbem, um-
 bella rotunda ueluti ſiccis corymbis dependentibus,
 radice tenui: naſcitur in aſperis, & torrentium al-
 ueis. Contra ſerpentium iētus, coxendicum dolores,
 urinae ſtillicidia, ruptaq; coma ē uino pota opitu-
 latur: ciet menſes. Sanguinem concretum uentris
 ac ueſicæ abſumit, pota cum mulſo. ieiunis, trium
 obolorum pondere, ſiſtit deſtillationes, data in ui-
 no albo diluto: ueſtibis inſeritur, ut eas ab eroden-
 tium iniurijs tueatur.

Chryſanthemum. Cap. XLVIII.

CHryſanthemō aut caltha, nonnullis buphthal-
 mos: herba eſt tenera, fruticoſa, leues proferēs
 caules, et multifida folia: flores ſupra modū ſplēde-
 tes, luteos, orbē oculi imitātes, unde buphthalmi no-
 mē traxit: propter oppida naſcitur. Cuius caules o-
 leris uice mādūtur. Flores cū cerato triti, ſteatoma-
 ta diſcutere prodūtur: regio morbo correptis, colorē
 breni reddūt, ſi ſequēte lōgo balnei uſu, poſt exitū
 ebibātur. Ageratū. Cap. XLIX.

ACeraton fruticoſa herba eſt, palmam longi-

DIOSCORIDIS

tudine aſurgens, ſimplex, humilis, origano maxi-
mè ſimilis: umbellā gerit, in qua flos bullis aureis
emicat, elichryſo minor. Nomen ei inditum eſt, quo-
niā diutiſſimè flos in ſua coloris ſpecie cōſeruetur.
Viſ decocti feruens: huius uſtæ nidor urinam cit, et
vulue duritias emollit.

Verbenaca.

Cap. L.

Periſterion, ſiue verbenaca naſcitur in aquoſis.
Nomen ex eo duxiſſe videtur, quòd columba
circa hanc perquā libenter verſari ſoleant. Do-
drantis altitudine, & inter dum amplius adoleſcit:
folia è caule prodeunt incifa, & ſubalbida: ea ſin-
gulari ramo, radiceq; ſola, conſtare ſepius inueni-
tur. Folia cum ſuillo adipe recenti, aut roſaceo impo-
ſita, vuluarum dolores finire putantur, ignem ſa-
crum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohi-
bent, vulneca glutinant: veteraq; ex melle, ad cicat-
ricem perducunt.

Sacra herba.

Cap. LI.

Sacra herba, quæ & periſtereō nominatur, rac-
mulos emittit cubitales, aut maiuſculos, angulo-
ſos, in quibus ex intervallis folia quercus, ſed mino-
ra anguſtioraq; eiſdem diuiſuris in ambitu, colore
aliquatenus caſſio: radix lōga, tenuis: flores purpu-
rei, graciles. Folia cū radice in vino pota, illitæ, ad-
uerſus ſerpēte: pollent: eadē drachmæ pondere cum
thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadra-
genis diebus, ieiuno ore, contra regiū morbū bibun-

LIBER QVARTVS. 167

tur: veteres tumores & inflamationes mitigant: sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tōs sillarum crustas abrumpit: oris nomas gargariza tu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur tricliniū, quā maderit, latiores conuictus fieri. Datur potandū in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum folijs circulantibus, quartanis, quartum. Sacram vocant herbam, quoniā multum ad amuletā, expiationesq; commendetur.

Astragalus.

Cap. LII.

Astragalus, paruus à terra frutex, folijs & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringētes nascitur in vêtosis, opacis, et in nivalibus. eo Mēphis Arcadiæ scatet. Aluū sistit radix in vino pota: vrinā mouet: vetustis vlceribus, sicca efficaciter īspargitur: sanguinem supprimit: ægre propter duritiam tunditur.

Hyacinthus.

Cap. LIII.

HYACINTHUS folia habet bulbi: doctracalē canlē, leuē, minimo digito tenuiorē, herbacei coloris: comā procūbentē, florum purpureorū plenā, incuruā: radicē quoq; bulbaceā. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatē coerces, et nō patitur erūpere: sistit aluum pota, et vrinā ipellit, phalangiorūq; morsibus auxiliatur. Semē adstrin-

DIO SCORIDIS

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum
emendat cum vino potum.

*Locu

Papauer erraticum. Cap. LIIII.

deprava
tum esse
manifeste
apparet.
Sunt enim
herbe
quas hic
comemo
rat Dio-
scorides,
diversa
plane fa-
cie, ut uni
eideq; re-
cte compa-
rari ne-
quaqua
possint:

Papauer erraticum, quod rhœada vocant,
vere quidem in arvis cum hordeo nascitur
flore protinus deciduo, unde et nomē apud
Græcos accepit. * Folia eruce, aut origano, aut ci-
chorio, aut thymo similia spectantur: sed longiora,
diuisa, scabra: iuncus ei caulis, rectus, cubitalis,
asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum
albus: oblongum caput, sed quā anemones minus:
semen rufum. radix longa, subalbida, minoris digi-
ti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq;
aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta
potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semi-
na acetabuli mensura ex aqua mulsa pota, aluum
leniter emolliunt: ad idem præstādum mellētis pla-
centulis, & dulciarijs cibis admiscuntur. Folia cum
calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem
fotu & perfusione, somnus allicitur.

Papauer satium. Cap. LV.

quo autē
instaurā-
tus, peri-
tioribus
cogitādū
relinqui-
mus.

ESatiui papaveris genere, quod hortense est, se-
men in panem densatur, qui sanis in usu sit:
eo etiam ex melle pro sesama vtuntur: thylacitio
vocant. Capitulum habet longum, & semen can-
didum. Sylvestre vero, caput insidens demissumq;
& nigrum semen, quod pithitis nominatur: non
nullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius

LIBER QVARTVS. 168

scapolacleus succus emanat. Tertium magis syl-
 uestre, & ad medicinas volentius, multò his lon-
 gius, productiore capitulo. Omnium in commune
 natura refrigeratrix: quare si capita ipsa & folia
 decoquantur in aqua, somnum soti conciliabunt.
 Bibitur deccetum contra vigilias. Calyces cum po-
 lenta triti, & cataplasmati admisti, ignibus sac-
 cris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur
 quoq; virides, & digeruntur in pastillos, qui sicca-
 ti ad vsum reconduntur. Capita quoq; per se in
 aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto mel-
 le, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Ad me-
 dicamentum in tussi, arterie fluxionibus, & cœ-
 liacorum affectis, doloris leuamentum præbet. Effi-
 caciùs tamen redditur, addito hypocistidis succo et
 acacia. Papaueris nigri semen tritum cum vino bi-
 bitur, contra citam aluum, & scemmarum proflu-
 uia: in pernigijs fronti temporibusq; illinitur, ex
 aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, sic-
 catq;: sumptum erui magnitudine, dolorem finit,
 concoquit, & somnum allicit: tussi, atq; cœliacori
 valetudini auxiliatur: verum si copiosius hauria-
 tur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad
 dolores capitis cum rosaceo persusum efficax est:
 aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco
 instillatur: inflammationibus oculorum cum torre-
 facto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,
 cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-

DIOSCORIDIS

Opium eo: somnum accersit, subditū sedi pro balano. Opti-
 quod op= mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 timum. odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, le-
 ue, candidū, neq; asperum, neq; grumosum, quod
 inter colandum non vt cera coeat, et in sole diffun-
 datur: dein admotum lucernis, non atra luceat flā-
 ma: extinctū deniq; odoris vim conseruet. Sed opio
 glaucio, gummi, aut sylvestris lactuce succo, adul-
 Eius a= terant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci
 altera= colorem reddit: lactucaceo succo fictū, oxiliter spi-
 tio. rat, & asperis spectatur: gummi vitiatum, splen-
 descit, & infirmum est. Nec desunt, qui eò demen-
 tie deuenerint, vt adipem ei admiscerent. Fictili
 nouo torretur ad oculorum medicamēta, dum mol-
 lius, atq; rufius appareat. Diagoras, vt Erasistra-
 tus auctor est, vsum eius damnauit, oculorum lip-
 pitudinibus & aurium vitijs infundi vetās, quo-
 niam visus aciem hebetaret, & soporem gigne-
 ret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excecari, si
 non adulteraretur. Mnesidemus vsum duntaxat
 olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum
 somnum conueniret, alioqui nobis vt noxio interdi-
 cit. Quæ commentitia esse, experimento deprehen-
 duntur: siquidem effectus, viriū huiusce medica-
 menti, fidem faciunt, quare non alienum fuerit
 scriptis mandare, quonam modo is excipiat suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, et præ-
 lo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt

LIBER QVARTVS. 169

in pastillos: id meconium vocatur, multū opio igna-
uius. Porro opij faciendi ratio hæc est: Cum ros in Opij col-
eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus ligendi
adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem in ratio.
cidere oportet, lacrymam exeuntem, digito in con-
cham abstergere. nec multo post redire, vt cōcreta
inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam
offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos
cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne
vestibus succus deradatur.

Corniculatum papauer.

Cap. LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatim, fo-
lia habet candida, hirsuta. verbasco simi-
lia, in ambitu syluestris papaueris more papauer
Vulgò
ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo cornutū.
fœnigræci, in corniculorū modū inflexo, vnde nomē
mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq;: radice
per summa cespitum nigra, crassa: nascitur in ma-
ritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in aqua
decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affe-
ctus, potu sanet: prodest his, qui crassa quædā, aspe-
ra, aut araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter
purgat semen, acetabulo in aqua mulsæ poto. Crus-
tas emarginat, illita ex oleo folia floresq; & ar-
gema ac nubeculas iumentorum perunctas, abster-
gunt. Sunt qui glauciū, hoc papaueris genere facti
tari existimarūt, falsi quadā soliorū cognatione.

Y

DIOSCORIDIS

Spumeum papauer. Cap. LVIII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule dodrantali: folijs admodum par-
 * Stru- uis, * radicle similibus: fructis inter ea candido.
 thio. Nam herbula alba est, & spumea tota: * radice
 * Sic ex in summo cespite. Legitur estate semen, cum inte-
 Theo = gre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabu-
 phrasto. li mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat pri-
 Videtur uatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.
 eni locus

Hypecoum. Cap. LVIII.

Hypecoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur
 in segetibus aruisq;, folijs rutæ, exilibus ra-
 dis codi- mis. Natura eadem, quæ papaueris succo.
 ce corru

Apollinaris, siue hyoscyamus. Cap. LIX.

Hyoscyamus, frutex est caules emittens cras-
 sos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsu-
 ta: flores e latere caulis, ordine prodeunt, tanquam
 puniceorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut
 papaueris. Tres eius differentia: Vna semine nigro,
 floribus penè purpureis, smilacis folijs, cytinus præ-
 duris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut
 irionis, flores lutei: folia, & siliquæ simpliciores.
 Ambo insaniam gignunt & soporem, ideo in com-
 muni usu damnantur. Tertium genus, ut quod mi-
 tißimum esset, medici recepere: pingue, lanugino-
 sum, molle, candidi floris seminisq;, in maritimis
 ruderibusq; nascens. Cuius occasio si non adsit, ru-
 fum usurpari oportet: niger, ut deterimus, im-

LIBER QVARTVS. 170

probat. Recēti semine, caulibus folijsq; tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus ad annum usque prorogatur. nam facile corruptio nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine sepatim in aqua calida tuso, & expresso. Liguamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liguamentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyrijs, quæ doloris sensum auferunt, commodissimè inseri solent: contra acutas calidasq; fluxiones, dolores aurium, atque vuluæ mæla, profunt: cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, cæterarumq; partium inflammationes placant. Semen eadem præbet: tussi, distillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax: contra mensium abundantiam, & rumpentem aliu de sanguinem, oboli pendere cum papaueris semine, & aqua mulsa, bibitur: podagris subuenit: testibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tritum ex vino illinitur. Alijs quoque cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, vtilissimè imponuntur: recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur: cum vino terna, quaternæue pota, sanant algidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mer-

DIOSCORDIS

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt,
si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in ace-
to decocta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium.

Cap. LX.

Psyllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsu-
tis, longioribus: sarmentosa sceni modo, in totius
herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule
exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine
capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili:
vnde & nomen. in arvis & incultis nascitur. Vis
ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum
conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuber-
culis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponi-
tur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto:
enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illi-
tum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura,
& in aque sextario madefactum, ubi concreuit
aqua, illinitur: si quidem vehementer refrigerat, &
in feruentem aquam deiectum calorem reprimat.
Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si vires
domum importetur, non sinere in ea pulices gigni.
Cum adipe tusum, sordida ulcera, & quæ cacoe-
the vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auris
bus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum.

Cap. LXI.

Hodie so-
latrum **H**ortense solanum, frutex cibus idoneus, pusil-
lus, multis concavis alis: folio nigro, maiore
corrupte quam ocymi, & iatiore: fructu rotundo, viridi, qu-

post maturitatem nigricat, aut fuluescit: herba in-
nocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare fo-
lia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conue-
nienter cum polline polentæ illinuntur: ægylopia, ca-
pitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æ-
stoanti stomacho auxiliantur: parotidas, cum sale
detrita, illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus
ignem sacrum, atque vlcera, quæ serpunt, cum ce-
russa, rosaceo & argenti spuma: ad ægylopos cum
pane. infantium adustioni, quam syriasin vocant,
cum rosaceo persusus proficit: in collyrijs, aquæ vel
oui vicem exhibet contra acutas fluxiones illitus:
aurium dolori instillatus prodest. Mensium abun-
dantiā sistit, in vellere subditus. Succus fuluo gal-
linarum curtalium fimo subactus, & linteo appo-
situs, ægylopijs præsentaneo est remedio. Est & a-
liud solanum, quod peculiari nomine halicacabon
aut physalida, id est vesicariam vocant, solijs an-
tedictis similibus, verum latioribus: cuius caules,
posteaquam adoluerunt, prona terram spectant:
folliculis orbiculatis vesiculis similibus: semine in-
tus fulue, rotundo, leui, acinorum vix effigie: quo
coronarj utuntur, corollis intorquentes. Vini usum-
que hortensis solani habet: verum cibus nequa-
quam expetitur. Regium morbum purgat, semine
poto, & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus
extrahitur, qui siccatus in vmbra, reconditur, ad
eamdem valens.

Offici-
nis Al-
kekengi
Arabū
exēplo.

DIOSCORIDIS
Solanum somniferum. Cap. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam halicacabon appellat, fruticat multis ramis, densis, candidis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, costonea q; mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ pondere positus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropticis dantur: si quid numero adiiciatur, alienatione mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis, quæ doloris leuamentum præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Manicum solanum. Cap. LXIII.

Solanum manicum, aliqui persion, alij thryon appellant. Huic folium erucæ simile, maius aliquantò, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolentes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verum maius, latius q;: florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hedere corymbis, vt vna mollibus: radice firmatur candida

LIBER QVARTVS. 172

didā, crassa, caua, cubitali: gignitur in montibus,
veto perflatus, et platanetis. Radix drachmæ vnius
pondere pota ex vino, facit species vanas, imagi-
nesq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic
modus, ad tres usque dies mentis alienationem as-
fert. quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua
mulsā copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium Cap. LXIII.

Dorycniō Gratenas halicacabon, aut caleam
vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: na-
scitur in petris, nō procul à mari, ramis cubito mi-
noribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, fir-
mioribus, præter modū scabris: flore candido: sili-
quis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quin-
intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudi-
ne, lauibus, firmis, versicoloribus: radix ad digiti
crassitudinē et cubiti lōgitudinē adolescit. Ad som-
niferū esse cōstat. Copiosius haustū mortē adfert,
Nec defuere, qui dicerent, semē in amatoria expeti.

Mandragoras. Cap. LXV.

Mandragoram, aliqui antimalum, alij cir-
cæam vocant. quoniam videatur radix ad
amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ
fœmina existimatur, thridacis appellatus, an-
gustioribus folijs, ac minoribus quàm lactucæ, vi-
rosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala ge-
rit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus se-
men veluti pyrorum: radicibus inhæret bene ma-

DIOSCORIDIS

gnis, binis, ternisue, inter se cōuolutis, nigris foris,
intus albis, crasso cortice vestitis, caule viduus est.

* Alij Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis & norion
morion. vocitatus: huius folia magna, alba, leta, leuia vt
betæ: mala quàm alterius duplo maiora, colore in
crocum inclinante, incūde cum grauitate quadam
olentia: quorum pomorum cibo, aliquantum opilio
nes soporantur. radix, alterius similis, maior &
candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è corti-
ce recentis radicis tuso, & prælis subiecto: qui in-
solatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis
quoq; succus depromitur, sed aliquantò ignauior.
Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad
vsum suspēditur. Aliqui radices in vino ad tertias
coquunt, & defecatum ius seruant: cyathosq; vno
vtuntur, in peruiligijs, & doloribus, et ante sectio-
nes vsteonesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis
ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilē
atram pituitamq; extrahit: verum potu largiore,
vita adinitur. medicamentis ocularibus, & his,
quæ dolores finiunt, pessis quoq; emollientibus, ad-
miscetur: semioboli pondere inditus, per se menses
& partus expellit: subditus sedi pro balano, som-
nificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis
horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quā
effingere optaueris, formā, ipsum facile præstat.
Folia recentia: conuenienter oculorum inflāmatio-
nibus, et collectionibus, quas vlcera citarunt, cum

LIBER QVARTVS. 173

polenta illinuntur. duritias omneis, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delēt, si quinis senisue diebus, sensim perfricentur. Folia seruantur in murijs, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpē tium ictibus ex melle aut oleo, medetur: strumas atq; tubercula, cum aqua dissipat. articulorū cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum è cortice radice, ad hunc modum: Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi ijs, qui secari aut amburi debēt, vt antè dictum est: si quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterno quodam pressi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus: nimia tamen odore percussi, obmutescunt. Semen malorum potum vuluas purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra scæminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lacryma, cauo vase recipitur. Liguamentum autem succo lacteo præstantius est: sed non ubiq; vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniōne,

DIOSCORIDIS

drachmæ pondere deuorata, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternisue, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cum scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum. Cap. LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cāmoro, alij thelyphonon, alij myoetnon, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut cucumeris. Ita Plin^{ius}, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: caulis, ut in Gre^{cis} palmis, altum: radix scorpionis caudam æmulatur, & alabastris modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones ad mota radice, stupentq;: qui rursum hellebori contactu excitantur. Oculorum medicamentis lenandi doloris gratia adijcitur. Enecat subaspe pantheras, sues, lupos & feras omnes in carnibus. utra obiectum. Est & alterum aconitum, quod aliqui cyantem le= noctonon, alij lycoetnon appellant. Huius generatio po= sunt tria. vnu, quo vtuntur uenatores: alia duo interior, her usum suum uertere medici, è quibus tertium, quod bæ, si Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus In quādo se stinis exilit: à priore distās, quoniā folia faciat effi se obtu= gie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo lerit a= nigriora: caulem filicis pediculo similem, nudum, cui spectus bitali altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis ilicabit. oblongis recondit: radices in modū squille maris cirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem lus

LIBER QVARTVS. 174

porum utuntur: insertæ siquidem crudis carnibus,
& deuoratae, lupos enecant.

Cicuta.

Cap. LXVII.

Cicuta caulem edit geniculatum, ut fœni-
culi, grādē & folia ferulae, angustiora, * Pli.li.
grauī odoratu: rami, mox umbellæ i sum 25.c.13
mo prodeunt: flores quoque albicantes: & semen Corian-
aniso candidius: radice non alta, concava. Cicuta le dro aspi-
thale uenenum inest, suaq; ui refrigeratoria necat. milauit,
Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimi- cui pro-
tur contusis cacuminibus, triusquam semina & pius sa-
come siccescant: qui solē densatur in pastillos. ne, quā
Multus ad medendi rationem usus est aridi, commo ferulae,
dē miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia quæ fœ-
temperantur: ignes sacros, & ulcera quæ serpunt, niculi cō
illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testi- stat fo-
bus circumlita, libidinum imaginationes in somno, lijs, Ci-
compescit: sed genitale resoluit. lac puerperarum cuta om-
mammis apposita extinguit: in uirginitate mam- nibus ho-
mas coercet, & increescere non patitur: pueris præ die com-
stat, ut eorum testiculi cibum non sentientes, inta- perta, ui-
bescant. Efficacissima uis Cretica, Megarēsi, mox detur ac
Attica, & in Chio & Cilicia nascenti. cedere.

Taxum.

Cap. LXVIII.

SMilax à Grecis, taxus à Latinis appellatur,
arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-
dem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispa-
niæ contermina nascentis. Auicula quæ Italica ta-

D I O S C O R I D I S

æi baccas deuorāt, denigrātur: et qui ederint easdē
hōies, alui proflumio corripitūtur. Narbōe tā præsē
tis est, venēi, vt si qui dormiāt sub e.i, aut eius vm
bra subsideāt, lædātur, et sæpenumero moriātur:
quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.

Apocynum. Cap. LXIX.

A Pocynum, siue cynocrambe, brassica canina,
frutex est longis viticulis constans, malē
olentibus, lentis, vitiliūq; modo obsequiosis, fra
ctu fere inuictis: folio hedere, molliore tamen, &
per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo
succo turgēt. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari spe
cie, dit igitur longitudine protenduntur: semine intus
albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta,
canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo
data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

Cap. LXX.

N Erion aliqui rhododaphnen, alij rhododen
dron vocant. frutex est vulgaris notitiæ, lon
gioribus quā amygdala folijs, crassioribusq; flo
re in rosam conformato: fructu & nuci græcæ simi
li, corniculato, qui patefactus quandam lanosam
naturam ostendit, spinarum pappos repræsentans
tem, radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa:
nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes.
Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadru
pedum plurimis venena sunt: hominibus verò cō=

✶ Amygdale.

tra serpētium morsus praesidia, è vino pota: eo magis ruta addita: imbecillæ etiam animantes, vt pecus & capræ, si aquam bibant, in qua folia ea maderint, moriuntur.

Fungi.

Cap. LXXI.

Fungorum differentias duplex: aut enim manduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arborësue, quæ priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent quidam tales sunt, nescio quod strigmentum concretamque pituitam, terraque eruti, quam celerrime computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti. Strangulant, aut choleram morbum citant. Remedium est nitri potus, aut lixiuium cum acida muria, aut feruesfacta satireia, aut origani iusculum: debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægrè dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

Colchicum.

Cap. LXXII.

Cēsetur

Colchico, aliqui ephemerō, sunt qui agrestem Hermodactylū vocant, aut tūni exitu florem edit croci, dactylus candicans, ab eo tempore, folia bulbi, sed pinguiora: lilius ossifragus caule palmo altum, ferens rufum semen: radicē cinarā.

DIOSCORIDIS

foris è nigra rufescentem, quæ deliberata, candida:
& mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gu-
statu dulcis inuenitur: bulbus eius mediam habet
rimam, fissuramq; qua flos erumpit: plurimum in
Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungo-
rum more, strangulando enecat. Hanc autem de-
pinximus, ne à quoquã imprudenter pro bulbo de-
uoretur: mirum enim in modum saporis volupta-
te imperitos allicit. Remedio sunt eadem, quæ fun-
gis: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaque
cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum. Cap. LXXIII.

Fortè no-
stru Li-
liu con-
ualliu.
Ephemerum, aliqui syluestrem irin appellant. fo-
lia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: flo-
rem candidum, amarum. semen molle radicem vnã,
digitali crassitudine, longam, adstringentem, odo-
ratam: nascitur in syluis & opacis. Huius radix
dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in
vino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ
nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est muralis herba. Ca. LXXIII.

Offici-
nis Pa-
rietaria
Helxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis
& segetibus: folia ei mercurialis insunt, hir-
suta: cauliculi subrubentes; & circa eos veluti se-
mina aspera, adherentia vestibus. Folia refrigerã-
di spissandiq; naturam habet, qua ex causa sanant
illius sacros ignes, adusta, condylomata, panos in-
cipientes, tumores, inflammationesq;. Succus eius

LIBER QVARTVS. 176

cum cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ ser-
punt, commodè illinitur, imponiturq; podagris cum
hircino adipe aut cerato cyprino: veterem tussim
emēdat instar cyathi haustus: tōsillis inflāmati-
onem sentientibus vtiliter & gargarizatur, et obli-
nitur: aurium dolorē cum rosaceo instillatus leuat.

Alfine.

Cap. LXXV.

Alsinen, aliqui anthyllion, nonnulli myosota Vulgo
vocat, quoniam masculorum aures folia morsus
imitantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alsine dicta gallinæ.
est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi humilior es-
set, & folijs minoribus, *nec hirsuta. cū teri- *Fx Pli
tur odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi ad nio adie
stringendiq; obtinet: oculorum inflammationibus Eta.
cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus in-
funditur: quin & emendat omnia quæ helxine, id
est, muralis herba.

Lens palustris.

Cap. LXXVI.

Lens palustris, inuenitur in aqua non fluente, Offici-
musculus lenticule similis, refrigeratoriæ natu- nis lenti
re. Propter quod conuenienter collectionibus, igni cula aq.
sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta:
glutinat & procidentia puerorum interanea.

Semperuium, seu sedum.

Cap. LXXVII.

Semperuium magnum idèò nominatur, quo-
niam perpetuò folia vireant: cuius caules cu-
biti altitudinem implent, interdum excedunt, pin-

DIOSCORIDIS

gues, crassitudine pollicari, virentes, characia tithy
 * Vox mali modo infecti folia pingua, * carnosae, & ma
 addita gnitudine pollicari, in cacumine linguae similia, alia
 ex Plinio in terram convexa, alia in capite stantia invicem,
 ita ut ambitu effigiem imitentur oculi: nascitur in
 montibus, & testaceis: supra domicilia etiam serit
 tur. Eius vis refrigerare, & adstringere: medentur
 igni sacro, nomis, ulceribus quae serpunt, oculorum
 inflammationibus, ambustis igni, podagris per se,
 & cum polenta illita folia. Succus capiti, in dolori
 bus, cum polenta aut rosaceo perfunditur: datur in
 potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, alui
 que profluvia: teretes tineas potus in vino excutit:
 subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit:
 succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio co
 ceptis, inungitur. Semperuium paruum in petris,
 parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis na
 scitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, cre
 bro foliatis. exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mu
 cronatis: caule à medio emicante, palmum alto: um
 bellam herbidosq; flores, & tenues gerente. Folia
 eisdem cum priore viribus praedita sunt. Tertium
 videtur semperuii genus, quam aliqui andrachne
 agriam, aut telephion vocauerunt, Romani illece
 bram, pusillis, crassioribusq; folijs, hirsutis, por
 tulacae proximus: nascitur in saxis. Vis ei exalfas
 etoria, acris, exulcerans: illita cum axungia stru
 mas discutit.

Vulgo
 vermicu
 laris.

Vmbilicus

LIBER QVARTVS. 177
Vmbilicus Veneris. Cap. LXXVIII.

COtyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formã tornato, ineuidenter cōcauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotūda. Succus cum vino circulitus, instillatū siue, contacta genitalia nudat: inflāmatio nibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calculos frāgunt, vrinam cient, hydropicus ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria. Est & alterū genus eiusdem, cymbalium aliqui vocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis circa radicē, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadē, quæ semperuiuum.

Vrtica.

Cap. LXXIX.

DVo vrticæ genera: syluestris, asperio, latioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini, sed minore. Altera non æquē aspera, minuto semine. Folia vtriusq; illita, canis morsibus, addito sale, medentur: gangrenas, carcinomata, sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cū cerato imponuntur: faciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & imposita: precipiendū.

Z

DIOSCORIDIS

tes vulvas, recentia contactu resilire cogunt. Semē
potum ex passo, venerem stimulat, vulvæ ora pate
facit: cum melle delinctum, orthopnoæ, lateris &
pulmonum inflammationibus prodest: thoracem
expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur.
Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, vrinas
mouent, inflationes discutiunt: decocta cum ptisa
na, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euo
cant, cum myrrha modico pota. Inflammationem
turgentem vnam gargarizatus succus reprimit.

Galiopsis. Cap. LXXX.

Galiopsis frutex in totum caulem, & folia ha
bet vrticæ, leuiores, & quæ grauem odorem
trita reddant: flore purpurascete, tenui: nascitur
circa sepes, ædificiorum areas, ac semitas vbiq̃ue.
Folia, caules, semen, succusq̃; duritias, & carcino
mata dissipant: strumas, panos, & parotidas dis
cutiunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplas
ma imponere, & eius decocto fonere: ad putrescētia,
gāgrenas, & nomas, cū sale efficaciter illinūtur.

Galion. Cap. LXXXI.

Galion, nomen ex eo traxit, quod in contrahen
do lacte, coaguli vicem impleat: ramulum fo
liumq̃; habet aparine si millimum, rectum: floren
in cacumine luteum, tenuem, dēsum, copiosum, odo
ratur. Flos igni ambustis illinitur, sanguinis pro
fluuiā sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, in
solatum vsquedum albescat. lassitudines reficit. R. d

LIBER QVARTVS. 178
dix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

Senecio. Cap. LXX XII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, folijs
continuis, erucæ modo per extremitates diui
sis. sed minoribus multo: luteis floribus, qui
celeriter dissecti vanescunt in pappos. Nomen verò
sibi vindicauit, quoniam flores capillorum ritu, ve
re canescant. radice superuacua: nascitur maximè
in macerijs, & circum oppida. Folia cum floribus
refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per se
se, testium & sedis inflammationes sanant: quin
& ex manna thuris medentur, cum reliquis vulne
ribus, tum ijs quæ nerui acceperunt. Illiti per se cū
aceto pappi, idem munus præstant: verum recentes
epoli, strangulant. Totus caulis, si coctus in passo
potui detur, stomachi dolores à bili contractos, per
sanat.

Thalictrum Cap. LXX XIII.

Thalictron folia coriandri habet, pinguiora
paulo: cauliculum rutæ crassitudine, in quo fo
lia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem
perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

Marinus muscus. Cap. LXX XIII.

Marinus muscus nascitur in scopulis, te
stacesq; haud procul à mari, gracilis,
capillaceis, caulis expers. Præcipua ei
spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podag
ras, quas refrigerare opus sit.

Z ij

DIOSCORIDIS

Phycus marinus. Cap. LXXXV.

Phyci marini generibus, quoddā latum, & alterum sublongius, & rubens: tertiū candidū, nascens in Creta iuxta terrā, floridū valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratoriā, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter vtilem verū ijs vti humidis conuenit, priusquā exarescant. Nicāder, puniceum aduersus serpētes dedit. Hoc fūco quidā putāt mulieres suū calorem mētiri, cū tamē sit radícula eiusdē noīs, qua sese fucant.

Potamogeton. Cap. LXXXVI.

Potamogeton, folium betæ simile, hirsutū paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus vtile, & contra veterum vlcera nomas. Nomen ex eo inditū est, quod palustribus, et aquosis enascatur.

Stratiotes. Cap. LXXXVII.

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomentū traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia: quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, intumescere nō sinunt. ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Vulgatū Stratiotes millefolium. Cap. LXXXVIII.

millefo = **S**tratiotes millefolium exiguus frutex, palmilium. Saltitudine, aut amplius assurgit: folijs auicu-

larum pennas imitantibus, breui admodum disse-
ctoq; foliorum exortu. Folia syluestre cuminum si-
mulant, præsertim breuitate atq; scabritia, bre-
uiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surcu-
los in cacumine gerit, exiguos, & capitula inter-
dum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in
asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus
ad vlcera vetera, recentiaq; , profluentem sangui-
nem, & fistulas.

Verbascum. Cap. LXXXIX.

Verbascum differentias summas habet duas Tapsus
hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœ barba-
mina intelligitur. Fœmine igitur folia sunt bras- tus vul-
sice, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis gò.
albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores al-
bi, aut subpallidi: semen nigrum: radix longa, gu-
stu acerbæ, crassitudine digiti: nascitur in campe-
stribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius, * Sic
albis folijs, et angustioribus, tenuiori caule. Sed ni Plin. qui
grum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latio- zulo den
re; constaret folio. Syluestre folia fert saluæ, al- videtur
tas virgas, & * lignosas, & circa eas ramulos, legisse.
quales marrubiū: flores luteos, auriculatos. Sūt et Grecus
phlomidæ duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. codex
Tertia lychmitis appellatur: ab alijs aut thryallis δανδρω'
folijs ternis, aut quaternis, vel paulò pluribus, hir- das, id ē,
sutis, crassis, pinguibusq; apta ad lucernarū lumi- arbores
na. Radix priorū duarum adstringit: quare quod scentes.

Z iij

DIOSCORIDIS

magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuiio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiq; tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum, cui flos autem, capillos tingit, et quocunq; abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illinuntur: cū aceto quoq; vulneribus medentur: contra scorpionū ictus, sunt auxilio. Sylvestris folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

Aetiopis.

Cap. XC.

AEthiopis folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaq; in orbem circa radicē imā redacta: caulem quadrangulum, crassum ac scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concanuum alis: semen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem caespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ sicce nigrescunt duranturq;, vt cornua possint videri: plurima nascitur in Ida monte Troadis, et in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix, et pota: quin et cū melle, eclegmatis vicem præbet.

Arction.

Cap. XCI.

ARction, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco folijs, nisi quæd hirsutiora,

LIBER QVARTVS. 180

& rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta pernio- nesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicū dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. Cap. XCII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora & hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem al- Vulgò
lappa
maior, ei
bardana bicantem, quanquam & interdum vidua caule reperiatur: radice grandi, intus candida, foris ni- gra. Hæc drachmæ vnius pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extusientibus au- xiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlce- ribus illinuntur.

Petasites. Cap. XCIII.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrāde solum, galeri modo amplū, ceu fungus depēdet. Contra phagedenas, et vlcera, quæ cacoethe vocāt, efficaciter illinitur.

Epipactis. Cap. XCIIII.

Epipactis ab alijs helleborine, parua herba, exiguis folijs. locineris vitijs utilis, & contra venena pota.

Capnos, seu fumaria. Cap. XCV. Officinis

Fumaria fruticosa herbula est, prætenera, co- sumus
riandri similis: folijs candidioribus, vniique terræ.

Z ij

DIOSCORIDIS

numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis delacrymationemq; unde nomē traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam vrinam trahit.

Lotus urbana. Cap. XCVI.

Lotū urbanam aliū trifolium vocāt: nascitur ī hortis. Extractus succus, addito melle, oculorū argema, nubeculas, ceterasq; caligines discutit.

Sylvestris lotus. Cap. XCVII.

Sylvestris lotus, quā trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sepe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis. semine fœnigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cū malluæ semine, in vino aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui vesicam malè habent.

Cytisus. Cap. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargēs cubitales, sepe maiores in quibus folia fœnigræci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucā olent, gustataq; cicer recens sapiūt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si cū pane trita illinantur. Decoctū potus vrinā ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluearia serūt.

LIBER QVARTVS. 181
Lotus Aegyptia. Cap. XCIX.

Est & in Aegypto lotus, quæ in campis flumi-
ne inundatis provenit, caule fabæ: flore paruo,
candido, & lilio simili, quem tradunt occidente sole * *κρίνω*,
comprimi occludiq; ad ortum autem aperiri: ad nō *κρίθῃ*.
duntq; caput ipsum vespera aquis cōdi, et ad exor-
tum Solis emergere. Caput quale papaveris, maxi-
mum: & intus grana ceu milij, quæ Aegyptij exic-
cant, & in panes cogūt. Radicem lotos hæc habet,
mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; man-
ditur: decoctaq; lutei oui qualitatem exhibet.

ANNOTATIO.

Aliud est à nostro Millefolio, quod pau-
lò ante stratiotem millefoliū esse monui-
mus.

Millefolium. Cap. C.

MYriophyllum, siue millefoliū, caulis est tener,
singularis, vnica nixus radice: plurimis fo-
lijs, leuibus, foeniculo similibus: unde nomen acce-
pit. Caulis flauescit, varius, ac veluti ex industria
delimatus: nascitur in palustribus. Vulnere recen-
tia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel
siccum ex aceto oblinatur: præcipitatis in potu cū
aqua & sale datur.

Myrrhis. Cap. CI.

MYrrhis, simillima est cicuta, caule folijsq; ra-
dix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, ci-
bo non insuavis. Quæ pota in vino, phalangiorum

DIOSCORIDIS

morsibus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundus purgatque; à puerperio feminas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis terue die potam ex vino in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Myagrum.

Cap. CII.

MYagron, aliqui melampyron vocant, herba est surculacea, folijs rubiae, pallidis, tripedanea: semen oleosum, & scenograeco simile. Quod coctusum igni torrent, perunctisque virgis ad lucernarum lumina vtuntur: hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

ἡ τήλιδι
non τρά
χιδω.

Onagra.

Cap. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, praegrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, vinum olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua radix maderit, in potu data feras mitigat, et cicures facit: illitu quoque tetra ulcera mulcer.

Cirsium.

Cap. CIIII.

CIRSium, caulis est tener, duorum cubitorum, Buglossa triangulo similis. ab imo foliola, rosae specie officinae referentia, anguli spinosi, per intervalla molles: for-
rum. lia buglossa similia, & maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen
P in. mi- caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in sum-
nora. mo purpurea, quae soluantur in lanugines. Radice

LIBER QVARTVS. 182
huius loco laboranti ad alligatam, dolores varie
cum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus, seu inguinalis.

Cap. CV.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem in
cacumine habens purpureum, luteumue, per
ambitum, anthemidis capituli modo diuisum, fo-
liolis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem cir-
cundant folia, oblōga sunt ac hirsuta. Feruenti sto-
macho, oculorum inflammationibus, procidua se-
di, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpu-
reum florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pue-
ris comitiale malum sentientibus, opitulari. Angui-
num inflammationi recentem illinire conuenit. Si
aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, &
inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum.

Cap. CVI.

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudinem vo-
cant, quoniam folium, quod est aniso simile, in
pampinos torquetur: capitula sunt in summo cau-
le tenuia, plena seminis, melanthij gustum imitan-
tis. Contra tussim, & cætera pectoris vitia, semē
ex aqua mulsa bibitur: hepaticis, & sanguinem
excreantibus utile.

Viola purpurea.

Cap. CVII.

Viola purpurea folium habet hederæ minus,
tenuis ac nigrius, nec multò dissimile: cauli-
culus à radice medius prodit, in quo flosculus,

DIOSCORIDIS

suavissimè olens, purpureus: opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; prosidenti.

Cacalia. Cap. CVIII.

Cacalia, quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut māducatu per se tussibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cum cera to illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Bunium. Cap. CIX.

Bunion caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatēt: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus, Vri nam ciet, excalfacit, secundas euocat: licni, vesicæ, renibus utile. Tam humidi quàm sicci, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq; , vsus inualuit: ex aqua mulsa. Pseudobunion palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acri gustus. Tormina, atq; stranguriã, laterumq; dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua illiti quoq; cum sale & uino, tepentes, strumas discutiunt.

LIBER QVARTVS. 183

Chamæcissus. Cap. CX.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longio-
re, ramulis à radice quinis senisue, dodrantali Non est,
bus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac te quavis
nuiore, gustu supra modum amaro: radicetenui, cadi id sonet
da, inutili: nascitur in cultis. Bibunt conuenientissi Græcani
mè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tri ca dictio
bus, tricenis quadragenisue diebus: eodè pota mo= hedera
do, senis aut septenis diebus, regiū morbum purgāt. terrestres

Chamæleuce. Cap. CXI. vulgò no

Chamæleuce lumborum doloribus propitia est, minata:
herba virens, incuruis folijs, surculisq;: flo= quod eā
re rosaceo. paulò

Buglossum, seu lingua bubula. studio =

Cap. CXII. sius cum

Buglossum nascitur in campestribus, & sabu= descri=
lofis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ ptione cō
treis thyrsos emittit, cum semine & radice trita, ferens, li
potamq;: contra tertianos horrores prodesse: quæ quidò co
quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur, her= gnoscet.
bam abscessibus vtilem esse volunt. Verbasco simi Vulgaris
le est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, Borago.
bubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectū,
animi voluptates auget.

ANNOTATIO.

Nostrium Cynoglossum caulem & pur-
pureos flosculos edens, non esse verum ac
legitimum, historia eius apertissimè indicat.

DIOSCORIDIS

Cynoglossum. Cap. CXIII.

Cynoglosson folia latifoliae plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, et humi sternitur: prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri, medentur morsibus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herba ex vino potum.

Phyteuma. Cap. CXIIII.

*** Stru-
thy.** **P**hyteuma folia habet * radicle, minora: capitulosum semen, perforatum, radicem parua, tenuem, per summa terrae nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium. Cap. CXV.

Leontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum. quaternumue digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem lamis flore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri semen usque ideo spissa lanugine inuolutum est, ut sepe fallat: rationale parua cohaeret: quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum. Cap. CXVI.

Hippoglosson, frutex est folia habens ruscigenae figura, & spinosam comam, & in summo ceterum linguas ex folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succus admiscetur.

LIBER QVARTVS. 184
Antirrhinum. Cap. CXVII.

ANtirrhinum, alijs anarrhinon vocant, herbã
caule & folijs anagallidi similẽ: flore albæ
violæ purpureo, minore tamẽ, ideoq; syluestris lych-
nis nominata est: semine vituli narium simili. Tra-
dunt perunctos ea, cũ oleo lilino, venustiores fieri:
nec vlllo medicamento lædi posse, si quis appensum
gestet. Catanance. Cap. CXVIII.

EX eo genere vna, folia coronopi habet, lon-
ga, radicẽ iunci modo prætenuem: capitula
sena, septenariæ, in quibus erui semen inest.
Arescens in terrã flectitur, & se contrahit ad spe-
ciem vnguium milui exanimati. Altera mali parui
magnitudinẽ explet, radice exigua oliuæ magnitu-
dine: folijs quoq; oliuæ colore, & figura, mollibus,
diuisis, humi inclinatis. semen, vt cicer, minutum,
in virgulis dependet, puniceï coloris, multis forami-
nibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria
expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

Tripolion. Cap. CXIX.

TRipolion i marinis nascitur locis, q̃ allidit vn-
da, recedẽs q; dimittit, neq; in mari, neq; in sic-
co: folio glasti crassiore palmeo caule, in mucrone
diuiso. Eius, vt tradũt, flores colorã ter die mutãt,
mane cãdidi, meridiẽ purpurei, sero puniceï cõspiciũ-
tur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drach-
mis duabus in vino pota, aquã, vrinamq; per aliũ
extrahit. In medicamẽta digeritur, q̃ venena arcet

DIOSCORIDIS
ANNOTATIO.

Officinarū Capillus Veneris . Est enim earum Adiantum, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxi. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, vti suspicamur, fuscis obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiantum, cōparatum, album potius, quā nigrum, appareat.

Adiantum. Cap. CXX.

A Dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: calliculi, quibus exoriantur, nigro colore nitent, prætenuēs, palmum alti: radice supernuacua: neque caulem, neq; fructū, neq; florem profert. Decoctū herbe potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinæ difficili. Calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet, et menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit, furfures, et manātia capitis vlcera, ex lixiuio emēdat: defluentes capillos continet, cū ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoq;. Decoctum eius cū lixiuio & vino infusum, idem præstat: coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additū. Seritur gratia vtilitatis pecorū circa ouilia. Vmbrosus,

brofis, & palustribus, circa parietum aspergines,
& frontium specus enascitur.

Trihcemanes. Cap. CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus
adianton filici simile, sed exilius: folijs lenti- Offici-
culæ, tenuibus, in ordinem vtrinque digestis, aduer- nis poly-
sis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore trichon
splendentibus. Eadem quæ & adianton præstare quod idē
posse constat. tamē cū

Xanthium, siue Lappa. Cap. CXXII. Adianto

Xanthium nascitur læto & pingui solo, &
lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, Vulgò
pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atripli lappa mi-
cis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: frū nor.
Etū grandis oliuæ modo, rotundum, & vt platani
pilula, spinosum, qui cōtactu uestibus adherescit.
Is antè collectus quàm perfectè siccescat, tūditur,
& fictili vase recōditur. Flauos aut facit capillos,
si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox ca-
put, nitro antè perfriētum, illinatur. Alij in vino
tundunt, & ita asservant. Semen aptissimè tumo-
ribus imponitur.

Aegilops, siue festuca. Cap. CXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed mol-
liora, in summo capite semina bina ternæ,
rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita Marcel-
cū farina herba ægylōpis medetur, duritias discu- lo suppo-
tit. Succus farine admistus, siccatur, & eorundē sititia.

A 4

DIOSCORIDIS

gratia reponitur. Bromus herba agilopi similis, exiccatoriam vim habēs, decoquitur cū sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteū eo humore imbutū, & naribus inditū, contra graueolentiam vlcerū efficax est. Alii qui tritam aloen addunt, et eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, grauē oris halitū emēdat.

Glaux. Cap. CXXIII.

Glaux cytiso aut lenticulae folijs similis, quae superne virent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exiliūt quini senīue, tenues ab radice, dodrantem alti: flores violae albae, purpurei exeunt, minores tamē nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

Polygala. Cap. CXXV.

Polygala palmi altitudinem petit, folijs lenticulae, gaulthi adstricto. Quae pota, lactis abundantiam facit.

Osyris. Cap. CXXVI.

Osyris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; contumaces: & in his folia, quaternaria, quina, senariae, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

Cēsetur
Linaria
unigō ap
pellata.

Aspera similax. Cap. CXXVII.

Smilax aspera, folia habet periclymeni: sarmen

ta tenuia, multa, rubi modo aut paliuri aculeata: arbores scamlit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordet. Nascitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia et acini, & ante & post epoti, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritū propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiā ad alexi pharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcetur.

Læuis smilax. Cap. CXXVIII.

Lævis smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora huius sarmenta nullis horrent spinis: conuoluitur aboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: flores circumquaque exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam factitantur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio poto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis observari traduntur.

Ruscus. Cap. CXXIX.

Sylvestris myrtus, aliquibus oxymyrsine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronis brunatum: bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes: osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo

DIOSCORIDIS

lenti, fractu cōtumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia et bacca in vino pota vrinā cient, mēses pellunt, vesicæ calculus frāgunt, stillicidio vrinæ medentur, dolores capitis sanāt, & regiū morbū. In asperis et præcipitibus locis enascitur. Decoctū radice in vino potū, eosdem præbet effectus. Cauliculi recētes, asparagorū vice, in cibo sumūtur. Amari aut sunt, sed vrinā mouēt.

Laurus Alexandrina. Cap. CXXX.

Laurus Alexādrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, dodrā tales, interdum longiores: radice * sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio vrinæ auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. Cap. CXXXI.

Vulgò
Laureo = **D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modū viscosus ramos vestit: folia lauri graciliora, et molliora, fractu cōtumacia, quorū gustatu os & fauces incendūtur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra: radix inutilis: nascitur in montosis. Pituitus extrahit folium recens vel aridum in potu, menses ciet & vomitus. caput inanit commanducatū, sternutamēta mouet. Bacca quindecim pota aluum resoluunt.

Chamædaphne. Cap. CXXXII.

Chamædaphne virgas emittit cubitales, singu-
lari ramulo constantes, rectas, tenues, læues fo-
lia lauri similitudine, læuora multò, ac viridiora :
semen rotundum, rubens, annexum folijs. Allinūtur
capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores
mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur.
Potus cum vino succus, menses & vrinam ciet: idē
facit pesso appositus.

Veratrum album. Cap. CXXXIII.

Helleborum album, Latini veratrum albū vo-
cant, fert folia plantaginis aut betæ sylue-
stris similia, sed breuiora, & nigriora, * rubescen * Plin.
tia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis conuolu canaliū
tum, quas abdicat cū arescere incipit: radicibus ni dorso ru
titur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguo capi bescētia.
te caparū modo exeuntibus: nascitur in montibus
& asperis. Radices messibus colligendæ. Optimum
habetur candidū, friabile, carnosum, modicè exten-
tum, nec tamen iunci modo mucronatū, quod fran-
genlo puluerē emittit, & tenuem habet medullā,
gustu non admodū feruens, neq; saliuam subinde
ciens, (huiuscemodi aut strangulat.) Primatū Cy-
renaicum tenet. Galaticum aut & Cappadociū,
candidiora, et puluere quodam obsita, celerius strā-
gulatus mouēt. Vomitione aut varios extrahit hu-
mores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculo-
rum discutunt. Partus impositum necat, menses

A a iij

DIOSCORIDIS

pellit, sternutamenta excitat, mures interficit cum melle & polenta subactum, absumit carnes si coquatur vna. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cū aqua mulsa, aut pulte, aut quavis alia sorbitio ne. Cogitur cū pane, & ita inassatur. Preparatio corporū, ac victus ratio, diligēter tradita est, cum ab his qui de medica eius portione scriptitarūt, tum maximè à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc asse timur, quippe longū nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curādi ratio nem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitio ne, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea ci bum dari præcipientes statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strāgulationis suspicio immi net, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim mo do deiectio nihil periculi minatur, quod cibo muni tis non intempestivè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones cōcitant subdita ex eo bala ni, cum aceto.

Veratrum nigrum. Cap. CXXXIII.

Helleborum nigrū, appellatur melampodion, quoniā caprarum pastor, nomine Melāpus, furētes in se. Prætidæ, primus purgasse, & sanas se, fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, plu ribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen cnici, quod

in Anticyra sesamoides vocant: quo deiectiones moluntur: radicibus cohaeret nigris, tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis. quarū est vsus: in collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimū est, quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrū inibi probatissimū gignitur. Eligi debet corpulentum et plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruēs q̄: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natū: attamen Heliconium præcellit. Veratrū nigrum purgat vētrem, detrahit bilem pituitas q̄: datum per se, aut cum scammonia, et tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insipientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses inditum trahit, partus necat, purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. Itē contra gravitatem auditus in aurem demittitur, ibiq̄ in alterum aut esiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat erodentibus medicamentis cōmiscetur: hydropicorum vētri vtilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma: confectum proximè radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius resparsu domos expiari arbitrantur: quare inter fodiendū stantes, Apollinem,

DIOSCORIDIS

Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquilæ volatus: aduolare enim non sine periculo tradunt: namq; si avis effosionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, auguriū est. Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quapropter, ad id arcendum, fossuri allium præsumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnum. Cap. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborū vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis pituitæq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantales: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorū acumine capitula, florū penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum. radix tenuis. Detrahit bilē pituitasq; semen ex aqua mulsa potū dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Vulgò Syluestris cucumer. Cap. XXXVI.
Cucu = Cucumis syluestris fructu solo distat à satiuo
mer asi = cucumere, quem longè minorem parit, oblongus
ninus. glandibus non dissimilem: folia atq; sarmenta

satini refert: radice candida, magna: nascitur in sa-
 buletis, & ruderibus frutice in totum amaro. In-
 stillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit.
 Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem
 discutit: imposita cū resina terebinthina, tubercu-
 la rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discuz-
 tit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes
 in dolore colluuntur. Arida farinae impetiginem, le-
 pras & vitilignes absterget: nigris cicatricibus
 colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Ra-
 dicis succus sequioboli pondere, & item cortex, ace-
 tabuli quarta parte, bilem pituitamq; deijciunt, præ-
 sertim in hydropicis: (deiectiones aut citra stomas-
 chi iniuriam mouet) radice selibra, in vini præser-
 tim Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo ter-
 ni cyathi triduo, dum tumor abundè deprimi cer-
 natur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamen-
 tum, quod elaterium vocatur, ad hunc modum: De-
 cerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruā Elateriū
 tur nocte vna: postridie imposito supra craterem
 rariore cribro, utrisq; manibus prehensi, sigillatim
 supino cultro, sursum versus aciem habēte, findun-
 tur, atq; per cribrum humor in subiectum vas ex-
 primitur: simulq; carnosum quod hæsit cribro, quò
 facilius excidat, eliditur, quod ita pressum est, resi-
 dere sinitur, atque in vicinam peluim demittitur.
 Coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua
 persunduntur, & denuò pressa abijciuntur. Hu-

DIOSCORIDIS

mor in pelui agitatur, & linteo, opertus Soli expo-
nitur: dumq; steterit, tota supernatans aqua cū hu-
more concreto, effunditur. Hoc vero identidē fieri so-
let, donec existēs aqua lique scat: qua stillatim ex-
hausta, sedimentum mortario suscipitur, & conte-
rendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam
protinus succi abundantia, cribratos cineres humi
inspargant, & medium cavantes, triplicatum linte-
um obtendant, per quod elateriū cum sua humi-
ditate diffundunt, siccatumq; in pila, ut dictū est,
conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfur-
dentes, ita eluunt. Alij in novissima lotionē, mul-
sam aquam respergunt. Elaterium optimū esse cō-
stat, leue, non ponderosum, cum candore leniter hu-
mectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum
luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum ta-
men scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui
cinerisq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet.
Nec desunt qui cucumis succo amyliū immisceant,
ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bi-
matu ad decennium deiectionibus utiue est. Integer
modus, obolus est. minimus, semiobolus: pueris, chal-
ci duo: si quidem copiosius, periculum adfert. Bilem
ac pituitam vtriusque parte extrahit. Optima suspi-
riosus est purgatio. Quod si in animo sit deiectionē
molari, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare
sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia da-
to, postea cyathus unus aque tepidae sorbeatur: ad

citandas tamen vomitiones aqua diluens elateriū, subiectas linguae partes penitissimè penna oblini-
to: quòd si quisquam difficilius euomat, oleo aut
vnguento irino resoluito, somnū inhibeto. Porro his
qui eximie vacuantur, continuè vinum, & oleum
dari conuenit: etenim vomendo restituuntur. Quòd
si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta,
posca, poma, & quæ stomachum desando corrobo-
rant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, et par-
tus enecat, in pesso subditū: morbo regio medetur,
cum lacte naribus infusum, et diuturnus capitis do-
loribus liberat: efficacissimè anginis illmitur, cum
vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. Cap. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia ha-
bet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, mol-
les, nigrosq;: fert florem glasti, et folliculos virides,
similes ciceri, & in his nucleum triangulum, sca-
brum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gu-
stu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mul-
sa dentur, crassum humorem per vomitum pur-
gant: sed qui hauserunt, ambulare debent: pruden-
ter tamen attendere oportet, & aquam mulsam
continuò potui dare: quoniā pericula strangulatio-
nis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo
illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris.
Cit plurimam pituitam commanducata. decocta
in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuinit: rheu-

DIOSCORIDIS

matissimum gingiuarum sistit: vlcera oris manantia, cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Tapfia. Cap. CXXXVIII.

Thapsia nomen ideo accepit, quòd in Thapso eiusdem nominis Insula primum inuenta sit. Tota vero natura ferulae similis est: graciliore caule: folijs foeniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulae, latiusculum, sed aliquantò minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio hæc est: factò in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in se excavata, cooperitur, quòd merus succus confluat: oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallũ expressus fictili crasso insolatur. Aliqui foliũ vnũ terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc aut̃ interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs aut̃ extractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet nō obuersus uento: aut potius, cū dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulae: ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radice,

LIBER QVARTVS. 191

quàm succus, purgandi vim habet, & lacteus succus in aqua mulsa potus: nam utrinque bilem extrahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus unus: quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiciosi, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusque, datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tã radix, quàm succus omnium maximè, quæ pares cum eis vires adepta sunt, vim habent extractoriã ex alto, ubi ex imo aliquid euocandũ est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affricu, alopecias explèt. Radix succusque cum æquis ceræ thurisque portionibus, sugillata liuoresque tollunt: sed nõ plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cũ melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discutit, perunctus cũ sulphure. In diuturnis pulmonũ, laterũ, pedũ, articulorũque uoletudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendã colic glandem, ijs qui natura, non circuncisione, curti sunt: tumore enim excitat, qui pinguiũ fotu emollitus, præputij iacturã resarsit.

A N N O T A T I O.

* Sine folijs, Spartiũ, vt in agro Mons pessulano eius feracissimo sæpe obseruaui (à G. Rondelletio eius loci clarissimo Medico primũ admonitus) cùm primum

DIOSCORIDIS

erumpit, plurimis foliolis turgēt, quibus omnibus cū ad consistentiam peruenit (quo solo fortassis tpe visum Dioscoridi) exuitur, adeo vt ramuli eius iūcei deinde appareāt. Est tamen hoc diuersum planē ab eo, cuius Plinius lib. xix. cap. 11. meminit. Cæterū an spartium hoc loco depictum, sit idem cum genista Latinorum, malo equidem dubitare cum Plinio, quæ eorum iudicio subscribere, qui diuersi generis plantas esse contendunt: & pro genista fruticem quendam rebus alligandis (quod in illa tamen requirit Plinius, & Maro in Georgicis, cū lentam appellet, satis innuit) parum idoneum ostentant.

Spartium. Cap. CXXXIX.

Spartium frutex est: longas ferens virgas, * sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticule, in folliculis phasiolorū modo nascens florem, vt albæ violæ, luteum. Purgant per superna uehementer, hellebori vice, citra periculum flores, & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidā marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clyster: strigmenta autem elicit cruenta.

LIBER QVARTVS. 192

Silybum. Cap. CXL.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamæleonis albi. Hæc recēs cum sale oleq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pōdere potus, vomitiones ciet.

Glans vnguentaria. Cap. CXLI.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellane nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa unguenta pro oleo vtantur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæā. Præfertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere posita, lienem absomit: cum lolij farina, & aqua mulsa, podagricis illinitur: psoras leprasq; decocta in aceto, vitiligines & nigras cicatrices cum nitro, emendat: & cum lotio lentigines, varos & papulas in facie, et cutis vitia tollit. Vomitione mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit: verum tussæ & expressæ succus abstergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduersus prurigines & scabritias idonea sunt.

Narcissus. Cap. CXLII.

Narcissum sunt qui ut lilium, lirim appellauerint, folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulis uacuus, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

DIOSCORIDIS

crocus, in quibusdā purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen uelut in tunica, nigrum, longum: probatissimus nascitur in montibus, suauis odore: ceteri porrum imitatur, atque herbaceum uirus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, uomitoria est: ambustis igni prodest, cum exiguo melle trita: praecisos nervos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit: uicia cutis in facie, uitiliginisque: cum semine urticae, & aceto emaculat: cum eruo & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit concoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaes. Cap. CXLIII.

Hippophaes, quo fullones uestes interpolant, in sabulosis, maritimisque nascitur, surculaceo frutice, undique denso & largo, folijs oleae, longioribus, mollioribusque: inter quae candicantes spinae emicant, siccae, angulosae, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim cohererent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsiae, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Synerus, pituitas, bilem, aquasque detrahit, oboli pondere: erui uero farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frutex cum radicibus siccatur conditur,

LIBER QVARTVS. 193

tur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentū depromitur, vti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. Cap. CXLIIII.

Hippophæston, id, quod aliqui hippophæes appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophæes, estq; spinæ fullōiæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: in anibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsæ, aquâ pituitasq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorū vitijs, & orthopnœæ conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus.

Cap. CXLV.

Cici, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor prouenit parua ficus altitudine, folio platani, maiore, leuiore, & nigrior: ramis, caudicibusq; cauis, in arundinis morem: semine in vuis asperis, quod corticibus exutum, ricinum animal representat: ex quo oleū, nomine cicinum, exprimitur, cibis foedū, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt: vomitionesq; mouent, sed iniucunda admodū est, & molesta purgatio: siquidē stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie,

Vulgò
Cataplasma
maior.

D I O S C O R I D I S

varosq; expurgat. Folia cū polenta trita, inflāma-
tiones oculorū, tumoresq; leniūt: rigētes māmās co-
hibēt. eadē ex aceto illita, ignes sacros restringūt.

Tithymali. Cap. CXLVI.

Tithymali genera septem, quorum masculus,
characias appellatur, ab aliquibus amygdal-
loides: alter, myrtites, qui foemina existimatur,
eumq; myrsinitem aut caryiten vocant: tertius, pa-
ralius, quem tithymalida appellarunt: alius, helio-
scopius: quintus, cyparissias: sextus, dendroides:
septimus, platyphyllos dicitur. Characiae caules su-
pra cibiti altitudinem attollūtur, rubri, lacteo suc-
co atq; acri madentes: solijs oleæ circum ramos, an-
gustioribus, et longioribus: radice crassa, lignosa:
pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub
qua caueole foliolis balnearum similes, in quibus
semen continetur nascitur in asperis, & montibus.
Succus aluum purgat: trahit pituitam bilemq; bi-
nis obolis in posca sumptis: & cum aqua mulsa,
vomitiones mouet. Appetente vindemiæ tem-
pore, succus congestis ramulis, mox dissectis, &
nafe conclusis, excipitur. Aliqui adiiciunt farinā
erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudi-
nem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quater-
nā sue guttas instillant, vt cum his inarescāt: quas
ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, et in
pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur
lac neq; quò ventus aspiret, stare quenquam, neq;

manus oculis admoouere cōuenit: sed antequam col-
 ligas, corpus, præsertim faciem, collum, scrotumq;
 genitalis, adipe aut oleo cum vino perungere. Fau-
 ces autem exasperat: quapropter catapotia, cera
 aut decocto melle oblini par est, & hoc modo da-
 vi: binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia,
 sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in
 sole capillos euellit, renascentesq; flauos, & exiles
 efficit: deniq; omnes perimit. Dentium cauernis in-
 clusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne
 suo delapsu, fauces & linguam vitiet. Tollit illitis
 impetigines, formicantes verrucas, pensiles, et quæ
 thymi florem representant. Valet aduersus ptery-
 gia, carbunculos, phagedœnas ulcerum, gangræ-
 nas, fistulâsque. Legitur semen autumnino, & sic-
 catum sole leuiter tunditur, feruefactumque loco
 mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen
 & folia lactei succi effectum præbent, dimilio
 acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum
 lacte lepilio, & caseo contuso. Radix drachmæ
 pondere in hydromelite pota, per inferna trahit.
 Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, col-
 luto ore. Fœmina, quam myrsiniten, aut caryiten
 vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: folijs
 myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis,
 & purgentibus: ramulos ab radice mittit dodran-
 tales: fructum fert alternis annis, nuci similem,
 mordaci gustu: nascitur & hæc in asperis. Suc-

DIOSCORIDIS

eus, radix, semen, folia, consimilem antedicto for-
tiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones
inualidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur
paralios, quem tithymalida, aut mecona aliqui ap-
pellauere. Nascitur in maritimus, ramis subrubētis
bus, palmum altis, quinis senisue à radice exeūtis
bus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus
quosdā digestis: capite in cacumine orbiculato, in
quo semen, vt eruum, vario colore emicat: flos al-
bus. Frutex totus cum radice lacteo succo turgēt.
Similes ad vsus reconditur. Helioscopius dicitur,
folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribusq;: ra-
mulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinq;
rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis
copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitu-
lis incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniā comas
cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissi-
mum in ruderibus. Colligitur succus semenq;: vt
aliorum. Eadem quæ superioribus vires, non tamē
vsque adeo valide. Ciparissias in caulem exit do-
drantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia
piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, &
tenuiora: & in totum nascentem piceam emula-
tur, vnde nomen traxit. Candido succo madet, cui
eadem vis quæ superioribus. In petris nascens, den-
droides cognominatur, ampliter opacat, in cacumi-
ne frōdosam spargens comā, succo lacteo pręgnās
cauliculis rubētibus: folijs myrti tenuioris: fructu

LIBER QVARTVS. 195

characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo recoditur. Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tusus, & aquæ inspersus. Reliqua tithymalorum genera, quæ suprà scribuntur, idem efficiunt.

Pityusa. Cap. CXLVII.

Pityusam specie à cyparissia differre constat, etsi tithymalorum generi assignetur. caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, lato: radice crassâ, cādida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsa: item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur: modus foliorum drachmæ tres.

Lathyrus. Cap. CXLVIII.

Lathyrus, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem: gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparim, in quo græ

Offici-
nis Cæ-
taputia
minor.

B b iij

DIOSCORIDIS

na intercurfantibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus. Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cū ficis, aut palmulis deuorata, aluū purgāt: sed aqua frigida postea sorbēda: trahūt autē bilē, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectū præbet. Cū gallinaceo aut oleribus folia decoquuntur ad eosdem effectus.

Peplus.

Cap. CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut rutæ, paulo latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet. superuacuum, ex qua fruticat: nascitur inter vires, & in hortis. Colligitur messibus: siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus tussus, & feruefactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto: obsonijs inspersa conturbat aluum. muria conditur.

Peplis.

Cap. CL.

Peplis, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maxime nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs satine portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine subfolijs rotundo, uti in peplo, feruens

te gustu: radice singulari, supernacua, tenui. Colliggi, & reponi ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

Chamæsyce. Cap. CLI.

Chamæsyce aliqui sycē nomināt. Ramos emit tit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, peplum, planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur. semine sub folijs rotundo, vt in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, supernacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedāt, in pecto appositi, tollūt tumores ac verrucas omniū generū illiti: decoctorū cibo, aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest: illitus contra scorpionis ictū auxiliatur: aduersus caligines oculorū utilis, et hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices cū melle inunctus. In squallidis petrosisq; nascitur.

Scammonia. Cap. CLII.

Scāmonia, ramos ab vna radice emittit trium cubitorū, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: folijs helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis, flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto radix in testudinis speciem cultro excanatur, quo fit vt in cauum confluat succus, qui conchis demum ex-

DIOSCORIDIS

cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fo-
 diunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profun-
 dunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autē
 scāmonium leue, nitidum, rarum, & colore quā
 simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fi-
 stulis, quale ex Mysia regione Asia deportatur.
 Nec attendere solum par est, si linguae tactu albe-
 scat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto sit
 tithymali lacte) sed longē magis antea narratis.
 Item si non vehementer linguam exurat, id quod
 misti tithymali argumentum est. Natione autem
 Syriacum & Iudaicum deterriima habentur, gra-
 uia, densa, erui farina & tithymalo vitata. Suc-
 cus drachmæ vnius aut quaternum obolorum pon-
 dere haustus, ex aqua pura vel mulsæ, per inferna-
 bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendā alui
 binos obolos cum sesama, aliove semine, sumpsisse
 satis est. Dantur efficacioris purgationis causa,
 succi tres oboli, cum duobus veratri nigri & aloes
 drachma vna. Fiunt purgatorij sales, drachmis vi-
 ginti succi scāmonie, i senos salis cyathos adiectis.
 Horū modus proportionē virium: integer quidem,
 tria cochlearia: medius, duo: minimus, vñ. Radicis
 drachma vna aut altera purgat, cū ijs quæ retuli-
 mus. Nonnulli decoctū radicis ebibunt. Coquitur in
 aceto, & cū hordeacea farina teritur, cataplasma-
 te ischiadicis vtili. Partus enecat succus, vuluæ i la-
 na subditus: tubercula discutit cū melle aut oleo illi

tus: decocto i aceto perunctæ lepræ abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto et rosaceo perfunduntur.

Chamælea. Cap. CLIII.

Chamælea surculosa fruticat, ramis do- Offici-
dratalibus: folia oleæ similitudinē habēt, nis Me-
tenuiora & amara, quæ gustata linguā xereon,
mordent: & arteriā deradunt. Detrahit pituitam Arabū
bilemq; , folijs præsertim in catapotio deuoratis: more.
nanque duæ absynthij partes, adiecta chamæleæ
vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia co-
guntur: ea autē in ventre non liquefcunt: siquidē
quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cū mel-
le tritis sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa. Cap. CLIIII.

Thymelæa est, qua granum gnidium, quod est Granū
semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apolinum Gnidiū.
vocant, quoniam satui lini frutex suapte natu-
ra similitudinem referat. Virgas edit perpulchras,
multas, tenues, binum cubitorum altitudine: folijs
chamæleæ, angustioribus, & pinguioribus, vi-
scosis, gummosisq; , si mordeantur: flore candi-
do: fructu myrti in modum rotundo, qui inter ini-
tia viret, & tandem rubescit: inuolucrum fru-
ctus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per
inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahit, si vi-
ginti granorum pars interna bibatur: verū fau-
ces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in
uue acino dari debet, aut melle cocto obductū deuo-

DIOSCORIDIS

rari. Qui egrè desudant, trito semine cum nitro et aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cneorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere convenit. Illitum acetabuli modo, cum diluta vini potione, aquam extrahit: in diocius purgat, addita lente cocta, aut cōtritīs oleribus. Thymelææ farina vix acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur, qui coccon gnidium, fructum esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

Sambucus.

Cap. CLV.

S Ambuci duo genera: vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia in gladiis: terna, quaternæ, ex intervallis circa ramos exeunt, graua odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus cauliculisq; circinatæ umbellæ, quæ florem candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterum genus, chamæactæ vocatur, Romanis ebullū, longè humilius est, magisq; herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex intervallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graueolentibus, in ambitu serratis.

LIBER QVARTVS. 198

is: mustario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque vis, & vsus exiccans, alno detrahens aqua, Stomacho inutilis. Folia, olerum more coquuntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuuat: prodest viperarum morsibus, eodem pota modo: vuluas emoluit insidentium decocto, patefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti, Folia, si pretennera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis & canis morsibus illita prosunt: vlcera quae dehiscunt in fistulam, agglutinant: ijs, qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino prosunt illita folia.

Pygnochomum. Cap. CLVI.

PYgnochomon constat eruce folijs, acrioribus, scabris & crassis, caule quadrangulo: flore ocymi: semine marrubij: radices nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente: inuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia, & tumultuosa facit, drachmae instar potum: tumores discutit, illicum cum polenta, & spiracula, adactosque corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tuberculi, panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsa duum drachmarum pondere, alnum soluit, & bilem extrahit.

DIOSCORIDIS

Apios.

Cap. CLVII.

*Aspho
deli.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rute, oblongioribus tamē & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice hastule regie, in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fecunda: intus habet corpus candidum, extrà cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitasq; extrahit: inferior, per aluum: tota utrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix i fictili mergitur, et agitata aqua, quod supernatat pēna selectū, exiccatur. Purgat utraq; parte is succus, sesquiobolo potus.

Colocynthis. Cap. CLVIII.

Coloqui
tida offi
cinis,

Colocynthis sarmenta foliaq; satiui cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pile conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum coeperit in pallidum colorem permutari. Melulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsa, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pile teruntur, & infusæ clysteribus prosunt nervorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitijs, ut quæ bilem, pituitam & strigmēta, interdum etiam cruorem eliciant: foetus admotæ enecant: dentium dolorem tollit, si vna repurgetur & luto oblita cum aceto et nitro inferuescat,

LIBER QVARTVS. 199

hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua mul-
sa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo
refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta
alui detrahet: stomacho supra modū aduersatur.
subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur.
Virentis succo vtilissimè schiadicī perfricantur.

Epithymum. Cap. CLIX.

Epithymon, flos est è thymo duriore, satureiæ
similis: capitula habet tenuia, & leuia, & in Aliud à
eis caudiculas, quasi capillamēta. Potum cum mē nostro
le detrahit pituitam bilemq; atram, per inferna. Epithy-
Privatim prodest melancholicis, & inflatis, aceta mo.
buli mensura, ad quatuor drachmas, cum melle,
sale, et aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia et
Pamphylia gignitur.

Alypum. Cap. CLX.

Alypon, surculosa herba est, subrubra: graci-
libus ramulis: tenuibus foijs, flore molli, le-
ui, & copioso. radice betæ, tenui: referta acri suc-
co. semine crasso.

DIOSCORIDIS
Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in
iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris. Cap. CLXII.

Vitis sylvestris sarmenta vitis modo prelonga
ga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, fo-
lijs hortensis solan, longioribus ac latioribus: mus-
coso flore, & capillaceo. fructu exiguis vuis similis
post maturitatem rubente: rotunda est acinorum
facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis
duobus vini aqua marina diluti, pota, humorem
alui ciet: ideo hydropicis datur. Vire eius, vitia cu-
tis in facie, & maculas omnes expurgant. Enas-
centes viticule, cibi gratia, sale condiuntur.

Vitis alba. Cap. CLXIII.

Officinis
Bryonia. **V**item albā aliqui bryoniam vocant. Folijs,
viticulis, pāpinisq; satiuam vitem imitatur,
sed hirsutiora sunt oīa: ea, quos prope se nacta sit
frutices, suis clauiculis complectitur fructus rubēs
in vna dependet, quo coria pilis spoliuntur. Ex ea
asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti
in cibo, aluum et urinā ciet. Folia, fructus, radix,
acrem vim sortiuntur: itaq; vlcerum phagedenis,
gāgrenis, chironijs, putrentium tibiārum tadio, ef-
ficaciter ex sale illinūtur. Radix corpus abstergit,
& cutem erugat. vitia cutis in facie, varosq; lēti-
gines, & cicatrices nigras emēdat, cum eruo, creta
Chia, et fœnogræco. Eadē effectū prodest decocta
in oleo, vsq; dum liquecat: sugillata tollit, & res

duuias cōmittit: inflāmationes discutit illita ex vi-
no: suppurationes rumpit: medicamēto aptè immi-
scetur, quod carnem exest: infracta ossa extrahit,
trita & imposita. Datur comitialibus in potu dra-
chmæ pondere, quotidie, anno toto. Prodest attoni-
tis, & vertigine laborātibus, consimiliter assum-
pta. Contra viperarum ictus pota drachmis dua-
bus, auxiliatur: partus necat, mentē interdū sub-
turbat: fœminarum locis apposita, partus secun-
dasq; morātes trahit: cit urina pota. Eclegma ex
ea fit cū melle, difficile spirātibus, strāgulatu op-
pressis, tussientibus, vulsis, ruptis, & laterū dolo-
ribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta
diebus, cōsumit: illinitur ad eadē cū fico. Ad mulie-
bres īsessus decoquitur: si quidē vuluas purgat, sed
abortū facit. Succus ē radice vere exprimitur qui
trahit pituitā, cū aqua mulsa potus. Ad p̄foras et
lepras, semē efficaciter illinitur. Lactis abūdantiā
facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis nigra Cap. CLXIII.

Nigra vitis, quam aliqui nigram bryoniam
vocant, folia fert hederæ, smilaceis proxi-
ma, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis
suis arbores, quasi adminicula, comprehendit:
fructus racematim coherent, qui inter principia
virent, & post maturitatem nigrescunt: radix fo-
ris nigra, intus buxæo colore. Viticulae, quæ pri-
mo germinum partu erumpunt, in olera recipiunt.

DIOSCORIDIS

tur: menses pellunt, vrinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutione tē tatis, profunt. Radix eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis tumentorum cervicibus commodissime illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix.

Cap. CLXV.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pennata, subgravi odore: radice per summa cæspitum nigra, oblonga, filices multas fundēte, subadstringēte gustu: nascitur in montibus, & saxosis. Radix laticineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammonie aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægustare debet. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & portu & illitu cū axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio: cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quā per ambitum sata copiosior arundo coronet: & contrā, evanescens abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Filix scæmina folijs est filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non singulari, vt illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent: aliquæ etiamnū rubræ inveniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cū melle. eclegmate sumpto: potæ cū vino, drachmis tribus, terretes

teretes tineas eijciunt : datae foeminis, sterilitatem faciunt, & praegnantibus abortum, si supergrediatur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repugnantibus inspargitur: iumentorum cervicibus medetur. Folia recentia, in oleribus cocta manduntur vt ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

Cap. CLXVI.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, praesertim quercuum, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirri, seu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aquae mulsae insparsa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatus efficaciter illinitur, & aduersus rimas, quae inter digitos fiunt.

Dryopteris.

Cap. CLXVII.

Dryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multo minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur.

cc

DIOSCORIDIS

Cnicus. Cap. CLXVIII.

Offici-
nis, Car
tamus.

CNicus folijs constat oblongis. per ambitum di-
uersis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capi-
tulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine
candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore
in obsonijs vtuntur. Seminis tusi & expressi suc-
cus cum aqua mulsa, vel iure gallinacei aliu pur-
gat, sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt
offula, quas placentulas vocant, adiectis succo a-
mygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aliu
emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nu-
cis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus an-
te coenam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio
temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amyg-
dalarum tostorum & delibratorum cyathi tres,
anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, cū
carnibus triginta caricarū. Seminis succus lac cor-
git, et magis ipsum resoluēde alui facultate donat.

Mercurialis. Cap. CLXIX.

LYnoxostis, alij qui parthenion, alij hermubo-
tanion appellant: folijs constat ocymi, hel-
xine cognatis, sed minoribus: ramulis du-
plici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis mul-
tis: fructu scemine, copioso, quandam racemorum
speciem præbente: mari, è foliorum sinu depēdente,
paruo, rotundo, cū binis testiculis vnà coherentibus:
frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in e'e-
ribus manditur, ad aluum ciendā: cocta in aqua,

LIBER QVARTVS. 202

epoto iure, bilē aquamq; detrahit. Cōstat vt mares
gignātur, hūc facere: vt fœminæ, illā, si à purgatio
ne bib. itur, et trita folia genitalibus admoueātur.

Cynocrambe. Cap. CLXX.

CYnia aut cynocrambe, cauliculum binū
dodrantum altitudine emittit, mollem,
subalbidum: folia mercuriali aut hederæ
similia, certis interstitiis subalbida: semē folijs ad-
hæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus po-
ta, aluum cient: oleribus commendantur. Ius deco-
cti & pituitam & bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium. Cap. CLXXI.

HELIOTROPIO magno flos est effigie scorpionis
caudæ, vnde scorpiuro ei nomen: & quoniā
folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Fo-
lia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, et maiora:
ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exi-
liunt, multis alis concaui: flos in cacumine candi-
dus, aut subfuluus incuruatur vt scorpionis cau-
dæ radix tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis.
Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ,
potu pituitam bilemq; per aluum extrahit: contra
scorpionum ictus ex vino potum, & illitum pro-
dest: adalligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per
horam vnā ante accessiones, seminis grana
quatuor cum vine quartanas finire: tria verò,
tertianas. Illitum semen formicantes verru-
cas pensilesq;, & thymos, & epinyctidas exic-

C c ij

DIOSCORIDIS

cat. Folia infantium destillationibus, quas syrias
seis vocant, podagris, luxatisq; vtilissimè illinun-
tur: menses cient: partus trita & imposita pellūt.
Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iux-
ta lacus, folijs, antedicto proximis, rotundioribus:
semine, acrochordonum verrucarum modo, pensile,
rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto, ni-
tro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tineas tere-
tesq; excutit. Pensiles verrucas, quæ acrochordones
vocantur, cum sale illita tollit. Scorpionides herbula
est, folijs paucis, semine caudæ scorpionis effigie.
Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

QVARTI LIBRI
FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER V.

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



Vperioribus quatuor libris, amiceſſime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguētis & earundē lacrymis ac fructibus, item animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus, necnō de omni radicū, herbarum, succorum, ſeminūq; ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de vinis & metallis, à vitæ noſtram commentationem auſpicati.

Vitis Vinifera.

Cap. I.

Folia vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant, & inflammationem ſtomachi ardoremq; cum polēta: folia etiā per ſe, vt quæ refrigerent & adstringāt, imponi ſolent. Potus eorum ſuccus dyſentericis, ſanguinē excreantibus, ſtomachicis, & gravidarū malaciæ medetur. Eadē efficiūt madefacti in aqua capreoli et poti. Lacryma vitii, quæ veluti gūmi in caudicibus cōcreſcit, ex

Cc ij

DIOSCORIDIS

vinò pota calculos pellit : illita-lichenas & psoras
leprasq; nitro prius perfrictas sanat : eadem cum
oleo sæpius pilis illitis , psilothri effectum habet :
maximeq; sanies, quam accensu sarmenta vitium
viridia exudarunt : qua & perunctæ verrucarum
infectiones extrahuntur. Cinis sarmentorum
& vinaceorum, detractis in sede condylomatis , et
thymys , illitus ex aceto medetur : prodest luxatis
& viperarum morsibus : contra lienis inflamma-
tionem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto. La-
brusca duorum generum est : alterius vva non ma-
turescit, sed flore tenuis cenanthen nominatum per-
ducit. Altera ad frugem peruenit, parvis acinis, ni-
gra, & adstringens. Folia, caules, et clauiculæ, qui-
bus repunt, vim habent cultæ viti similem.

Vua.

Cap. II.

Vva recentes aluum turbant, & stomac-
chum inflant. innocentiores, quæ decer-
ptæ diu pependere, (ideo quòd in eis copia
humoris exiccatur) vtilesq; sunt stomacho, ægrise-
que, atque cibi auiditatem excitant. In vinaceis et
ollis seruata, ori & stomacho grata sunt : aluum
sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sangui-
nem excreantibus conueniunt. Similesq;, quæ in mu-
sto fuere. Sapa aut passo conditæ, stomachum ma-
gis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua ce-
lesti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosi, ar-
dentibus & longis febribus salubres. Reconditi

vinatci inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, coeliacos, & foeminas fluxione vulvæ laborantes iuvat infusa: ad desensiones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinēt stomacho vtilis sunt: inspargitur farina tostorū, polentæ modo, dysentericis, & coeliacis, & solutis stomacho. Vva passa alba adstringentior est: prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ovo, valet ad purgandū caput: eiusdemq; gratia cum pipere commanducatur. Testiū inflammationes sedat, illita cum lomento fabarū, aut cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrenas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe.

Cap. III.

Oenanthe vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collectaque substrato lenteo, in vmbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac ciunda vrinæ vtilis. aluum sistit, ac sanguinis excretionēs: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita efficax est: capitis doloribus tam viri-

Cc iiij

DIOSCORIDIS

dis, quàm sicca, ex aceto & rosaceo persunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes agylopos, oris vlcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat, pessis miscetur, ad sistendū sanguinem: contra oculorum delacrymationē, & stomachi ardores, cum polline polentæ & vino illinitur. Cinis crematæ in testâ, candētibz prunis, facit ad oculorū medicamētâ: reduuias & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium Cap. IIII.

Omphacion, succus est acerbæ vuae, nondum maturefcentis, è Thasia uite aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur semperq; quod cervici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctuq; à subdialibus locis in lectum referre: quandoquidem nocturni rores ipsum concreescere non sinunt. Eligendum est flavum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest cōtra tonsillas, vuâ, vlcera oris, humida gingiuarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem san-

guinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & aquatiore est vtendum: valde siquidem exurit.

Vini natura.

Cap. V.

Vino vetere nervi leduntur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suavius est. quare cauendum ijs, qui intestinae alicuius partis imbecillitate sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, egrè coquitur, insomnia parit grauiora, & urinam ciet. Aetate medium, vtraque vitia fugit: quare ad victus sanorum & egrorumque usurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias inter vtrunque vire: habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distant: siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, ut mustum, turbat: sed minus inebriat, renibus & vesicae aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusque urinam expellit. nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho aduersatur: sitim stimulat,

DIOSCORIDIS

neruos infestat, aluo aptum, à valetudine se recol-
 ligentibus inutile. Passum, quod vuis sole siccatis
 in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur,
 Creticū cognomine, aut praninion, aut protropō:
 & sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion
 aut hepsēma appellant: nigra quidem, & quæ di-
 cuntur melāpsythia, crassa sunt, & corpora mul-
 tum alunt: cādidum, tenuius: & heluola inter hæc
 media, medias sortiuntur vires. Omnia tamē ad-
 stringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus
 venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, &
 vomitionibus reddita: contra cicutas, meconium,
 pharicon, toxica & concretum in grumos lac: itē
 contra renum, ac vesicæ pruritus, rosion, exulcera-
 tionesq; Inflan tamen, et stomacho aduersantur.
 Priuatim, prodest melampsythium, si venter rheu-
 matismum sentiat. Album, magis ceteris emollit
 aluum. Gypso conditum nervis officit, caput ag-
 grauatur, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra
 venena ceteris aptius. Picata, aut resinata, ex cal-
 faciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus ini-
 mica. Quæ vero aparachyta vocant, vt quæ admi-
 stam sapam recipiunt, caput implent: tumulentiā
 gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum
 male habent. Inter Italica vina Falernum princi-
 pem locum obtinet, quod inueteratum per quā
 facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstrin-
 git, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque ijs, quib;

visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros
 minime idoneum. Albana crassioribus constāt par-
 tibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emole-
 liunt (sed concoctionem non æquē adiuvant,) &
 nervosa minus infestāt: vetustate, eadem austerū
 saporem concipiunt. Cecubum, cū sit dulce, est
 & Albano crassius: corpus & colorem alit: ægrē
 tamen coquitur. Surrentinum, valde austerum est:
 quare intestinorum & stomachi fluxiones cohi-
 bet, & cū tenue sit, caput minus tentat: inuete-
 ratum suavius redditur, & stomacho vtile. Adria-
 num & Mamertinum in Sicilia æquē crassis par-
 tibus gignuntur: modicē adstringunt, & ocys-
 si-
 mē inueterantur, minusq; , ob suam tenuitatem,
 nervos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico
 sinu defertur, odoratum ac tenuius est: quare libe-
 raliter epotum fallit. diu servat ebrietatem, & so-
 porem adfert. Istricum, Paratypiano simile est, sed
 urinam vehementius pellit. Chium tamen antedi-
 ctis mollius, & aptum potui est: bene alit, & mi-
 nus inebriat, fluxiones colibet, oculorum medica-
 mentis vtile. Lesbium facile membra subit, Chio
 levius, & aluo idoneum. Ephesium eandem vim
 habet, quod Phygelites nominatur: verū Asian-
 num ē Tmolo monte, Mesogites appellatum, capi-
 tis dolores ciēt, & nervos lēdit. Coum vero &
 Clazomenium, quoniā multam sibi maris aquā
 vendicant, facile corrumpuntur: flatus movent,

DIOSCORIDIS

*aluum turbant, nervis efficiunt. Vinum omne (ut
 reliqua in commune dicantur) merum ac syncerū,
 & sua natura austerum, excalfacit, facile in mē-
 bra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiā
 ciborum inuitat, vires alit, ac robur auget: somnū
 conciliat, & commendat colorem. Potū liberalius
 auxilio est contra assumptam cicutā, coriandrum,
 pharicum, ixiam, meconium, argenti spumam, ta-
 xum, aconita, fungosue: contra serpentium morsus,
 & omnium ictus, quæ refrigerando necāt, aut sto-
 machum in vomitiones effundunt. Facit ad longas
 inflationes, rofionesq; præcordiorum, ac distentio-
 nes, stomachi resolutionem, & si venter aut inte-
 ranea rheumatismum sentiant. Conueniunt suda-
 toribus, & quibus corpus immodico sudore digerit-
 tur, maximè alba, vetera, & odorata. Quæ tamē
 vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommo-
 datiora redduntur: vulneribus, inflammationibusq;
 in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & pha-
 gedonica, & fluxionibus obnoxia, commode per-
 funduntur. Quæ marinam non receperunt, auste-
 ra & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his
 præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecu-
 bum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Pa-
 retypianum ab Adriatico sinu, & Siculum, quod
 Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Les-
 bum, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò &
 nigra, stomacho negotium exhibent, inflationem*

pariunt, corpus augment. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tentant. In media etate, vt à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Non sitire, & modice cibos proluui, optimū est præceptū. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua: si quidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus, acutorum morborū adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè post aquæ potus, utilis: nanque modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: si quidem valetudinis alicuius gratia factæ temulentie remediū adfert frigida. Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri vua, paulo ante maturitatē decerpta, triduo aut quatrinduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malacie, & crudis: in pestilentia quoq; sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellāt, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, i vinacea, quibus triginta vini

DIOSCORIDIS

metretæ extractæ fuerint calcatis vinaceis, expressæq; decocto ad tertias partes, & addito in singulos congios modi eius, qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolescit. Cõuenit ægris, quibus timemus noxam vini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare: item à longa ualitudine se recolligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo: Pares aquæ, & musti mensuræ coquuntur molli igne, donec absumatur aqua. quod ubi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Alij marinæ, & celestis aquæ, mellis et musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syriuestri vva nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris, quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum melitites. Cap. VI.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: nanque aluum leuiter emollit, urinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è vino uetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quò ma-

gis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; efferuere desierit, in alia nasa transfunditur.

Mulsum.

Cap. VII.

Mulsum è uetere uino austeroq;, & bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum uenit. Vetus corpus alit: media etate, aluo prodest, urinã pellit: à summo cibo sumptum nocet: & inter initia potum, implet dein appetendi auiditatẽ reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, admista una mellis. Aliqui, quò celerius præberi possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruētis, unũ mellis adiiciunt et ubi ferbuerit, uase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa.

Cap. VIII.

Aqua mulsa ea sdem quas mulsum uires possidet. Cruda utimur, cum moliri deiectionẽ, aut uomitionem incitare uolumus: ut ijs, qui uenena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentes pulsus, quos illi dicere mycrosphyctos, tussientibus, peripneumoniacis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditiuumque, quod aliqui hydromeli propriè uocant, media etate adynamo uino, aut lora in recreandis uiribus, respondet; & similem uim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamen

DIOSCORIDIS

usus damnatur, inflammatis, aut cōstrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit, duobus pluuie aquae veteris ad vnam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adiiciunt, ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt, qui hydromeli appellent, quod à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meracius confieri conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

Cap. IX.

DE aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, coelum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syn-cera: nullius omnino qualitatis particeps, & quae ne minimo quidem tempore in praecordiis commoratur: ad haec, quae & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aluum enim conturbat) pituitam expellit. Si vero calida ad fetus adhibeatur, elicit & discutit: nervorum vitijs, & pernionibus, antè ulcera prodest. Miscetur cataplasmati ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmati. Ad mouendas deiectiones tepesfacta infunditur, & ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lendes, & mammas rigentes

tes, fœueri vtile est: liuores fotu discutit: ad venenatos ietus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maximè scorpionum, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in calidâ descendat, auxiliatur. Et malo habitu confestis iâ diu corporibus, neruisq; balneæ ex ea vtilis: hydro picos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mixture reposita, virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem, dant gallinæ aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniâ.

Thalassomeli.

Cap. X.

QUod thalassomeli vocatur, vehementer purgare cõstat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato vase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adiiciunt, & vase condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

Acetum.

Cap. XI.

ACetum refrigerat, & adstringit: stomacho vtile, & appetentiam excitat: erumpentem vndecunq; sanguinem, potu in se sive sistit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis vulneribus inditur & inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum: reprimat

D d

DIOSCORIDIS

procidentia sedis, vuluæq; item abscedentes gingi-
uas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem
sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines,
pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. phas-
gedenas vlcerum, nomasq; fotu continuo cohibet:
podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur.
fugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capi-
tis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut
spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, graui-
tatem aurium, & sonitus, sibilosq; feruentis va-
por proficit: instillatum quoq; aurium vermes ne-
cat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta aceto
spongia admouetur, & pruritus permulcet. Con-
tra venenatos serpentium ictus, qui refrigerando
nocent, calidum commodè fouetur: & frigidū ijs,
quæ exurens virus ei aculatur. Calidum potū, atq;
vomitionibus redditum, aduersus oīa venena effi-
cax est, præsertim contra meconium, & haustani-
cicutā, conglobatum in ventre sanguinem, lac coa-
gulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale. Hau-
stu voratas hirudines, si sorbeatur, eijcit: tussim
veterem mitigat, & recentem laceßit. In ortho-
pncea calidum cōmodè sorbetur, gutturis fluxiōes
gargarizatum inhibet, anginis & vuæ procidēti
conuenit: contra dentium dolorē, calidū colluitur.

Acetum mulsum. Cap. XII.

A Cetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc
modo temperatur: Aceti heminas quinque,

LIBER QUINTVS. 210

salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atq; vbi refrixerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ, quam sepa vocant, haustum meconium, ixiāmue, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. Cap. XIII.

Acida muria, quam Græci oxalmen vocant, contra nomas fotu, putrida vlcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus inijciatur, & procidua sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat: furfures & manantia capitis vlcera exterget.

Thymoxalme. Cap. XIIII.

Thymoxalme veteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articulis morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo factitatur: Thymitriti acetabulum, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguae portiones in vas coniiciuntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo subdio madescunt.

D d ij

DIOSCORIDIS

Scillinum acetum. Cap. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ can-
dida fuerit, expurgata conciditur, traiecta q; li-
no segmenta modicis intervallis, ne se contingant,
siccantur in umbra quadraginta diebus: mina eo-
rum in aceti boni sextarios duodecim immergitur,
et vase diligenter operto septenis diebus in sole ma-
descit: post eum numerum dierum scilla eximitur,
& expressa abijcitur: defecatum acetum trāsfun-
ditur, & reponitur. Aliqui scillæ minam, quinque
aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem re-
purgantes, parem mensuram adijciunt, & senis
mensibus macerari patiuntur. Id multo magis hu-
morum lentitias digerit: gingivas humore prægnā-
tes collutione stringit firmatq; , & motos dentes
stabilit: putredines oris, & graues halitus tollit:
durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem
expedit, & limpidam canoramq; reddit. Datur
stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melēcho-
licis, comitialibus, vertiginosis, mente captis: item
vulvarum strangulationibus, lienis incremento la-
borantibus, ischiadicisq; . Ambecillos admodum re-
creat: corpus sanum reddit, & bonum colorē præ-
stat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque
aurium infusione purgat. In summa, ad omnia ef-
ficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationi-
bus, in capitis dolore, aut nervorum vitijs. Datur
quotidie ieiunis sorbendum, inter initia exiguum,

paulatim adaugendo, ad cyathum vsq;. Nonnulli
binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. Cap. XVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, uti
dictum est, scillam, & sole siccata[m] contundi
to, minam eius tenui cribro incernito, & linteo ra
ro illigatam, in vicanos sextarios musti recentis ac
boni demergito: vbi trimestri spatio maduerit, elu
triatum vinum, obstructo diligenter vase, recondi
to. Licet quoq; sic humida scilla uti: In orbiculos,
rapi modo, dissecta duplicato pondere, quadragin
ta diebus in solari oportet, & valde inueterascere.
Alia parandi ratio: Scillæ dissectæ & repurgatæ
tres minas, in Italicam metretam musti demittito
& senos menses in vase obstructo macerari sini
to: post id tempus defecatum & excolatum vini
recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum
corruptiones: item ijs, qui reuolunt cibum, & si
pituita in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lie
nosis, malè habitis corporibus, aquæ inter cutem,
regio morbo, difficili vrinæ, torminosis, inflationi
bus, resolutioni neruorum, horroribus longis, verti
ginosis, & vulsis. Menses pellit, minimeq; neruos
infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus
in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Marina vina. Cap. XVII.

Marina variè factitantur: Aliqui enim sta
tim quum deceptæ sunt vna, aquam maris
D d ij

DIOSCORIDIS

admiscent. Alij in area vuas sole seccant: quibus calcatis, marinam adiiciunt. Alij passas prius vuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quae tamen austiore gustu temperantur, contra februm aduentantium indicia valent, si modo meliora non adsint. aluum subducunt: prosunt purulentis extusis, aut si dura aluus exerceat. Quae ex Amineis vuis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatu creant. Verum quo plenior habeatur historia, is, qui, huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quaedam ex is factitia, minoris curae ac impendij, quae cadunt in usus: uti quae ex cotoneis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites. Cap. XVIII.

CYdonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo sciuntur, et duodecim minarum pondo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defecatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum pressorumq; adicere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteriae, hepaticis

renum vitij, et vrine difficultati. Melomeli, quod
 & cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mala fe-
 minibus suis castrata, in quàm plurimum mellis,
 quo penitus demersa contegantur, coniunguntur: id
 post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat
 eadem, quæ superior compositio.

Hydromelum. Cap. XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ,
 et sub Caniculæ sydyus insolatæ, additis ad unā
 melomelitis factis ex cotoneis. Vis huius eadē est.

Omphacomelites. Cap. XX.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acer-
 bæ uuæ adhuc immature, & tribus diebus
 insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes
 mellis optimi despumati singule partes adijciun-
 tur, & insolatur in uasa transfusum. Vim repri-
 mēdi ac refrigerādi habet: stomachicis celiacisq;
 conuenit. Vsus post annum est.

Apijtes. Cap. XXI.

Fit & è pyris, perinde atque cotoneis, uinum,
 Apijtes nomine sed ita ut pyra non magnopere
 maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, si-
 mili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba
 sunt, & adstringunt: stomacho utilia sunt, atque
 intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. Cap. XXII.

Fit è seraci uite syluestri, quod uocatur oenan-
 thinum: Sicci flores minis duabus musti ca-

DIOSCORIDIS

do macerati: post triginta dies mutatur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatē, cibi fastidia, coeliacos, & dysentericos.

Rhoetes. Cap. XXIII.

F It ē punicis malis maturis quod rhoeten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocāt, ac decocti ad tertius, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuio exortam: stomacho utile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites. Cap. XXIII.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum uinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febre carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli uocant, quod arteria scabritijs conuenit.

Myrtites. Cap. XXV.

MYrtites fit, baccis nigris, quae maturitatem exceſſerint, tufis, & organo expressis. Alii qui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aque heminas adiiciunt, & uini ueteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-

re adstringit stomacho vtile, fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas vlcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites.

Cap. XXVI.

MYrsinites sic temperatur: Rami nigre myrti cum suis baccis & folijs tusi, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra fursures, vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

Cap. CXXVII.

Lentiscinum similiter vt myrsinites temperatur: nec secus terebinthinum. Nanq; bacciferi eorum rami sumi debent: Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicæ, & stomachi, & sanguinis profluvio: vlcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vuluæ ac sedis in seissione cohibent.

Palmeum vinum. Cap. XXVIII.

Palmulas maturas, quas vocant chydeas, in vrceolum imo pertusum, & obstructũ picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatũ, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq;

DIOSCORIDIS

cōgios infudisse satis est: post decē dies detractō ab arundine linteo assumito vinū crassū et dulce, et reposito. Suave illud quidē, sed capiti noxiū: contra fluxiones, propter adstrictoriā vim, efficax: stomachicis, coeliacis, sanguinē expuentibus cōuenit. Aliqui idē addita aqua iterū capūt, et tertio, quarto, quinto, sexto ue, faciūt: quod tandē acore viuiatur.

Catorchites. Cap. XXIX.

Catorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum. sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adiiciunt, in quo recēter pressa vinacea maduerint. Caricæ, quæ chelidoniæ aut phœniceæ appellantur, præsertim nigra, macerantur, uti diximus, & post decē dies humor excipitur, atq; iterum aut tertio, idem modus aquæ, in qua vinacea maduerint, infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorē contrahit, & aceti vsum præbet. Id tenue est: flatu gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit: aluo tamen prodest, urinam ciet, menses trahit, lactis vbertatē facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio, quam zython appellamus. Aliqui sex amphoris, decē salis sextarios adiiciunt. Alij murie amphoram: quod nō facile vitiat, & aluo idoneum fore censent. Alij thymū & fœniculū imo subiiciunt, & caricæ superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & è sy

LIBER QVINTVS. 214

comoris eodem modo vinum, sed in acetū acce dege-
nerat: quoniam non ita præualet vis eorū, vt fluen-
tis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum vinum. Cap. XXX.

Resinatum vinū populatim factitari solet:
copiosum in Galatia: quoniam vinū illic coar-
cescat, vna non maturescente, ob cœli algorē, nisi
picea resina tēperetur. Resina aut cum cortice tur-
ditur, et amphoræ dimidiata hemina permiscetur.
Aliqui, vbi efferbuit, excolant, separantes resinā:
alij relinquunt. Hæc vina vetustate dulcescunt. Om-
nia capitis dolorē, & vertigines faciunt: concoctio-
nem tamen adiuvant, & vrinā cient: tussientibus,
ac destillatione vexatis conueniunt: itē cœliacis, dy-
sentericis, et hydropicis, et fœminis fluxione vuluæ
laborantibus: altis exulcerationibus infunditur. In
hoc aut genere nigricans magis albo constringit.

Strobilites. Cap. XXXI.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis,
recentibus, fractisq; præbetq; resinati effectus.
Si quis madesactas nucas pini musto decoquat: po-
tū affatim cōuenit ijs, qui tabitudine cōficiuntur.

Cedrinum vinum. Cap. XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, lauri-
num, pineum, aut abiegnum, simili ratione
fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt,
aut Soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet,
vti consudent, congioq; vini minam vnā permi-

DIOSCORIDIS

scere, & post duos menses transfundere, & antea
quàm recondantur, insolare. Factitiorum vinorum
vasa impleri debent: nanque non plenis vasis, vina
in acorem corrumpuntur. Medicata autem vina,
rectè valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt,
urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen
vehementius excalfacit. Fit quoque è fructu cedri
maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum bac-
carum selibra: diebus quadraginta insolari debet,
& defecatum in vasa transferri.

Fit etià vinum è baccis iuniperi, non aliter quàm
cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo
fit: Cedrià dulci aqua lavant, & singulas ampho-
ras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent.
Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussi antiquæ
utile sine febre, pectoris laterumq; doloribus, tormi-
nibus ventris, & interaneorum ulceribus, purulentis
excreationibus, mulieribus vulvæ causarijs, hydro-
picijsq; facit adversus ventris tineas & horrores:
contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat:
aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. Cap. XXXIII.

Picatum ex liquida pice et musto temperatur.
Picem aut primum marina aut muria tantis-
sper eluere oportet, dum in albuerit, & syncera ma-
ris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda: cōgijs
octo musti, uncia picis una aut altera adijcitur:
ubi efferbuerit, & constiterit, in vasa diffunditur.

LIBER QUINTVS. 215

Hoc genus vini excalfacit, cōcoquit, purgat, abster-
git: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis et
uulnæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exul-
cerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs,
cōcoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præ-
sertim in succida lana impositum.

Absynthites. Cap. XXVIII.

Absynthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui enī
duodequingenta sextarijs Italicarū am-
phorarum, admistā absynthij Pontici libram deco-
quunt ad tertias: et vbi infuderint sex aceti sexta-
rios, & absynthij selibrā, ac diligenter permiscue-
rint, diffundunt in vas: dumq; conquieuerit, defe-
cant. Alij absynthij minā in amphorā demittunt,
tusamq; & raro linteo deligatā, in cado musti ma-
cerant, binis mensibus. Alij absynthij quadrantē,
alij trientē, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ,
floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarum singu-
los sextantes iniiciunt in metretrā musti, & tun-
dentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis,
ternisue mensibus dimittunt: postea defæcatum vi-
num transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti
cadum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, et
absynthij drachmas quadraginta, linteo inuolu-
tas: & post quadragesimum diem elutriāt. Alij in
senos sextaros musti, absynthij librā, & siccæ pi-
ni resinæ sextantem immittunt, & post decē dies
excolant, & recōdunt. Vtile est stomacho: vrinam

DIOSCORIDIS

cit: tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum vitij auxiliatur: fastidia discutit: ijs prodest, quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam precordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; ventris tineas, & remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quæ plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites. Cap. XXXV.

HYssopites è Cilicio hyssopo maximè laudatur, fitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti cõiecta, linteolo raro cū quibusdam lapillis, folia involuuntur, vt degravatus pondusculo fasciculus sidat: vinū post quadraginta dies defecatū elutriatur. Contra pectoris, laterū, & pulmonis vitia, veterē tussim, & suspiria prodest: vrinam cit, torminibus, & horroribus febrīū circuitu repetētibus auxiliatur: menses movet.

Ex diuersis plantis factis.

Cap. XXXVI.

Simili modo chamædryites fieri solet. Excalfascit, discutit: conuulsis, regio morbo, vulue inflationibus, tarde cõcoctioni, incipienti aque inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stœchadites nō secus temperatur. Congijs sex, stœchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes laterum, nervorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè datur, cum pyrethro

& sagapeno. Fit ad eadem acetū ē stœchade her-
 ba, vt paulò antè diximus, aceto macerata, quod
 eosdem implet effectus. Fit vinum ē betonica, quā
 cestron psychotrophon appellant. Herbam semine
 maturo pregnantem, cum suis ramulis minae pon-
 do, congys duobus vini macerant, & post septi-
 mum mensem transfundunt. Ad multa intera-
 neorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vni-
 uersum dicatur, factitia vina, sibi misturam vires
 adsciscunt: quare non difficile fuerit ijs, qui illa-
 rum naturas norint, vinorum vires cōiectura qua-
 dam consequi: veruntamen vinorum vsus febrici-
 tantibus abdicandus. Fit etiamnum ē betonica ace-
 tum, ad eadem vitia vtile. Tragoriganites fit
 quaternis tragorigani drachmis linteolo colliga-
 tis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post
 tertium mensem transfusis. Prodest torminibus,
 vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursu-
 sationi, egris concoctionibus. E napi fit vinum, no-
 mine bunites, drachmis duabus tusi napi in sexta-
 rios duos musti additis, & ceteris eodem modo fa-
 ctis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut lon-
 go equitatu fatigatis. Dictamni drachmas qua-
 tuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit ad-
 uersus stomachi fastidia: menses, & purgamen-
 tum à partu subducit. Marrubij adulti folia tun-
 dito, & sextarios octo in musti metretam demit-
 tito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc

DIOSCORIDIS

vinum pectoris vitūs, & omnibus, quibus marrubium. Thymi tusi & cribrati uncias centū linteis colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra egras coctiones, fastidia, dysenteria, nervorū & precordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo est satureia vinū fit, quod eadē quæ thymites præstat. Sic quoque origanites ex heracleotico origano conficitur cum supradicto Facit eadem quæ thymites. E calaminta, pulegio, & abrotono vina sunt eodē quo thymites modo prosunt stomachicis, cibū fastidientibus, et regio morbo: quod urinā moveant. Fit itē conyza vinū, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites. Cap. XXXVII.

Aromaticis ita fit: Palmæ, aspalathi, calami, nardi gallici, singulorū quatuor sextarios sumito: postquam contriveris, passo subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde ubi fæce expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami uncia, phidrachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi Syriacæ drachmæ sex, cassiæ uncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinque, asari drachmæ quatuor: omnia simul trita & linteis colligata in cadum musti demerguntur, & postquam vinū deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum,

rum, & pulmonis dolores: difficile vrinae, horribilibus, retardatis mēſibus, atq; ū, qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita craſſitiem extenuat: colorem alit, ſomnum cōciliat, dolorem finit, renum & veſicæ vitijſ auxiliatur.

Ex diuerſis odoramentis facta.

Cap. XXXVIII.

FIt & vinum ad deſtillationes, cruditates, tuſſim, inflationes, et ſi humor in ſtomacho coſt: Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ ſex, aniſi drachmæ tres: omnia plenius tuſa & linteolo inuoluta in ſex vini ſextarios conijciuntur: vinum poſt triduū colatur, & in lagena reconditur. Datur poſt deambulationem, meraculum, cyathi vnius meſura. Fit quoq; nectarites ex helenio herba: Radice ſicca pondo quinq; drachmarum linteolo colligata, & in congios ſex muſti addita, & poſt tres meſes effuſa. Facit ad ſtomachi et pectoris vitia: vrinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabathroq; vinū factitatur, hac ratione: Singulorum ſelibrā in binos muſti congios mittito, poſt meſes duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinū efficax eſt contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinae difficultatem: prodeſt ſtomachicis, atque ūs quos pallor decolorat. Alij vnciā, aut ſextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem, in muſti amphoram adiijciunt. Aſari quadran

E e

DIOSCORIDIS

tem in senos musti sextarios itidem demittito. Id uini genus urinam ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radicis syluestris nardi recentis & tritæ cribratæq; bessem, in congiū musti conijcito, duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urina, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis factis.

Cap. XXXIX.

Radicis dauci cōtusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, et similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ menses pellit, ruclius ciet, et urinam: prodest tussi, ruptis, vulsiq; Saluie vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti coniugium mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, cōtusis, ortopnoæ: lienis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vinea ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congios mittere, tribus mēsi bus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vri-

LIBER QUINTVS. 218

nam mouent. Seminis apij recentis, maturi & cribrati vncie nouem in linteo colligatæ in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat stomachicis, et difficili urine auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex fœniculo, anetho, & petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fit & è flore salis uinum, multò ad purgandum efficacius, quàm uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicæ, renes, & stomachum infestat: quare neq; in secunda, neque aduersa ualetudine prodest. Fit etiam uinum quod phthorion uocant, quoniam partus necat, et abortus facit: veratro, aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices vitiû sato: si quidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Ad uinû partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè uouerunt, cyathorum octo mensura, dilutû. Ramorum thymelææ cum suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in congius tres musti, & leui igne coquito, donec cõgj duo supersint, defecatûq; recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absunit. Chamælea dum floret, cum folijs tusa et cribrata decem drachmarum pondere, in musti cõgiû additur. Post duos menses uinû in uas transfertur. Aquæ inter cutē, hepaticis, et lassitudine cõfractis, efficax est: iis mulieribus, q̃ à partu egrè purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadem conueniens: urinam quoque ciet. Librum radice mandragoræ concidito, segmenta lino traicito,

E e ij

DIOSCORIDIS

quod selibram & quat in musti cadum demittito, ibiq; esse finito ad menses treis, deinde transfundito. Media potio, hemine dimidium, bibitur, passo in duplū addito. Aiunt heminam vini congio mistā, potu soporem adferre: cyathus vnus cum sextario vini potus, enecat: mediocris usus eius, doloris sensum aufert: fluxiones inerasat: olfactu, potuq; & cum inditur, idem præstat. In cōgium musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri ueratri triti in linteo mundo, mittito: dumq; efferbuerit, in marinæ aque congios quatuordecim aut quindecim, ubi pleniuscule fregeris, inijcito: post aliquot dies colato, & utitor. Dato cyathū unum ex aqua balnei in potu, ad aluū soluendam, ijs qui euomuerunt à cœna. Alia ratio: Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias duodecim, spice Syriacæ uncias tredecim, cribratas, & linteo colligatas in septem uini Coi sextarios diebus quadraginta macerandas indito, postmodū colato: dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Decocte marinæ aque ex alto petite sextarios duodecim, ueratri cāldidi libras sex, in musti amphora quadagesimo die, quāmadefeceris, colato, & utitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas, in senis musti sextarijs diebus quinisdenis macerato, mox colato & semestri exacto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uuas in sole siccatas imposito in musti metretam (implet

LIBER QUINTVS. 219

autem metreta cōgios duodecim) & gypsum in uinum mittito ponilo drachmarum uiginti, et biduo residere finito, conijcito ueratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorū drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos et trientem, myrrhae & croci singulorum drachmam, inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis heminas tres aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu foeminas: foetus extrahit, contra strangulatus uuluae efficax. Scammonites sic fit: Radicis scammoniae per messes effosse, trite, & linteo colligatae drachmas quinque in musti congium mittito, ad dies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

Metallica omnia, & primūm

Cadmia. Cap. XL.

EX cadmiae generibus optima est Cypria, bostryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatē magis declinans, racemosa facie, colore spodiū, quae fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, iuentis uenarū discursibus, onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt, quae è ueteribus metallis effodiuntur. Quaedam etiam placodes, id est, crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quae testaceam faciem habet, terram amplexa

E e iij

DIOSCORIDIS

est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, vtilis: reliquæ ad emplastra, & farinas, quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia uero, Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua expleare, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus infarcire, excrescentia in carne coercere, crustas creare, & ulcera, quæ cacoethe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus cādente, fuligine egesta flatu, & lateribus camerisq; fornacum inherente. Prægrandes autē ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia conuexæ & cōcameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, et inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in corpus concrescunt, & modo genus unum eius, modo duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato lapide, cui pyritæ cognomen est. in quo etiam monte quædam quasi uenæ chalcitis, misyos, soreos, melæterie, cœrulei, chrysocollæ, atramēti sutorij, diphrygisq; inueniuntur. Nec desunt, qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi quadam lapidum cognatione. qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullam sui uim ostendens. Si eo deprehenduntur, quod sunt cadmia leuiore, nullumq; alienum mandentibus saporem exhibent: commanducatus

item lapis dentes offendit: cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, proflit, & fumum igni similem eiaculatur: cadmia vero quieta manet, fuliginemque luteo colore aut aereo splendentem expuit, uario sonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet: sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda aeraria. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: mox extinguatur uino Amineo, quae ad emplastra preparatur: sed quae ad psoriarum medicamenta preparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, rursumque fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur: iterumque tritam ex uino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiae retinens: hac spodij vice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

Cap. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodios nigricat, & ple-

E e iij

DIOSCORIDIS

runque ponderosior est, palearum pilorumq; plena,
quasi purgamentum quoddam, quod ab arariorū
officinarum pavimentis & fornacibus euerritur:
pōpholyx uero pinguis est, & candida, usque adeo
levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerūt
genera: unum ad aeris colorem uergens, subpingue:
alterum magnopere candidum, summamq; leuita-
tem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in
perficiundo ære fabri præstantiorem facere uolen-
tes, detritam cadmiam cumulatiùs insparserint.
Nanque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pom-
pholygen coit. Ceterum pompholyx nō ex æris mo-
do materia, et fabrilī industria factitatur, sed ex
cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximiè folli-
bus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est: In do-
mo gemina cōtignatiōe operta, fornax extruitur,
iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à
supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci
proximus, tenui foramine ad fornacem usque per-
foretur, ad excipiendam follis narem: ostium me-
diocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabri-
catum: domuncula altera huic cōiuncta sit, in qua
& folles, & flator suo munere fungātur: deinde
carbonibus in camino succensis, assidens artifex
cadmiam particulatim fractā inspargit, à locis su-
pra infurnibulū extructis: idem negotium obit in-
fernè artificis minister, simulq; carbones adiicit,
usque dum indita cadmie copia prorsus absumat

tur. Itaq; egesta suffitu tenuis pars, & levis mate-
 rie in summā domum euolat, et parietibus, tectis,
 fornicisq; adhærescit. cōflatum aut inde corpus, in-
 ter initia erūpentibus, aquarum bullis simile pro-
 dit, postea maius incrementum capeffens, glomuscu-
 lis uellerum simile redditur. Ponderosius autem in
 ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur,
 illud domus pauimento coheret. Quod tenuiore
 deterius existimandū est, ideo quòd multum terre
 collegerit, & spurcitia in aceruatione refertur.
 Sunt qui hoc modo tantū fieri spodium arbitran-
 tur, de qua antè dictum est. Optima creditur Cys-
 pria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colo-
 re aliquantū piceo, sapore cœni horrido: & si fra-
 dem non experta, flagranti carbone inferuescit,
 aereum colorem contrahit. Antedictis aut notis di-
 ligenter attēdendum est. Siquidē à nonnullis adul-
 teratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut mari-
 no, aut crematis grossis, et quibusdā consimilibus.
 quod facile cognitu fuerit, quippe nihil in ijs pro-
 bādis inuenietur eorum quæ antè dicta sunt. Pom-
 pholygem in commune ita lauari oportet: Ligatā
 linteo mundo modicēq; raro, aut siccam, aut aqua
 respersam, in labellū demittito, quod imbrem conti-
 neat, & huc atq; illud fasciculū deferens, immer-
 gito: ita enim limosa pars eius ac utilis, effluet, &
 omne sedimentū in linteolo remanebit. Postea resi-
 dere sinens, aquā cum cinere colis incernito, & no-

DIOSCORIDIS

nam infundens, agitato, & effundito: mutata tan-
tis per aqua, et colata, dum arenosi nihil fidat. De-
mum aquam exprimito, & siccatum cinerem re-
condito. Alij quantũ maximè fieri potest, siccant,
& manibus in aqua conterunt, dum mellis crassa
mentum imitetur: deinde luteo faucibus excepturi
vasis obteto, aut laxius illigato, colant, & quò fa-
cilius transeat, infusa per linteum largiore aqua,
cinerem conturbant: mox spumofum, quod traie-
ctum est, & supernatat vasi, concha excipiunt, et
fiēt ili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit,
sensim cribratum, in aliud vas transfundunt, reli-
cto arenoso, quod pessum ierat: rursus lapidosa si-
dere patiuntur, & in vas aliud excolant: hoc idem
idem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers
inueniatur. Alij paulatim integram in aqua re-
spargunt, arbitrati arenas lapillosq; suo ponduscu-
lo degrauates, pessum ire: pilos aut & paleas leui-
tate sua in sublime attolli. Ceterum cinerem me-
dium separant, & in pilam coniectũ, ut cadmiã,
eluant. Quinetiã lauatur uino Chio marina aqua
diluto, modis, quos suprã diximus: & ita redditur
adstringētior, quàm aquis elota. Vis pompholygis
adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstrue-
re, & aliquantum exiccare. Inter medicamēta nu-
meratur, quæ leniter crustas obducunt. Quod si spo-
dion torrere libet, diligentior tritam, & irrigatam
aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis le-

uibus prunis, orbiculos continuo uersabis, dum as-
 siccati fuluescant. Neq; ignorandum, ex auro, argē-
 to, plumboq; fieri spodion: uerum post Cyprium,
 plumbeum maxime commendatur. Quoniam spo-
 dios sepe numero desideratur, necesse est ostendere,
 quæ simili uirtute polleant, ut in spodij locum suf-
 fici possint, antispodia uocāt, quoq; modo sumi de-
 beant. Folia itaque myrti, cum floribus, & baccis
 immaturis, in fictile crudum coniecta, indito oper-
 culo continua foramina habente, uruntur fornaci-
 bus, donec figlinum percoquatur: iterum in fictile
 aliud crudum transferuntur, quod ubi perassatum
 fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoque fit
 è termite syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, sa-
 tiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis,
 & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis lin-
 teolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in
 sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco,
 ænanthe, aut mollibus rubi folijs, uel è buxi coma,
 uel pseudocypereo cum flore. Alij ficulnea frondes in
 sole antea siccatas, eodem modo parant: alij tauri-
 nū gluten: alij succi las lanas asperas, pice aut mel-
 le irrigatas, quæ omnia in spodij uicē usurpātur.

Aes ustum.

Cap. XLII.

AEs ustum probatur rubrum, & quod con-
 tritu colore cinnabarim imitetur: nigrum
 uero plusquam deceat exustum est. Fit autem è
 clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis:

DIOSCORIDIS

subperso sulphure cū sale pari, omnibus uicissim
insparsis, fictile circumlito figulari creta spiramen-
to, fornacibus inditur, donec figlinū percoquatur.
Quidam pro sulphure & sale alumen inspargūt.
Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt.
Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excu-
tiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphu-
re & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla
aceto respersos urunt, & iterum ac tertio idem ef-
ficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet,
in Memphide combustum: proximum in Cypro. Ad-
stringit, exiccat, reprimit, extenuat, attrahit: ulce-
ra purgat, & ad cicatricem perducit: uitia oculo-
rum emendat, excrementa in carne consumit, no-
mas cohibet, uomitus ciet, cum hydromelite potū,
aut cū melle delinctum, illitūmue. Lauatur ut cad-
mia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus
sordes emergat. Aeris recrementum, stercūsue quā
scoriam uocant, eodem modo lauatur: & eandem
uim, sed imbecilliolem, habet.

Flos æris.

Cap. XLIII.

Flos æris, quem nonnulli clauorum ueterū psege-
ma, quasi resegmentum aut segmentum, nomina-
runt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, mi-
li effigie, & numero, breuis, ponderosus, modicè
splendens, atq; constringens, qui delinatam æris
scobem nō recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id fa-
cile deprehenditur, cū dentium illisu dilatantur ra-

menta. Fit autem, cum æs fornacibus fusum, in receptacula delabatur, per cola fistularum ad ea pertinentium: tum huic negotio addicti ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt. refrigerandi proposito: itaq; repentino concretu, ac addensatione, uelut expuitur, & erumpit antedictus flos. Adstringit & excrescentia coercet: offusam oculis caliginem emēdat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem extrahit: carnosam narium & sedis uitia absomit. eruptiones papularum cum uino cohibet. Candidus contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulā flatu impellitur: uiam, tonsillasq; reprimit, farina eius cū melle admota.

Squamma æris. Cap. XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cypris officinarū clauis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est clauaris, nominatur, sed ex uili promiscuoq; ære, aut candido, uitiosa intelligitur: quam utpote tenuem, et inuolidam damnamus, maximè approbantes crassam, rufam præsertim si aceti respersu æruginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coercet, ulcera ad cicatricem perducit: pota ex aqua mulsa, aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorū medicamenta, quòd genarum scabritiam absomit, et fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo: Sicce æris

DIOSCORIDIS

squamme expurgate selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pessū ierit: abiicitur quod subsidit et effusa aqua, hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta manu, squamma quasi destringenda sit, vehementer confricatur: dumq; lēto rem emittere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terendo ualide: squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur: quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamēta cum primis efficax. Inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam excernant, & linteo apertum biduo cōquiescere sinitur, effusaq; extante aqua, ubi siccatum erit, recōditur pyxidicula. Alij ut cadmiam lauant, & reponūt. Squammæ ex acie aut mucronibus decussæ, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad molendam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis. Cap. XLV.

Aerugo rafa fit his modis: In cadū, aut aliud cōsimile uas acetum quā acerrimum infunditur. superponitur inde inuersum æneum uas, præsertim concameratum: sin minus, planū: sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum: exempto, quo doliolū obturaueris, operculo, decimū post diem insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in

LIBER QUINTVS. 224

cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidē post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina una plurē sue, uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetiam ex delimata æris scobe æruginē facere licet, necnon è laminis, quibus bractea auri conclusæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per Caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidē, & boni coloris, sed uitiosam, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterāt. aliqui pumice admisto, alij marmore, alij tramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem aut marmor, dum pollice sinistræ manus madefacto, æruginis pontunculam altero atterimus: si quidem eam diffundi constat: marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin & dentiū appressu, si quidem sincera cedit, leuis, & sine asperitate. Atramentum uero sutorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id, quod atramentum sutorium

DIOSCORIDIS

acceperit: quod id uſtum ſuapte natura talem ſortitur colorem. Aeruginis, quam uocant ſcoleciam, duo ſunt genera: quædam foſilis eſt, altera factitia ad hunc modum. In mortario Cyprj æris dimidiam heminā aceti albi acrisq; piſtillo cupreo conterito, donec ſtrigmenti craſſitudinē imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum ſalis foſitijs, tranſlucētis, aut marini quàm albiſſimi, ſolidiq; aut certè cum nitri pari pondere terito in ſole, æſtuoſiſſimis diebus, ſub ſyduſ Caniculæ, donec colorem æruginis contrahat, et concretu ſtrigmentofum fiat: ubi autem ſe in uermiculorū Rhodiæ ſimilium ſpeciem coegerit, recondito. Efficax & ualde boni coloris redditur, ſi duas partes urine ueteris cum una aceti adieceris, & alia, quæ dicta ſunt, perageris. Sunt qui æruginem raſilē, quæ in apparatu non reſpondit, gummi miſto digerant in formas, & ita uendant: quod genus, ut uitioſum, improbatum. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario & piſtillo Cyprj æris, cū urina pueris impubis, qua aurum ferrumināt. Antedicta æruginem genera, uſto æri omnino reſpondent, ſed magis effectu ualēt. Sciendum foſilem ſcoleciam præſtantiffimam eſſe: deraſam ſequi: poſtremo loco factitiam. Mordaciſſima tamen eſt hæc, & magis adſtringens. Aurificum autem ærugo raſe reſpondet. Aerugines omnes adſtringunt, extenuāt, excalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, lacrymas

LIBER QUINTVS. 225

erymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. Vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricem perducunt: callos & sordida vlcera purgant, cum melle coctæ. callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyrij modo in eas adactæ. Ad gingivarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illitæ: verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina exceptæ, cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quancunque velis, minutissimè fracta comminutaq; in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturque donec se mutet, & colorem cinereum cōcipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eā vrant, vti dictū est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. Cap. XLVI.

Rubigo ferri restringit: sistit foeminarum profluvia, admota, potūque præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquā utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterigia: condylomatis prodest, gengivas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquæue, in qua cadens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoriam vocant, eadem post quæ rubigo, sed inefficax

Ff

DIOSCORIDIS

cins. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum. Cap. XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquam injiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteolo deinde colato, aqua superfundens, quò facilius quicquid est resolutum incerni possit. Hoc iter facito, usquedum satis tibi habuisse videatur. Vbi confederit, priore aqua effusa, novam adiciens, ut cadmiā lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quaesitā, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cū aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam tritum vehementer, cerussa, simile redditur. Alij elimatae scobi modicā, plūbaginem adijciunt, affirmantes ita elotum plumbū præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire explere cana, sistere oculorum fluxiones, et vlcera excrecentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis vlcera, condylomata, & hemorrhoidas, ex rosaceo: itē ad ea, quæ egre cicatricem ducunt: et in torū spodij effectus præbet, nisi quòd nō obducit crustas. Syncerum plumbum affrictu, marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

V Plumbum vstū. Cap. XLVIII.
Ritur plumbum sic: Super quā tenuissimā

LIBER QUINTVS. 226

mas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur
 inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interie-
 cto semper sulphure, vsquedū vas expleueris, suc-
 cendit o flagrante autē plumbo, ferrea rude versa-
 to, donec perfectē redigatur in cinerem, nihilq; ē
 plumbo non vstū haerit: tum demum, obstructis
 naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius
 sentitur: Aut elimatam plumbi scobem in olla sul-
 phure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictū
 est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes
 operculū, dato exili spiramento, vrunt. Alij pro sul-
 phure cerussam aut hordeum inspargunt. Alij inte-
 gras laminas imponentes, acri igne vtuntur, et ru-
 dicula ferrea continuē mouent, dum in cinerem sol-
 uantur. Sed difficilis huiusmodi vstio: & si vehe-
 mentius vratur, contrahit spumæ argenti colerē.
 Magis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plū-
 bum vstum lauatur vt cadmia, & reconditur.
 Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed
 multo acriores. Recrementum plumbi, quod scoriā
 vocant, optimum est, densum, fractu contumax, ce-
 russam planē representans, nihil plumboſi habēs,
 quod a luteum calorem accedit, & vitri splendo-
 rem imitatur. Eadem, quæ plumbum exustum, pos-
 test sed magis adstringit. Lauatur in mortariis in-
 fusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lu-
 teum colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-
 tum absumatur. Dein vbi confederit crassament-

Ef 4

DIOSCORIDIS

tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondentē recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium.

Cap. XLIX.

Stimmi optimum, quod splendidissimū est, modoq; nitidularum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellarūt, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricē perducere, sordes & vlcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri membrana profluentem: & vt in vniuersum dicatur, vis vsto plumbo similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas erūpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, non cera & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exēptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret: si enim paulo magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, vt cadmia & es. Sunt qui vt plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. Cap. L.

Molybdæna optima est flaua, argentea spuma emula, modicè splendens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Vic

tiosa est, quæ aerem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, ad Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur lauatque eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

Argenti recrementum. Cap. LI.

Recrementum argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdæna vim habet: quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, utpote cū adstringat, extrahatque.

Spuma argenti. Cap. LII.

Spuma argenti quædam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus conflata, donec perfectè igni incandescat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda, Hispaniensis: hæc sequitur quæ fit Dicearchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argen-

Ff iij

DIOSCORIDIS

to, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, exple-
re caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatri-
cem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argen-
ti spuma, confractis partibus ad magnitudinem in-
glandium, prunae superpositis: ita accensa foliis,
ut conflagret: abstergitur insidens spurcitia, & re-
conditur. Aliqui ter aceto aut vino restinguentes,
rursus vrunt, & eadem prosequuti reponunt. La-
uatur ut cadmia. Vt argyritidi nominatae, aut, si
desideretur, alteri calor detur, ea in parteis magni-
tudine fabarum confracta, choenice Atticae mensu-
ra, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi triti-
ci pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo
puro, raro, ansulis vasis alligato, coquitur, donec
hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in nouum
craterem oris ampli transfunduntur: triticum ob-
icitur, spuma argenti vehementer manibus affrie-
cando infusa aqua lauatur, assiccataq; in Thebai-
co mortario teritur, affusa feruente aqua, donec so-
luta fatiscat: excolata aqua, iterum tota die teri-
tur, & vespere infusa calida aqua sinitur: mane
colis excernitur, alia infunditur, atque ter die exco-
latur. Id septem diebus fieri solet: postea additis
ad singulas minas spumae argenti, quinis salis
fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die te-
ritur, & addita aqua excolatur, cumq; inalbuerit,
calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus sal-
sedinem resipiat. Demum ardētissimo sole siccata,

eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina
 spuma argyritidis diligenter teritur, addito sale
 fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum cō-
 iicitur, aqua infunditur, ita vt superemineat: moue-
 tur quotidie mane & vespere, aqua q; superinfun-
 ditur, priore nequaquam effusa. Hoc fit triginta
 diebus: nanque nisi moueatur, crassescit, vsque in
 duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in
 Thebaico mortario spuma argenti teritur, conies-
 Et aq; in fictile aquam continens, manibus diligen-
 ter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum
 saluginis indicium præbeat. Deinde quod ex argē-
 ti spuma candidum apparet, in vas aliud transfer-
 tur, & reductum in past illos, plumbea pyxide con-
 datur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudi-
 nes cōfractam, in ventre suillo crudo ex aqua co-
 quunt, dum viscus eliquescent contabescat, exem-
 ptamq; cū sale pari terunt, & vt supra dictū est,
 lauant. Sunt qui salis libram vnā, & spumæ ar-
 genti tantundē, in sole terant, aqua continuè muta-
 ta, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantā
 vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris,
 fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum rez-
 centium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ
 disruptæ dehiscant, lanaq; non denigretur, exēptā
 argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterū
 coquito, cyathū aquæ & parem fabarum modum
 adiiciens: eadē tertio, quæ supra, facito. i. summa,

DIOSCORIDIS

rantissper, dum lana iam non inficiatur. Insuper
transfundens in mortarium, ad singulas salis fos-
sitij libras, adijcito octogenas spumæ argenti dra-
chmas Atticas, et terito: intermittensq; nitri quàm
albissimi cum aqua diluti drachmas quadraginta
septem indito: iterum terito, donec satis candoris cō-
traxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto
in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi con-
sidere desierit, colato: tum nouam superadijciens a-
quam, manibus probè versatā finito vt confidat,
ac rursus per colum traicito. Alternis eadem prose-
quere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam
salsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouū
translatam, colato sensim omni humore, Soli qua-
draginta diebus sub Canicula sydus exponito, &
ficcata vtitur. Elotam autem constat ad oculorum
collyria prodesse, & ad cicatricem fœditates tollen-
das, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq;,
& macularum plenas.

Cerulea.

Cap. LIII.

Cerulea fit hoc modo. Infuso in vrceū oris
lati, aut fictile labellum quàm acerrimo
aceto, laminam plumbeam supra fictilis
spiraculum, subiecta prius arūdinea tegete, firma-
to: superiectisq; velaminibus, ne halitum expiret
acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, hu-
more purū ad summa delatū colato, crassamētūq;
transfundito: debet quoque siccare in sole, mox tru-

satili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. Postea
 quod superest duri, in tenues partes redigendum,
 cribrandumq; : vicissim eadem tertio quartoq; fa-
 cienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medica-
 mentis oculorū assumenda. Secundum locū tenet se-
 quēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt, qui ligneas
 rudes, in medio vase appendant, & derafo ceu situ
 imposito, ita vt acetum nō contingat, inditoq; oper-
 culo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, la-
 xato obturamento visunt: cumq; resoluta materia
 fuerit, reliqua, vt supra diximus, exequuntur. Si
 autē quis in pastillos velit digerere, aceto acri sub-
 acta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur.
 Aestate tamen supra dictum opus obeundum est:
 ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiā
 hyeme paratur, vrceis supra furnos, balnea, aut
 fornaces impositis ascendens enim calor, idē quod
 sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, et
 Corinthi, aut Lacedæmone, proximā Puteolis. Tor-
 retur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fi-
 ctili nouo, maximè Attico, tritam cerussam impo-
 nito, & assidue uersato: cumq; cinereum colorem
 traxit, eximens refrigerato, & vtitor. Est & illud
 vrendi genus: Trita patinis nouis supra prunas
 imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec co-
 lore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus
 ministratur. Quæ vero ita parata est, sandyx à
 quibusdā dicitur. Lavatur cerussa cadmiæ modo.

DIOSCORIDIS

Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq; insuper excrescentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris, quæ liparæ vocantur, pastillisq; : est autē lethalis eius potus.

Chrysocolla. Cap. LIIII.

Chrysocolla laudatissima Armeniaca, colorem porri quàm simillimè reddens. Secundum locum sibi vendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehementer fricuto, & statim quàm cōfederit, colato. Alteram infundens aquam, rursum terito: hæc vicissim prosequere, donec pura synce-raq; spectetur. Dem siccato in sole, & ad vsus rescondito. Quod si vrere volueris, ex ea terēs quod satis esse videbitur, patinis supra carbones apponito, & alia facito, quæ suprâ diximus. Dos chrysocolle ad purgandas cicatrices: excrescentē carnem coer- cet: adstringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones cōcitāt, et necē iſerre possunt.

Lapis Armenius. Cap. LV.

Armenius lapis præfertur levis, colore cæruleo, perquā æquabilis, calculo carēs, & friabilis. Eadem quæ chrysocolla præstat, sed inefficacius. Quinetiam vsus habet ad pilos in palpebris

alendos.

Cœruleus.

Cap. LVI.

Cœrulei origo ex ærarijs metallis in Cypro : copiosior ex arena litorali : secundum quosdā sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt chalcitis, lauat ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicē erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum.

Cap. LVII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infectorie dant officinae: & est spuma purpurea, innatans certinis, quam detrahit am artifices siccant. Optimū existimatur quod cœrulei speciem præbet, succum suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est, quæ leuiter adstringūt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, et reprimat vlcera.

Ochra.

Cap. LVIII.

Ochra leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauat ut cadmie modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat, caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris.

Cap. LIX.

Hallucinantur qui cinnabarim minio can-

DIOSCORIDIS

dem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui non digno scitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur: in metallis verò strangulantes halitus eructat: itaque facies incolæ vesicis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aerem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris verò ex Aphrica deferitur, & magno constat: hætenus inuenitur, ut vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem: conuenit ad oculorum medicamenta, verum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet, Ambustis igni, & pappularum eruptionibus, cerato excepta, medetur.

Argentum viuum. Cap. LX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt: si quidem deteresa fuligo, quæ calici insidet, refrigeratæ in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argentifodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: si quidem aliam materiam

LIBER QUINTVS. 231

omnem excedit, & defluere facit. Potum uim perniciousalem habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinum cum absynthio, aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origanum, uel hyssopum cum vino, auri limata scobs, id est, rametum quam tenuissimum epotum mirabili est auxilio.

Rubrica Sinopica. Cap. LXI.

Rubrica Sinopidis maximè probatur grauis, densa, ad iocineris imaginem vergens, calculorum expers, cōcolor, cum diluitur, impendio fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataque: deferitur in Sinopem urbem, in qua venditur, unde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriā: quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs cōmisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumpta aut clystere infusa: datur iocineris uitio laborantibus.

Rubrica fabrilis. Cap. LXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginiensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Lemnia terra. Cap. LXIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata: Lemno insula, palustri loco deferitur, inibi

DIOSCORIDIS

electa, et caprino sanguini permista: quam incolae
cogunt in pastillos, et imagine caprae signant: unde
de & sphragida egos; hoc est, sigillum caprae, ap-
pellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa ve-
nena singularem, pota cum vino, & presump-
ta euomi venena cogit. Contra ictus morsusq; anima-
lium, quae exitiale virus ei aculantur, prodest. Anti-
dotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utan-
tur: est & dysenteriae utilis.

Atramentum sutorium. Cap. LXIII.

Atramentum sutorium genere quidem vnu
& idem est, molle & concretum: sed in spe-
cie differentias treis habet. Vnum nanq; humori-
bus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concre-
scit: quare ab ijs, qui Cypria metalla perficiunt, stil-
latitium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat:
alii stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici
ratione sit in speluncis: postea transfusum in exca-
uatos scrobes, concrementum capebit, quod peeton,
id est concretitium, proprie nominatur. Tertium di-
citur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile,
ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi haec
est: Aqua madefactum decoquunt, mox in pisci-
nas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc cer-
tis diebus coalescit, & complures formulas digestum,
tesserarum speciem reddentes, quae racematim inter
se cohaerescunt. Optimum esse creditur, caeruleum,
grauē, concretum, traslucens: cuiusmodi stillatitium.

est, ab alijs lonchoton nominatum. Proximum, cō-
cretitium. Coctile vero ad infectus & denigratio-
nes, aptius ceteris esse compertum est: sed ad medi-
cinæ vsum inualidius esse, experimenta docent. Va-
let adstringere, calfacere, & crustas inducere: las-
tas ventris tineas necat, drachmæ pondere deuorac-
tum, aut cum melle linctum: vomitus ciet: aduer-
sus hausta fungorum venena, ex aqua potum au-
xiliatur: purgat caput, aqua dilutum, & in velle-
re naribus instillatum. Vritur, vt paulo post in mē-
tione chalcitis ostendemus.

Chalcitis.

Cap. LXV.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec la-
pidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblon-
gis venis, splendētibusq;. Huic abstersoria vis inest
excalfaciens, et crustas vlceribus obducēs: purgat
quæ oculis & eorundem anguis hærent. In genere
leuiter exedentium est. Ad ignem sacrum, & vlce-
ra quæ serpunt, efficax est. Sanguinem è vulua, et
naribus erumpentem, cum succo porri sistit: gingi-
uarum vitia, depascentia vlcera, tonsillasq;, eius
farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculo-
rum medicamentis longè utilior redditur. Callum
genarum, & scabritiam absomit, abstergetq;. Fi-
stulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chal-
cite medicamentum quod psoricon vocant, duabus
eius partibus, cum vna Cadmiæ additis, et ex ace-
te tritū. Oportet aut in fictili obruere fimo, diebus

DIOSCORIDIS

quadraginta, per Caniculæ ardores. sic enim fit acrius. Idem, quod chalcitis, potest. Alij pares utriusq; portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desiderit, & perfectè inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum & miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiānum perflatis carbonibus, vsquedum luteo colore palleascit: aut fictili subditis cādentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

Cap. LXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionem cum chalcitide eandem, præterquam quod psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamēta multo supradiçto inferius.

Melanteria.

Cap. LXVII.

Melanteria gemine est originis: quedam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concrescit. Alia verò in summa facie supradiçtorum

facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdã regionibus, fossilis quædam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, levis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticã eam obtinet, quàm & misy.

Sory.

Cap. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melanteriam esse, aberrantes, siquidem sui generis est sory, ei non absimile: verùm sorci virus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdã regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptum, quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum virus olens, ita vt stomachus in uomitione effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & uestionem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex uino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, uaros extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hec autem ferè omnia, & alia, quæ uestionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur: præter salem, & uini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Coma

G g

DIOSCORIDIS

buſta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges. Cap. LXIX.

Diphrygis tria genera eſſe creduntur. Quo ddā enim metallicum eſt, quod in Cypro ſola gignitur: lutoſum nanque extrahitur ex luto cuiusdā inibi ſpecus: extractū, ſole ſiccatur, mox circumpoſitis ſarmentis vritur. Diphryges ideo vocatū eſt, quod & à ſole, & à ſarmentis uratur, areſcat, et ferme torreatur. Alterum perfecti aeris, quaſi ſubſiſdens fax eſt: ſiquidem poſt frigida aquae offuſionem, vt ſuprà retulimus, cū de flore aeris diſſeremus, ſublato are, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adſtrictionem & guſtum aeris habens. Tertium ſic fit: Lapidem pyriten, vt calcem multos dies cremant in camino. cumq; colorē rubricæ contraxerit, eximentes recondant. Quidā tradunt hoc ex ſola materia, quæ lapidem aeris gignit, fieri: quando in liſtis aeris aſſata, & in ſcrobibus translata peruritur. Tunc enim ambiētē ſcrobis locum comprehendit, & exēptis lapidibus nihiſo minus inuenitur. Praefertur quod ſaporem aeris reddit, æruginisq; adſtringens, & vehemēter exiccans linguā. quod ſibi exuſta ochra non vendicat: quæ cremata, diphrygis vice venit. Vis eius adſtringere, perpurgare, extergere, ſiccare, excreſcentia conſumere, vlcera ſerpentia, & quæ cacoethæ vocāt, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina aut cera o exceptum diſcutit.

LIBER QUINTVS. 234

Auripigmentum. Cap. LXX.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimū existimatur cruciatum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellesponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt: Vnus supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidū, & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua viuis carbonibus subiectis, assiduūq; versatur, donec igne flagret & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. crustas cum vehementi vredine, & violēto morso excitat: reprimat quæ excrescunt, et capillos euellit.

Sandaracha. Cap. LXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatio, & aliena materia vacans, friabilis, cinna-
baris colore, sulphuris virus redolens. Dos eadem & uestio, quæ auripigmento: explet alopecias, resina excepta, & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad nariū orisq; vlcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusientibus. Suffitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, raptō per fistulam nido re vocem expedit, cum melle delincta: suspiriosis

G S ij

DIOSCORIDIS

cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen.

Cap. LXXII.

O Mne aluminis genus ferè in Aegypto, et in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli, Phrygia, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recēs, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulose aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, quò gustus indicio dignoscitur, quòd non adstringat. Dānatur in rotundi genere, quod manu confectum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autē suapte natura rotundū, bullis turgens, albo propius, atq; validius adstringens, præterea nonnihil palloris cū quadā pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptiū, aut ex isula Melo. Liquidi probatio, ut sit limpidū, lacteū, æquale, & semper succo madēs, sine lapidibus, atq; quendā coloris igniculū expirās. Vim habent excalfaciēdi, stringēdi, & expurgādi, quæ caliginem pupillis

LIBER QUINTVS. 235

lorum offundunt: genarum carnem, ceterasq; ex-
crescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius
intelligitur. Vri & torreris chalcitidis modo debet.
Putrescentia ulcera cōpescunt: sanguinis fluxiones
inhibet, gingiuas humore pręgnantes cōprimunt:
motus dentium cū aceto & melle firmat. Prosunt
cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum,
& fluxionibus aurium, cum sanguinalis herbe
succo: lepris cōueniunt cum brassicę folijs aut mel-
le cocta: item pruritui, & unguium scabritijs, pte-
rigijs, & pernionibus, aspersa cum aqua. Valēt cū
aceto fece, & galla, pari pondere cremata, ad pha-
gedenas ulcerum, & cum salis duabus partibus,
ad vitia quę pascunt: fursures cum eruo & pice il-
lita abstergunt: ad lendes, pediculos, ambusta, cum
aqua illita auxilio sunt. Cōtra tumores, & graue
alarū inguinumq; virus, illinuntur. Ex Melo autē
aduectum, mulieribus pręstat ne concipiant, ante
coitum ori uulvę inditū: partus quoque extrahit:
gingiuas, si caro excreuit, uulvę ac tonsillis accōmo-
datur: ori, auribus & uerendis cū melle illinuntur.

Sulphur.

Cap. LXXIII.

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod
apyrō uocat, nitedule modo splendidū, perlu-
cens, minimē lapidosum. Probat in gene-
re sulphuris ignē experti, quod uiret, ac prępingue
spectatur. Plurimū in Melo & Lipara gignitur.
Supradictum sulphur calfacit, discutit, & cele-

G g ij

DIOSCORIDIS

riter concoquit: prodest tussibus, suspiriosis, puru-
lenta extusis et in ous sumptum, aut suffitum:
præterea partus, vsti nidore extrahit: lepras, liche-
nas, scabros ungues, cum resina terebinthina mi-
stum, aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras ef-
ficax est: vitiliginis tollit: scorpionis ictibus, addita
resina, medetur: cum aceto verò, draconis marini
scorpionis que plagas sanat. Pruritus toto corpore
erumpentes, cum nitro detersum, sedat: regium mor-
bum emendat, insparsum fronti cochlearis mensu-
ra, aut in sorbili ous sumptum. Facit ad grauedinē,
& destillationes: sudores quoque conspersum inhi-
bet: podagricis, cum aqua & nitro illitum, conducit
grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fu-
stulam hausto, sanat: lethargicos suffitu excitat:
erumpentem undecunque sanguinem sistit: contu-
sis auribus, cum vino & melle illitum medetur.

Pumex. Cap. LXXIIII.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spongio-
sus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, &
candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus ob-
ratus, & ubi canduerit, extractus, vino restingui-
tur odorato: iterumque incensus extinguatur: & ter-
tia vstione exemptus, & per se refrigeratus, ad
usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abster-
gere: purgat cum calfactione, quæ caliginem pu-
pillis offendunt: explet vlcera, & ad cicatricem
perducit: excrescētia cohibet. Fit ex farina eius den-

tificium. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus author est, si quisquam in bullientem urceum vini pumicem iniecerit, furorem statim sedari.

Sal.

Cap. LXXV.

SAL fossilis efficacior est, communiter, si est candidus, calculis vacans, & perspicuus, densus, & equali compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est candidus, & equalis, densus. Probatissimus in Cypro fit, et Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multo ualidissimus est Phrygius nomine tapæus, aut tritæus, aut gantæus. Salis natura in commune per quã utilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quod alius alio sit præstator. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus. Excrecētia in oculis reprimat, & pterygia cōsumit, ceterasq; carnis extuberationes tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur, doloresq; in saccis fotu mitigat, & pruritus sedat, ex oleo et aceto infriktus ad ignē, donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasq;. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus lenat: tonsillis unæq;, cum melle tostus. Vlceribus in ore

Gg iiij

DIOSCORIDIS

manantibus, gingiuis, quas humor uexat, & phagedenis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origane, melle, hyssopo: aduersus cerosten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus, cū melle & aceto: aduersus uestiarum ictus, et teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo uitulino: furunculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in lineoleo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, et melle: ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagri eis itidem imponitur, & aurium doloribus cū aceto: ignes sacros, et ulcera quæ serpunt, cū aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter operatus ne exiliat, conditusq; prunis, usquedum effervescat. Aliqui fossile subacto polline oblinunt, et carbonibus subijciunt, usquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluitur, et siccatus in ollā coopertā mittitur, subdito igne, moueturq; , donec iam non exiliat. Spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramē

tum est in exilibus petris inuentum, cui vis eadem
quæ sali.

Muria.

Cap. LXXVI.

Muria effectus salis præbet, abstergitq;:
dysentericis infunditur, etiamsi nomē
intestina corripit: & ischiadicis ueteri
bus. Ad fotus, aquæ marina usum præstat.

Flos salis.

Cap. LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus ta-
men quibusdam innatat. Assumendus qui
crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. In-
terdum longè magis uirus olet, gustuq; mordacior,
& pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut
scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non ni-
si oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte,
etiam aqua, diluente factitium colorem. Ad ulce-
ra, quæ cacoethe uocantur, & phagedenas, geniz-
talium nomas, & purulentas aureis, efficax est:
oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit.
Emplastris unguentisq; coloris causa, ut rosaceo,
miscetur: sudorem cit: aluum turbat, in uino aut
aqua sumptus: stomachum malè habet. Additur
acopis, & smegmatis, quæ albandi capilli gratia
componitur: & in uniuersum acris est, & feruenc-
tis nature, ut sal.

Nitrum.

Cap. LXXVIII.

Prefertur nitrum leue, roseo colore, aut can-
dido, in foramina dehiscens, perinde quasi

DIOSCORIDIS

Spongiosum quiddam, quale ex Bumis affertur. Huius
 mores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri
 optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, co-
 lore pene purpureo, aut spumosa, & mordens: qua-
 lis ex Philadelphia Lydiae defertur. Secunda est
 Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariae gignitur.
 Vim & vitionem salis habet, tam nitrum, quam
 spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tri-
 tum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sa-
 pa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt,
 uti ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus
 illinitur, ante suspectam accessionem. Misi etur em-
 plastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuât,
 & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida aut
 vino infusum, inflationes, purulentas aurcis, &
 sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cum aceto
 instillatum. Canum morsibus ex asinino adipe aut
 suillo medetur: resine terebinthine admixtum fu-
 runculos aperit: aquæ inter cutem cum fico illinitur:
 oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: &
 venenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis
 momorderit, ex aqua: is vero, qui taurinum san-
 guinem biberint, ex la serpitio, isque qui cibum non
 sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisque iam re-
 missionibus, & luxatis, cum cerato: in resolutione
 lingue, panis commode permiscetur. Aliqui supradic-
 ta carbonibus vrunt, subiecta prius testa noua,
 donec incandescant.

Eligenda fæx maxime à vino vetere, Italico :
 sin minus, ah alio consimili. Fæx aceti viribus
 longè acrior est. Crematur vt alcyonium, antè dili-
 genter siccata. Sūt qui noua testā igni largo vrāt,
 vsque dum penitus incendatur. Alij viuis carboni-
 bus facis glebam obruunt, & idem opus proseguū-
 tur. Experimentum est legitime vstionis, vt aerio
 nitore inalbescat, linguamq; tactu vrere videatur.
 Eadem vrende facis aceti ratio. Vis ei supra modū
 vrens, & abstergens : vlcera ad cicatricem perdu-
 cit, adstringit, vehementer exest, siccataq; . Sed re-
 ti vtendum est, quoniam celeriter exanimatur: pro-
 inde non nisi in reconditorio, & vase aliquo repo-
 ni debet. Lauatur, vt pompholyx . Quæ vstionem
 experta non est, tumores & per sese, & cum myr-
 to cohibet: ventris stomachiq; fluxiones illita sistit:
 muliebri profluuium, imo ventri aut genitalibus
 imposita, mitigat: panos discutit, nondum exulcera-
 tos, & tubercula : rigentes mammas, sui q; lactis
 impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Crema-
 ta verò, vngues scabros cum resina aufert : addito
 lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elo-
 ta oculorum medicamentis, vt spodos, adijcitur: ci-
 catrices eorum & caligines eadem abstergit.

Calx uiua. Cap. LXXX.

CAlx uiua hoc modo fit: Marinorum bucci-
 norum testas igni condito, aut feruenti cli-

DIOSCORIDIS

banc, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: si aliter, iterum urito, usque dū vehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouum conq̃cito, & exactè pannis operiens, noctem unam conquiescere finito: manè eam extrahens, ubi perfectò omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è uili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, mollit & dissipat: ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. Cap. LXXXI.

Gypsum uim habet astringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresq; cohibet: sed potum, strangulationis modo ingulat.

Sarmentitius cinis. Cap. LXXXII.

Sarmentorum cinis urendi uim habet: cum axungia autem uel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentiæ carnis in scroto reprimat: serpentium canumq; morsibus illitus ex aceto medetur: crustas obducētibz medicamētis admiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

LIBER QVINTVS. 239
Alcyonium. Cap. LXXXIII.

Alcyoniꝝ quinque esse genera compertum
est: vnum enim spissum, acerbi saporis,
spongiosa facie, item tetri odoris, pondero-
sum, et piscem olens, quod plurimum in litoribus
inuenitur. Alterum pinnulae oculorum aut spōgie
simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens.
Tertium vermiculi forma, & colore magis purpu-
reum, quod Milesium quidam vocant. Quartum
succidis velleribus non dissimile, multis inanitati-
bus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore,
asperum, parte interna quodāmodo pumicosum, fo-
ris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta
insulam Beshicon appellatam gignitur, patrio no-
mine halos achnen vocant. Duo priora in scemina-
rum smegmata assumuntur, contra lentigines, li-
chenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in
facie reliquoq; corpore. Tertiū ijs, qui difficili vri-
na vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, ido-
neum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem,
lieni. Vñtum autem, & ex vino illitum, alopecias
replet. Postremum dealbandis dentibus aptū est:
in alia smegmata, psilothraq; assumitur, cum sale
mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit,
cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens va-
sis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum fi-
glinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recom-
dat. Lanatur vt cadmia.

DIOSCORIDIS

Adarces. Cap. LXXXIII.

FIt in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta falsilago, humidis et palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asi similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongiæ. Cap. LXXXV.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ cōtrarias dotes habent. Vritur eæ ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæue conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetustæ autem inuiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosq; laxant: siccæ recentes et vacuæ senilia ulcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, impositu siccant: sanguinis profluvium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum profluentem sanguinem sistit.

Candidæ cura fiunt, è molliſſimis recentes, per æſtus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris cohæret: inſolantur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſurſum ſpectante, & qua abſciſſæ fuerunt, deorſum. Si uerò æſtiua ſerenitate ad lunam ſternantur, perſuſa ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Corallium. Cap. LXXXVI.

Corallium, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinum eſſe fruticem conſtat, qui alto extractus, duratur ſtatim atque emergit, tanquam offuſo aere protinus concreſcat. Plurimum inuenitur ad Syracuſas, in promontorio cui Pachyno nomen eſt. Laudatiſſimum, rubens, colore antherici aut ſandycis ſaturatæ, nec ſecus terenti facile cedens, æquabili uſquequaque concremento, ruruſus algæ aut ſuci marini odore, quàm ramiſſiſſimum, forma fruticis, cinnamomi emulum. Quod autem in lapidis duritiâ coit, ſcrupuloſum, inane, & lacunoſum, vitioſum exiſtimatur. Adſtringit, & refrigerat mediocriter: excreſcentia coerçet: oculorum cicatrices abſtergit: vlcerum caua, & cicatrices explet: contra ſanguinis reiectiones magnopere efficaciſſe eſt, vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & polum ex aqua lienem abſumit. Quod antipathes uocât, coralliũ eſſe arbitrat, ſpecie tãtũ diſtã. Eſt autẽ colore nigro, arboris figura, ramiſſũ magis. Vires ſupradicti habet.

DIOSCORIDIS

Phrygius lapis. Cap. LXXXVII.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia
utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in
Cappadocia. Optimus habetur pallidus,
modice grauis, non solida corporis compage, inter-
cedentibus albis segmētis, vt in cadmia. Vritur au-
tem vino optimo perfusus, viuisq; carbonibus obru-
tus, perflatur aßilue follibus, donec mutato colore
rufescat: rursus extractus eodem vino restingui-
tur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: atten-
dendum tamen, ne minutim confringatur, et in fio-
liginē evanescat. Vis crudo vstoq; adstrictoria, ex-
purgans: vlceribus crustas quadāntenus inducit,
ambustis cū cerato medetur. Lavatur vt cadmia.

Aßius lapis. Cap. LXXXVIII.

Aßius lapis aßumi debet punice colore, le-
uis, fungosus, item friabilis, scissiles ve-
nas lutei coloris ad imum ætas habens.
Eius flos, salsugo subflaua est, summo lapide insi-
dens, cōpage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs
punici simili, ad luteum vergente: ad motus lingue
aliquantum mordet. Vim habet vterque adstricto-
riam, & modice erodentem, admißtus liquida pici,
aut terebinthina, tubercula discutit. Longè valiz-
dior flos existimatur. De cætero siccatus flos, vete-
ra vlcera & cicatrici repugnantia sanat: ex-
crescentia cohibet, tetraque vlcera & fungis
similia, cum melle expurgat: vlcerum cana explet,

¶

LIBER QUINTVS. 241

& expurgat cum melle, depascentiaq; cum cerato
sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ
lomēto: & lienosis, ex aceto & uina calce. Prodest
flos ex melle phthisicis linētū. Podagrici iuuantur,
pedibus in folio ex eo lapide excavato inditis. Fiūt
quoq; pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriane
tem carnem, & corporum crassitiem absument.
cum vice nitri in balneo sparguntur. Si lauare li-
bet, cadmia modo lauatur.

Pyrites. Cap. LXXXIX.

PYrites lapidis genus est, à quo æs conflatur.
Eligi debet æris similitudine, facile scintillas
edens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna con-
tinuè flatur follibus, donec rufescat. Alij in mul-
tos carbonēs igni candentes, lapidem copioso melle
perfusum deiciunt, et ubi ad fuluum colorem ver-
gere cœperit, extrahūt: efflatoq; cinere, rursus ma-
defactum cremant, donec æquabiliter assiccatus,
friabilis reddatur: si quidem sæpe facies summa so-
lūm vritur. Ita crematus, siccatusq;, reconditur. Si
eloto opus sit, lauari debet cadmia. Tā crudi quā
vstis vus est, excalfacere, abstergere, offusam ocu-
lis caliginem expurgare, duritias concoquere, &
concoctas discutere. Resina exceptus excrescētia in
carne cohibet, sed calorem quendā et adstrictionē
parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellant.

Hæmatites. Cap. XC.
Hæmatites optimus habetur friabilis, satū-

H h

DIOSCORIDIS

rato colore niger, durus & suapte ingenio æquā-
lis, nulla sorde admista, nulloq; ronarū discursu.
Vim habet adstringentem, & excafactoriam ali-
quantū extenuantemq;: oculorum cicatrices &
scabritiā cum melle purgat: cum lacte autem mu-
liebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis
conuenit: bibitur cōtra difficultatem vrinæ, & flu-
xiones mulierum in vino: & ab ijs qui sanguinē
reiecerunt, cum succo punici mali. Fiumt ex eo cotiz-
cula & collyria oculorum vitijs apta. Vritur vt
Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est,
vt modicē leuis fiat, & bullis quibusdam intumes-
cat. Sūt qui hematiten ita adulterāt: Dē sam gle-
bā rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ
eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui
feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; in-
teriecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad
cotem hematitæ colorem reddat: quod si ita res se
habet, reponunt: sin minus, iterū obruunt, & sub-
inde conspicientes, periculum faciunt: si quidem in
cinere diu demissus, colore mutato diffunditur. Co-
arguitur malè cōfectus, primū scissilibus venis:
quippe in rectos venarum discursus refringitur.
At hematites lōgē secus se in colore habet: nanq;
hic floridum reddit: hematites vero saturatiorem,
atq; cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica
rubrica. Fit et è magnete lapide, vehemēter ambu-
sto. In Aegypto spōte naturæ cū metallis enāscitur.

Schistus lapis. Cap. XCI.

Schistos lapis in Iberia Hispanie gignitur. Probatur maxime qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium venarum discursu, pectinū modo, Ammoniaco salī similis. Vim exhibet hæmaturæ, sed ad oīa infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte persusus: ad prociuentia, rupta, itē genarum crassitiem, & vnas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates. Cap. XCII.

In gagatarum lapidū genere præferendus, qui celeriter accēditur, et odorem bituminis reddit: niger est plerunq; & squallidus, crustosus, perquī leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprehendit fonticum morbū suffitus, recreatq; vuluæ strangulationes: fugat serpentes ridore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua īfluēs amnis ī mare effunditur, proximē oppidū quod Plagiopolis dicitur. Vocatur aut et locus et amnis gagas, ī cuius faucibus ij lapides īueniuntur.

Alij plures lapides. Cap. XCIII.

Lapis thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, et oleo restingui: quod in bitumina accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad æruleum vergente, densus, nec admodum grauis.

Hb ij

DIOSCORIDIS

Datur cum aqua mulsa, trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sūt qui magnetem crematum pro hematite vendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hemorrhoidas exiccat: eius cinis dentifricio optimus. Galactites appellatur, quod lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones & ulcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recōdere, propter vim glutini, quod ei obhæret. Melitites omnia galactitæ similis: hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem ut galactites effectus. Morochthus lapis, quem aliqui galaxiā, aut leucographida vocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, utpote molli, & facile liquecente, lintea nes dealbandis vestibis vtuntur. Spiracula corporis obstruere videtur, conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, cœliacis, & vesicæ doloribus, cum aqua potus: itidem fluxionibus vuluæ, impositus velleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atq; delacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, ulcera quæ sunt in teneris partibus corporis ad cicatricem perducit. Alabastrites vocatur onyx, crematus, resina aut pice assumpta duritias discutit: Stomachi dolores cum cerato leuat, & gingiuas cōprimit. Lapis nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subviridi colore iaspidem imitatus: cum diluitur tamen lacteum succum reddit. Vehemens

ter mordet: tenebras, quæ pupillis obuersantur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glanzdis effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis æqualiter inter se distantibus, quasi industria detornatis: solutus nullam qualitatem manifestam gustui representat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cū calidæ aque cyathis tribus, potu difficultati vrine auxiliari, & calculos in vesica comminuere. Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis: quo, vtpote flexili, telas & vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora exeunt. Sapphirus lapis, percussis à scorpiõe potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Exerescētia in oculis, vnasq; & pustulas inhibet, et ruptas membranas cogit. Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis, versicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere, qui cum ea quidem augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, levis. Huius ramenta comitialibus impotu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtuntur. Arbores adalligato eodem frugifera redduntur. Iaspidium quedam smarage

Hb iij

DIOSCORIDIS

dum imitatur, alia cryſtallum, colore ſimilis pitui-
 te. alia nō diſſimilis aeri, ob id vocatur aerix uſa:
 alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumē-
 to vocatur: quædam lineis albis et reſplendentibus
 præcingitur, Aſſyrios appellata: alia terebinthinæ
 ſimilis, quæ terebinthix uſa dicitur: alia colore cal-
 laida gemmam æmulatur. Omnes amuleta eſſe
 traduntur, & accelerare partum femoribus appē-
 ſe. Aetites lapis eſt veluti prægnans, cū quatiz-
 tur, alio in vtero ſonante. Grauidis continet par-
 tus, cū lubricæ ſunt vuluæ & parum tenaces,
 ſiniſtro brachio adalligatus: ſed parturientibus è
 brachio amoueatur, & feminibus alligetur, vt ſi-
 ne doloribus pariant. Furem deprehendit, ſi quis in
 pane conditum offerat: fur enim manſum deuora-
 re non poterit. Quinetiam concoctus, furem coar-
 guit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit.
 Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut glencino,
 aut alio excalfaciētes, comitiales magnificè iuuat.
 Ophite genera multa: quidam ponderoſus & ni-
 ger: alter cinereo colore ſpectatur, punctis diſtin-
 ctus: tertius lineis quibuſdam candidis intercin-
 ctus eſt. Omnes alligati contra capitis dolores, &
 ſerpentium iētus proſunt. Feruntur qui lineas ha-
 bent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. La-
 pides in ſpongys inueniuntur, qui veſicæ calculos rū-
 punt, in vino poti. Lithocolla glutinū, quo lapides
 e iunguntur: conſtat autem ex marmore, lapide

LIBER QUINTVS. 244

Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo
admotum, incōmodos oculis pilos replicare. Ostrac-
ites testæ similitudinem habet, crustosus, & in la-
minas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos,
pro punice vtūtur. Menses drachmæ pōdere potus
ex vino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bi-
batur sicilici pōdere, fœminis præstat ne cōcipiāt.
Cum melle autem impositus, mammaram inflam-
mationes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis
est, quo annularij sculptores lapides expurgāt, ad
erodendum & vrendum utilis: gingiuīs, quas hu-
mor vexat, prodest: dentifricio commendatur. Are-
na è litoribus sole feruefacta, hydropicorum tumo-
res exugit. si capite tenus, in ea obruantur. Torre-
ri solet ad aridos fotus, pro milio aut sale. Ecote
Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alo-
pecias ad pilū reducit: virginum māmās cohibet:
nec increfcere patitur: potum ex aceto, lienē absu-
mit, & comitialibus prodest. Geodes lapis, adstrin-
git, siccatur, caligines oculorū discutit. Allitus aut ex
aqua, testium māmaramq; inflāmationes sedat.
Terra. Cap. XCIIII.

OMnis terra ad medendi vsus recepta, sum-
mam & primam vim habet refrigerandi,
meatūque obducendi, occludendique. sed specie di-
stat, cum alia adiūctis quibusdam ad alia sit vti-
lis. Eretriades due sunt, vna vehementer alba est,
altera cinericia. Optima habetur ad cinereum co-

H h iij

DIOSCORIDIS

lorem vergens, perquam mollis, quæ si per æram
 ta tractim ducatur, lineam violaceam refert. La-
 uatur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur seor-
 sum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor le-
 uiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur in-
 terdiu, adiecta aqua, ut vespere confidat: anteluca-
 nis colo excernitur, & demum in sole trita si fieri
 potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desidera-
 tur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perfora-
 tum coniunguntur, oreque vasis diligenter obturato,
 supra carbones candentes continenter foliis pera-
 flantur: ubi vero cinis in fauillas se conuertit, aut
 aereum colorem contraxit, exempti reconduntur.
 Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, le-
 uiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta
 conglutinat. Samia præfertur candida, levis, tan-
 genti lingue glutinis modo adhærescens, mollis, suc-
 cosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion
 vocant. Dux enim species eius: vna, antea diximus:
 altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo
 prædessa. Vritur ac lauatur ut eretria, vimque consi-
 mile habet: sanguinis reiectionis sistit, et foeminis
 fluxione vulue laborantibus, cum flore sylvestris
 punice datur. Testium & mammarum inflammatio-
 nes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores
 arcet: contra serpentium morsus & venena, pota ex
 aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inue-
 nitur, quo aurifices vtuntur polliendo auro, ut reo

splendeat. Probaturn candore & duritia. Vis ei ad-
strictoria, & refrigerans: prodest stomachicis po-
tus: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum
& vlcera, cum lacte efficax est partus, vt tradunt,
adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custo-
dit. Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum,
Samie similis: est aut crustosa, albaq; sed fictitius
formis differens. Vis eade quae & Samie: extēdit
faciem, & erugat, atq; splendidā reddit: colorē in
facie & corpore toto commendat. in balneis pro ni-
tro deterget. Eade praestat Selinusia: maximē lau-
datur, quae uehementer resplendet, candida, friabi-
lis, et humore dilui celerrima. Cimoliae duo genera,
candida & ad purpureum inclinans. Optima exi-
stimatur, quae innatam habet pinguitudinem, ta-
ctūq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, paroti-
das, et alia tubercula discutit: ambusta igni, si sta-
tim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: te-
stium duritias, & totius corporis collectiones cohi-
bet, igni sacro imponitur. In summa, vtraq; multū
in medicina commendatur, si incorruptae originis,
nec spuria assumatur. Quae pnigitis dicitur, colore
ferē eretrie similis est, grandioribus tantū glebis:
manum si quis admoueat, refrigerabit: tactu lin-
guae, vsque adeo glutinosa, ut pensilis hāreat. Cui
effectus idem qui cimolia, paulo tamen infirmior.
Hanc aliqui pro eretrieade vendunt. Fornaceae teste
uehementer tosta, crustas vlceribus obducūt: quae

DIOSCORIDIS

re prurigini & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, strumas discutiunt, cerato exceptæ. Fornacum terra quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Melia colore cineream eretiam imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, deraſi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitiliginis, & lepras abstergit. Pictoribus vsum præbet, ut colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in vniuersum eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facile resoluatur. Ex ampelitide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra piceæ lōgos carbones referens, modicè assulosa, & equali splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vſus eius ad illinendas vites sub germinationis tēpus, utpote cum innascentes uermiculos enecet.

Fuligo pictoria. Cap. XC V.

Fuligo qua pictores vtuntur, ex vitrarys officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax.

LIBER QUINTVS. 245

facta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. XCVI.

Atramentum, quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. In singulas libras gummi terne fuliginis vncie adijciuntur. Fit etiam è resinarum & pictoria fuligide, de qua paulò antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum sescuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur, sed non antè soluatur, quàm cicatricem induxerit: sanatis siquidem vlceribus, sua sponte decidit. Cæterùm habes, amicissime Aree, ferè quæ tradenda duximus pro operis modo, quem destinaueramus, & materiæ auxiliiorumq; medicinalium copia.

QVINTI LIBRI
FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE VENE-

nis, quoque modo arcean-
tur, vitenturque,

LIBER VI.



UPERIORIBVS, amicis-
sime Arce, libris tradidimus de
aromatibus, oleis, vnguentis,
arboribus, et earundem fructi-
bus, lacrymisq; item animalibus,
melle, lacte, seuo, frumens-
tis, oleribus, herbis, radicibus,
liquametis, vinis, metallisq;. In hoc vero totius ope-
ris ultimo, facultates medicamentorum recensebim-
us, que prolesse nobis, aut officere possunt. Vita-
ta igitur orationis prolixitate, opus institutum prose-
quamur. Huiusmodi autem tractatus, cum bifa-
riam distributus sit: in partem venena precauene-
tem, ita vt ne fallant sumentes, aut si quando per
imprudenciam dentur, vt tum quoq; innoxia fiant,
irrita q;: & in rationem ijs succurrēdi, qui iam no-
xiam sentiunt: primum disseram de precauēdi mo-
do, quem esse difficillimum plerique maiorum arbi-
tratur, quod dantes clam venena, ita insidias teno

perant, vt peritissimum quenque decipiant. Si quis
 dem venena sua amaritudine, permistis dulcibus,
 spoliant, & graue odoris virus mistura odoramen-
 torum eximunt: aut medicamenta immiscent, quæ
 tuendæ sanitatis gratia dari putantur: & præser-
 tim in ualeitudine, ut absynthium, tragoricum,
 satureiam, aut hyssopū, quinetiam thymum, irim,
 organū, abrotonum, castorium, aut si quid medica-
 mentis purgatorijs cognatam habere qualitatem
 videatur. Aut potionibus inserūt: vt vinis asperis,
 iuribus, passo, mulsæ aquæ, musto: succis. vt in cre-
 more lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs
 quæ assumuntur, edulij speciem referētibus. Quare
 qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare de-
 bent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salforum,
 aut acidorum, abstinere: nec sitibūdi affatim bibe-
 re, aut esurientes voraciter comesse, semperq; ad sa-
 porem horum diligenter attendere, præsertimq; po-
 tu frigidam aquam præsumere. Satiato enim appe-
 titu, qualitates agerrimè postea concoquuntur. In
 ægris quidem facile cauemus potiones auxiliij præ-
 textū dari solitas, quas offerunt improbi ueneficio-
 rum artifices: itaq; ob id laborantes morbo nō per-
 inde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne
 facile incauti seductiq; homines capiātur dolis ve-
 neficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest
 expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ ve-
 nenorum vires hebetēt, et inefficaces irritasq; red-

DIOSCORIDIS

dant: cuiusmodi carice sunt cum iuglandium nuclei
 bus manducate, & que cedromela vocant, id est
 citria, seminisq; napi drachma cum vino. Item fo-
 lia calaminthe, aut creta que Lemnia sphragis
 appellatur, pondere pari cum vino: aut rutæ folia
 & nucis iuglandis nucleum: aut caricas duas, &
 salis callum ieiuni sumant, & nullo veneni genere
 ledetur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum
 præbent. inter quæ intelligitur magnum Mithrida-
 tium, & quod scinco, & quod sanguine tempera-
 tur. Quin & sæpe venenis obsistunt peculiare quæ-
 dam corporum affectus certo quodam modo consti-
 tutorum cum quadam cibi potusq; qualitate, tum
 vini copia ita temperatorum, ut cum venenis dis-
 sentiant: siquidem ingesti veneni vires frangunt,
 atq; iam priore alimento factis præclusisq; me-
 tibus, obstant ne membratim per digestionem in-
 metur: Verum enim uero, quoniam fortune nece-
 sitas interdum similia discrimina peregre agentibus
 affert, absq; ullis insidijs hominum, nonnihil dis-
 serendum mihi de hac re necessarium duco. Iam pri-
 mum igitur culinam apparare loco subdiali conue-
 nit, cibosq; & potus in huiusmodi loco struere.
 Si id fieri commodè nequit, secunda erit cōditio hæc,
 apparandi apponendiq; sub tecto. Sed tum diligen-
 ter laquearia animaduertenda: frequenter enim à
 superioribus contabulamentis animalia decidunt,
 exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem mo-

liantur, vt phalangia, stelliones, & alia quædã re-
 ptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet: nanq; reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum vero delapsa immersaq; expirarunt, & exitij causas haurientibus attulerunt. Sed hæc hæc hactenus dicta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundã insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoq; tempore oportebit: si quidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & paulisper neglectũ, medicamentis ægrè cedit. Quare si qui pro comperto se virus sumpsisse intelligat, & fateantur, aut eorum, qui aderant, testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile peculiari nativæq; constitutioni restituemus. Neq; enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusce modi frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi, quorum causæ cæcæ latentesq; corporibus insident, medicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt venena, medendi rationem aspernantur? Aequè uero omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, proq; antecedentibus affectionibus qualitatibusq;, quibus sit opportunum corpus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsan obmutescentes, aut temulenti, aut nolentes alioqui uenenũ à se egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum pro-

DIOSCORIDIS

tinus accedendum ad ea, quæ cōmuniter epotis quibuscunque venenis opitulari consueverunt. Atqui nullum magis in omnia valens auxilium dari potest, quàm vt proximo loco virus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, vt vomitare cogantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, vrtica, scenogræco, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo vomitionibus exigēt vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducēt, & corporum inanitione ita aduersabuntur, vt acrimonias venenorum hebetent: Ad quod euidenter huiuscemodi argumēto deprehendere licet: Esto, vt quisquam viua calce vel fæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque uehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiā vomitus non ob id modo quod vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamētum adfert, sed quod assumptum virus nunquam odore, coagulatis grummis aut colore, prodat: quippe cū odore & amaritudine, meconium: colore, cerussam, gyssūmue: grummis, lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorū, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehēdit, ita vt nonnulla
ab ijs

ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorū auxilia transeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum admiscetur, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum, & uina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguesq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Alium nauq; subducunt, uti diximus: & stomachum resoluentia, proniorem ipsum ad vomitionem reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ cōmuni doctē profunt: ut Lemnia terra, agaricum, abrotonū, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, castorium, ferulæ virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenum, peucedani succus, aut panacis, & radix, quam magударim appellarūt, aristolochia longa, syluestris rutæ semen, & betonice, quam cestron nominant, folia: singula cū uino drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & seseli, et liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi aus

DIOSCORIDIS

xiliū ita se habet. Cæterum ab ijs qua consueuerūt
euenire, communia remedia sumptitari possunt. Fe-
rè enim vires venenorum quàm plurimorū, in affe-
ctus cōsimiles corpus tandem redigunt. Quam ob
causam plerisq; communia conducunt auxilia: va-
ria etenim sunt venenorum genera, communes ta-
men nec multi iisdem affectus oriuntur. Neq; fieri
potest, ut omnes concurrentesq; casus, quæ sympto-
mata vocant, unum uenenum sequantur. Alioquin
superuacanta fuisset venenorum singulorum tradi-
tio cum suis remedis ab authoribus descripta. Neq;
vero in vno eodemq; promptū est inuenire, ut quis
stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesi-
cæ dolore uehementer crucietur, ut singultiat, eroda-
tur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuel-
latur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, ve-
terno prematur, vertigo obuersetur, caligent sen-
sus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre cō-
flictetur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur,
trebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore
sugilletur, palleascit, desipiat, stertat, viribus deficia-
tur, et pleraq; alia faciat, patiaturq;: singula enim
in generales affectus deducta, pauca numero, &
communia ea demonstrant, quæ euenire consueue-
runt. Quare in singulis, quæ suprà diximus, nō fa-
cile fuerit deuoratum virus cognoscere. Nam oris
& linguae erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renū
inflammatio, uehemens vrinæ difficultas, et inter=

dum cruoris cum eo exitus, lancinatio, & in pluri-
 mis partibus quidam adustionis sensus, non in cā-
 tharidibus modo potis reperiuntur, sed in erucis
 quoq; pinorum, & bupreste, & salamandra. Por-
 ro non modo eos, qui meconium hauserunt, veterno
 aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere,
 refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritus senti-
 re, sensu priuari constat, sed eos etiam qui mandra-
 goram aut cicutam deuorant. Delirium non hyo-
 scyamus tantum infert, uerum etiam quæ toxica
 appellantur: itidem aconitum, & mel quod in He-
 raclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus
 in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte, aconi-
 to, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile
 vnum vni veneno proprium inuenire signū, quod
 haustum, gustatumq; virus prodere possit: maxi-
 mē, quod hæc cæterorum etiam vitiorum, quæ in
 corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cete-
 rum in his quæ celeriter enecant, noxam signis for-
 sitan indicare possit, si ad ea respexeris, quæ sumus
 dicturi. Sed in ijs, qui ad longas egritudines spe-
 ctant, nihil ad medendirationē difficile, duntaxat
 quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cū venena
 statim atq; præsentaneam vim illam perdiderūt,
 transmutata in longos affectus, communia reli-
 quorum uitiorum remedia, compositionesq; flagi-
 tent, cū uenefica proprietas non amplius insit.
 Si uero longa sit affectio, in aliquod diuturnorum

DIOSCORIDIS

morboreū genus recidet, à quibus facile fuerit mē-
dendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter
auxiliantur, hæcenus. Consequenter quæ pri-
uatim singulis prosunt, scriptis mandabimus, si
prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis or-
dinibus exitialem aut maleficam vim sortiuntur,
vt medicine studiosi ea cautè obseruent, quæ ad ra-
tionem salutis scripta inueniuntur: quòd nonnulla
eorum, quibus vtuntur, venenis sint commista. In-
curia enim magnas adfert noxas, & sepe cōtinuo
vsu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde ani-
malia quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: can-
tharides, buprestis, salamandra, pinorum eruce, le-
pus marinus, rubeta, & rana palustris muta, des-
uorate hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriā-
drum, cicuta, gith, psyllion. Liguamenta: meconiū,
opocarpason, thapsiæ succus, elaterium, mandrago-
ras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, tha-
psia, veratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerū,
quod aliqui Colchicum vocant, quòd in Colchide
nascitur. Herbe olera q̃: smilax, quam aliqui tithy-
malum appellant, Romani taxum, solanum mani-
cum, quod & dorycnium dicitur. sardinia herba,
quæ ranunculi genus est, corniculatum papauer,
pharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi. Ab ani-
malibus: taurinus sanguis recens, coagulatum lac,
mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla: gypsum,
cerussa, calx, auri pigmentum, duo sandarache ge-

nera, spuma argenti, adarce, plumbū, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis: vinum abundè post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

Cap. I.

Quibus datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam vsq; cuncta erodi sentiuntur, picem aut similem quidam cedriae resipiunt, dextra praecordia inflammantur: vrinam egrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaq; vertigine concidunt: postremo mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorū aliquo, uomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryxæ, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicū althææ, quam Latinus sermo ibiscū appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in alium ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammatae autem partes,

DIOSCORIDIS

hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, ut in principes se partes insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, utpote quæ dolores & permulceant et leniāt. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserūt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, et stabilitatem capeſſat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut suillis catu-
lis, maxime pinguibus & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, uesci debent: si quidem aluum cient, atque uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum ruta decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissime antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ. Cap. II.

Is, qui erucas pinorum hauserūt, illico dolor in ore & palato exoritur: uehemens alui, lingue ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur: corpus totum exæſtuat: fastidium urget. Quibus est

succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo et irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis.

Cap. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nostro virus sapiunt, stomachi uentrisq; uehemens dolor insequitur: tam uenter, quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem difflatus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur: urina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt: itè earum decoctum, ex uino. Vbi uero iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra.

Cap. IIII.

Si salamandram hauserunt, lingue inflammatione consequitur, mens & sermo præpeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circunquaque sugillantur: sæpèque, diutius immorante ueneno putrescentes, defluunt. Quibus præstabitur cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiariora uero remedia, resina pinus, aut galbanum.

DIOSCORIDIS

ex melle linctum, & aiuge decoctum, in quo nucleus pinei conterantur: urticae quoque folia, cum lilij & oleo decocta. Prosunt etiam oua testudinis marinae aut terrestres, cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum.

Cap. V.

Sumpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut sylvestrem bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque ijs qui urtica aut scilla laceffuntur: interna rofionem sentiunt: stomachus cum ingenti grauitate exaestuatur. Ceterum inualefcente morbo, cruor strigmentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut ijs qui salamandram hauserunt, uomitione aut clysteribus auxiliari conueniet: sed antea quam uenenum inuale scat, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum: item succum sanguinalis herbae, aut ramorum uitis, aut rubi, aut medullae recentis ferulae, aut myrti cum uino. Baccae autem myrti tuse triteque, & aqua macerate, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Media castanearum tunicsula, similem effectum praebet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumptitetur: origanum quoque cum lixiuio epotum: eximie iuuantur asinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

Dorycnion, quod aliqui manicon solanum appellarunt, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singultus ciet, humor linguā uekat: sanguis confertim reijcitur: mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt ante dicta, uomitus, clyster, & quæcunque potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdala amara, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchyliæ omnia, tam cruda quàm tosta esse, salutare est. Conueniunt & locustæ marine, & gammaari, & pota eorundem iuscula.

Aconitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadā dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conatur, uertigines offundit: lacrymas ciet: gravitatem pectori, et præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluum egeri opus est. Utimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, uel absynthij decocto, cum uino absynthite uel semperuino, uel abrotono, uel chamelea, aut aiuga. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, et ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum

DIOSCORIDIS

hædi, leporis, aut hinnuli cum aceto, ferri quoque stercus, item unum, in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum, lixiuiaq; cum gallina & uino decocta, aut carniū bubularum præpinguium iura, cum uino sumpta. Fertur & aīnga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heraclia. Cap. VIII.

Mel in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntue, non secus affliguntur, quā qui aconitū ebiberunt. Iis eadē, q̄ poto aconito conueniunt: adiuantur in primis continuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta. Coriandrum. Cap. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest: epotum aut uocem exasperat, insaniam adfert, a temulentis non abhorrentem. Qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore, uenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatam, uti retulimus, merum & per sese, & ex absynthio potū auxiliatur. Itē oleum, nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur & epota muria, et ius salsum ex gallina & ansere: passum quoque cum lixiuia sumptū.

Psyllium. Cap. X.

Psyllion epotum, corpori toti frigus & torporē cum exolutione & mœrore quodam adfert: ita ut animum despondeant. Cui omnia que exhausto coriano auxiliantur.

Cicuta.

Cap. XI.

Cicuta pota uertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita ut minimum cernatur: singultus ciet, mentē turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, ut in reliquis, cicuta uomitu excutiemus: postmodum deiectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam potionē, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendū per intervalla, in quibus proderit lac asininum, aut bubulū potui datum, aut absynthium cum pipere & uino, castorio, ruta, mentha cum uino, aut amoni, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis cum semine urticæ & uino, aut lauri folia. Itē laser ex oleo et passo, & passum per sese largius potum proficit.

Taxus.

Cap. XII.

Smilax, à quibusdam tithymalū, à Latinis taxus appellatur: frigus uniuerso corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicuta conueniunt.

Carpaci succus. Cap. XIII.

Potus carpaci succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

Sardonia herba. Cap. XIII.

Sardonia ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescentibus mentem adimit, & quæ

DIOSCORIDIS

dam neruorum distentione labia in rictum contra hit, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in uulgus infansto omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfaciunt: in calidam aquam oleūq; descendant, sed tum multum perfricare & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus.

Cap. XV.

HYOSCYAMUM potum aut comesum, similem Hebræis ab alienationem mouet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininū: si id desideratur, caprillū, uel bubulum, uel aridarum ficum decoctū. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semē ex passo sumptum, & uinum salsum cū adipe suilla recenti, passoq; itidem urticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cæpa, & allium: & hæc singula cum uino sumantur. Postea sinendi quiescere, quem admodum qui uinum biberunt, ut excoquant.

Mandragora.

Cap. XVI.

MANDRAGORA si bibatur, confectim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ueternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequàm aliquid ex ijs accidat, uomitus & aqua mulsa proderit:

postea nitrum & absynthiū ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatoriū, & piperis, sinapis, castoriū, & rutæ tritorum in aceto: & liquida picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quòd si agerē reuocentur, sternutamenta mouere, alhsq; cōmunibus auxilijs uti conueniet.

Meconium.

Cap. XVII.

EPoto papaueris succo, quem meconion uocant, consequitur ueternus cū perfrictione & pruritu uehemēti, ita ut sæpe inualecente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliātur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merū cum absynthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, & rutæ syluestris semen cū pipere, uino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, uel cum satireia aut origani decocto, cum uino. Hi olfactilibus excitandi, et ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foveantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cū uino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. Cap. XVIII.

Quod corniculatum papauer appellant, & potus, & cibo eadem inferre consuevit, quæ pa

D I O S C O R I D I S

pauēis succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum.

Cap. XIX.

Quod pharicon uocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem nervorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum absynthitem potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinē aliqui uocauerūt: aut spice nardi duas drachmas, & myrrha totidem obolos, cum passo: aut irim cū croco ex uino: dera sumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum.

Cap. XX.

Toxicum ex eo nominari uidetur, quod barbarorum sagitta eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & lingue inflammatione torquentur: incoercitus furor uarias ijs imagines obuersat: quare uix medicina locus est: raroq; qui hauserūt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinū dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs cōuenit, quinque folij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus, malaq; cotonea trita esse, aut cū puluere & aqua bibere, conueniet amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbūt, & ubi surrexere, stupidi reliquum uitae tempus degunt.

IXia, quæ ulophonon appellatur, inter potandū aliquid ocymo simile gustu & odore redolet: uehementē linguæ inflammationē excitat: mentem mouet: oēs excrementorū exitus supprimit: Strepitum cum animi deliquio ciet, ūs q; intestina latrant, nec egeritur quicquā. Post uomitionē aluum q; resolutam, auxiliū præstat aqua, in qua absynthiū mæduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota: rutæ q; syluestris semē, aut laseris radix: item trago rigani decoctū, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorū singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes ex uino, cū resina, castorio, & ruta trite, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Itidem chamæleæ aut thapsiæ aut absynthij succi sicilicus cū aqua mulsa, & acetum calidum potum. Cerussa. Cap. XXII.

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiue, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: ūs extrema frigescunt, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum aut malux decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmētis factam, amaricinum oleum aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum

DIOSCORIDIS

thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi
quod ulmus pior auit, aut humor, quem ulmea fo-
lia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoque
uomant. Conuenit etiam tapsie succus, aut scam-
monie, cum aqua mulsa potus.

Fungi. Cap. XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia ledunt: omnes
tamen strangulatus suspēdio similes cōcitant.
Quibus confestim succurrendum: communiter ex
oleo uomere cogendi: mirificè iuuat lixiua ex sar-
mentis aut pyrastris surculis, epota cum sale, posca
& nitro. Fructus, aut folia pyrastris cum fungis
decocta, strangulantem illam uim auferunt, esita-
taq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallina-
cea ova cum posca proficiunt, adiecta aristolochie
drachma: item absynthium cum uino melleq; sum-
ptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro, pa-
naxis radix & semen in uino, fex uini cremata
cum aqua, atramentum sutorium ex aceto, radix,
uel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum. Cap. XXIIII.

Lapidescens gypsum strangulationem creat:
quare eadem proferenda sunt, quæ mansis
fungus, auxilia, & ad hæc malua decoctum, quod
etiam olei uicem pensat: utpote cum pingue sit, eno-
mendo lubricas uias & faciles reddit, deradique
corpora non finit. Quod ubi duratur in lapidem,
gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua
mul

LIBER SEXTVS. 257

mulsa, aut sicorum decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hiq; decocto malue proluendi.

Sanguis taurinus. Cap. XXV.

TAuri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatumq; concitat: faucium tonsillarumq; meatus cum nervorum distensione præcludit, lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quedam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimur: sanguinis enim globi attractu illo insublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiunt & aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese, auxiliatur: nec secus coagulum omne cum aceto & laserpitij radice, aut lasere: itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyxa folia cum pipere, et rubi succus ex aceto. Aluus resoluenda. Iis qui seruatur, stercorosa et fluida per sedem egeri consueuerunt. Stomachum aliumq; hordeacea faria ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatum. Cap. XXVI.

EOs, qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida, item

Kk

DIOSCORIDIS

succum, aut la serpitij radicē, aut la sercum posca-
thymumq; ex vino, & cum luto suo lixiuiam. Sed
nulla falsilago obijciatur, quoniam magis lac coiz-
ret, et in casum densaretur. Neq; illos vomere cō-
uenit: siquidem concretum lac sese in gulæ angus-
tias insinuans, strangulat.

Argenti spuma. Cap. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & inte-
stinalis grauitatem cū magnis torminibus ad-
fert, & nonnunquam pondere suo intestina vulne-
rat, urināq; supprimit: corpus intumet, plumbeaq;
deformitatem concipit. Quibus subuenit secundū
vomitionem, potum syluestris hormini semen, myr-
rhæ drachmæ octo, absinthium, hyssopum, apij se-
men, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum pa-
lumbis: finum, cum nardo & vino.

Argentum viuum. Cap. XXVIII.

Argentum viuum potum, eadem que spuma
argenti infert. eisdemq; vtendum auxilijs.
Lac copiose potū auxiliari constat: sed postea eno-
mant, qui auferunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

Cap. XXIX.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum,
pota, aluum & intestina cum vehemēti
erosione excruciant. Præbenda cūcta que
suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac sol-
uunt, & facilem lubricamq; aluum reddūt, cuius

LIBER SEXTVS. 258

modi ibisci et malue succus est: natura enim utriq;
perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel se-
men tragi herbe, vel oryzae, lacq; cum aqua mul-
sa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus. Cap. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium vi-
rus olent: procedete tempore, alius dolore
afficitur, & vrina sistitur: & si quando eam red-
dere contingat, purpureum colorem referet. Omne
piscis genus auersantur, et odio habent: foetido ac
gravi sudore manant: biliosus vomitus, interdum
sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum
lac asinum, vel passum continue, aut radicis mal-
ue foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radice
cum vino, aut veratri nigri, aut scammonij succi
drachma, cum aqua mulsa, puniciq; mali acinis.
Cedria cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut
tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuunt, asper-
nenturq;, solis fluuiatilibus cancris vesci possunt,
bibuntq; eos admisto vino, adiutiq; ab his perco-
quunt. Cumq; appetere et comesse pisce coeperint,
sue salutis iudicium habent.

Rubeta & palustris rana. Cap. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumo-
res ciēt: pallor corpus vehementer decolorat,
ut planè luxum spectetur: spirandi difficultas
torquet, & grauis halitus oris, singultusq; et in-
uita interdum genitura profusio consequitur. Ad-

Kk ij

DIOSCORIDIS

inuuantur secundum vomitionem multo meri potu,
& arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi
totidem. Breuiter, cogendi sunt ut vehementi am-
bulationi & cursui se credant, ob torporem quo
corripiuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo.

Cap. XXXII.

DEuorata cum aqua hirudines, si ori ventriculi
adherent, tractione partium, nonnullam su-
ctionis imaginem præbent: eo enim argumēto hau-
sta hirudo deprehēditur. Has muria sorbitione ex-
cutit, et cyrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut
beta, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca.
Nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum
sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, inie-
cta lupinorum farina, aqua frigida ore contineas-
tur, et ad eam hirudines exilient. Prouidendū etiā
ijs, quæ etsi ferendi auxiliū gratia tradantur, non
minora tamen ceteris venenis pericula sæpius ad-
ferunt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, ela-
terium, agaricum nigrum: si quidem ea strangula-
tus concitant, aut immodicas deiectiones mouent.
Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentione
& similibus retulimus. Nimios aut deiectionū im-
petus, medicamētis, quæ excremēta supprimūt, co-
ercebimus. Neq; negligēda quæ parū quidē nocere
vidētur: iterim vero vitā i descrimia agūt. Quo i
numero sūt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pap-
pi recētes: flores aut sunt eius spine, quæ coctos di-

citur. Eos, qui sumpserunt, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. Cap. XXXIII.

Aqua frigida abundè pota, aut meracum vinum liberalius et otum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus et dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminetia solvunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hætenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatium est, præsertim & quod sanguine, et quod scinco temperatur. Verùm quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorū descriptione supersedemus.

Venenata. Cap. XXXIII.

DE bestijs, quæ virus eiaculantur, & exitialibus venenis, idè scribere aggredimur, ut tota curationis remediumque ratio ad umbilicum perducatur: si quidem pars hæc non minus quàm ceteræ aliæ, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisque alijs malis homines liberari conveniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam quid de feris virus inspuentibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficijs.

Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ

Kk ij

DIOSCORIDIS

sequi signa consueverunt, præmonstrabimus: tum
 quæ nonnihil auxiliij ferunt. Omnia autem in prò-
 ptu, & ad manum habere artificem oportet, pro-
 pter urgentem sæpenumero necessitatem: si quidem
 pauca e venenis & virulentis animantibus, tarda
 & grassantia sensim pericula cient, ita vt dilatio-
 nem admittant: pleraque verò præsentaneam per-
 niciem afferunt. Hominũ autẽ partim malè alijs
 cogitantes, ingenita prauitate maleficium ita tẽpe-
 rant, vt spatiũ curanti liberũ non relinquunt: par-
 tim sceleris admissi conscientia, aut tristi aliquo
 euentu oppressi, hausto sponte veneno, mortem sibi
 consciscere conantur. Qui postea deprehensi, aut re-
 sipientes, & vitæ cupidi, præsentaneam opem po-
 scunt. Non desunt, qui hostiles sagittas illinentes,
 aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes,
 certam & ineuitabilem aduersarijs perniciem mo-
 liuntur. An quibus ipsis etsi maleficium non subito,
 sed aliquantò post grassari natura sua compara-
 tũ est, tamẽ nisi primo quoque tempore coerceatur
 & remedijs subinde excipiat, frustra tandem
 succurritur, occupatis iam corporibus exitiali vi ve-
 neni. Proinde non vulgari industria diligentiaq; in
 ea re vtendum est, vt quod in alijs incommodis ars
 consuevit, in his quoque salutem mortalibus præ-
 beat. Quin & apud priscos genus hoc vnum exi-
 stimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pug-
 nat: sed recentiores id ipsum discreuerũt, nominã

tes præcautionem, & modum præcauentem, salu-
bris sanantisq; mediū statuentes, parua & leui su-
pra modum persuasione decepti. Siquidem treis in
humanis corporibus constitutiones esse contendūt:
vnā, qua sani degimus: alterā, qua sinistra vale-
tudine corpora laborant: tertiā, quæ medium inter
utrasque locum sibi vendicat. In qua positi, sanita-
tem specie mentiuntur, facileq; in morbos & peri-
cula concidunt, ob vim corruptricem, quæ corpori-
bus nostris incumbit. quemadmodum in ijs videre
licet, quos excādescens rabie canis momorderit, nec-
dum tamen aquam horrent. In ijs quoque qui can-
tharidas hauserunt, sed nondum vrinæ tormento
cruciantur. Tripartitō igitur artē digeri, tripliciq;
corporis constitutioni meritō respondere trahunt.
Salubrem partem esse volunt, quæ sanitatem tue-
tur: præcauentem, eandemq; prohibentem, quæ ob-
stat quò minus in morbos incidāt: & sanantem,
qua vitia discutiuntur. Quibus ita responderi po-
tēst, quòd primū ex ista ratiocinatione nō treis
corporis tantū, sed quatuor haberi constitutio-
nes fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui nec-
dum morbo laborant, morbo tamē maxime ob im-
pendentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam
priori morbo defuncti, nondum tamen secundæ va-
letudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à mor-
bo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui vi-
riū recreationem & robur desiderant. Sed quē

DIOSCORIDIS

admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus utimur auxilijs, altiore scarificatu, vstionibus, amputatione, derodētibus epithematis, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enim vero sunt vsque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem apponent, quæ morbos arceant. Cuius sententiae inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tum agēdi modus, omnino auxiliarem remediariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, et in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam arcendorum morborum rationem: quippe cum firma redlere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis conflictentur. Neque id silentio prætereundum, quod maxime præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare convenit, affectus, qui à vi

rulentis animalibus venenisq; contrahuntur, voca-
 ri cecos, id est, quorum ratio minimè iniri potest.
 Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter
 sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus ob-
 servatorie artis, et eius, quæ ratione fulciatur, an-
 numerari solent. Neque prorsus verum deprehendi-
 tur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam quod sem-
 per se protrahit, & nullum in quibusdam necessa-
 rijs vsum exhibet, haud facili coniectura colligi po-
 test: etsi naturæ proprietate prorsus cecos eos affe-
 ctus concedimus, qui ab exitiis venenis, et ani-
 mantibus, quæ virulento morfu sæviunt, contrahū-
 tur. Nam quod ad opus nonnullum vsum præbet,
 datq; medendi occasionem, neque imperceptibile,
 neque cæcum, nullius causæ obnoxium reputatur:
 se magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem
 se habere, & opinionem abditorum cognitione con-
 firmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm
 ut sensibus percipiantur, evidenter tamen ex ipsi:
 inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in
 eo commentario quem Plinarcho dicant, satis mo-
 dos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nosse quis
 hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis,
 & scorpionibus, & reliquis id genus, secum ani-
 mo reputans, ut quavis exiguo sint corpore, vixq;
 conspectui subiiciantur, magnorum tamen discrimi-
 num ac dolorum causas inferunt: quorum ni-
 hil præter quandam corporis exiguitatem, vimq;

DIOSCORIDIS

*praeter ceteris animantibus datam illis, facile fuerit
 spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quae
 a scorpijs ictu, & aliorum id genus venenatorum,
 qua nos morfu conficiunt, attingitur? quorum ali-
 qua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt,
 & putredines cient, nec desunt quae praesentaneam
 perniciem moliantur. Aut quantulum est quod à
 phalangij morfu ingeritur, & vniuersum corpus
 excruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorum
 deprehendere posset, cum prorsus exigua mole con-
 stent. Ergo quod haec ad affectus referantur, con-
 stitit inter omnes. Verum quod exactè deprehen-
 sum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quae
 insinuata corporibus molestiarum, quae exoriuntur,
 nobis causa sit, in confesso est, & omnium consen-
 su persuasum. Nec quisquam inuenietur vsque adeo
 contentions studio flagrans, qui aliunde exoriri mo-
 lestias asseueret, quam à materia mortifera partem
 corporis attingente. Porro id erat, quod inter utilia
 artis opera in omni opere dicere oportuit, quenam
 res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos ledat, in-
 comprehensa communis causae, quae proprijs inest
 ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit
 cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum
 pertinaciam graui cauillatione incessens, cecis affe-
 ctibus causas assignauit, inficiatus his communem,
 & supremam morborum causam incomprehen-
 sibilem esse: & hanc in eo, quem de causis scripsit*

commentario aptissimè prodidit, candido signatâ
 lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in
 quibusdam, ut in venenis, serpentium ictibus, &
 ceteris id genus trita medendi ratione contentos es-
 se. Neque satisfacturam sibi observationem eam,
 quæ à causarum comprehensione separata est. Pri-
 mum enim genere comprehendere facile possunt.
 Quod autem sit lethifera vis, corporaq; permutans,
 ita ut perimat, ex ijs, quæ per genus, non per specie
 vagantur, curationem indicat, qua hæc hebetare,
 & prorsus expugnare liceat. Cum verò subiūgit:
 Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis,
 & ante observationem ad vomitū, ad vulneris di-
 latationem, ad demorse partis suctū, cucurbitulas
 adfixit, partem incidit, vrentia medicamenta, aut
 ea quæ vim eandem adipiscuntur admouit, postre-
 mō partem amputauit: secū reputauit medicami-
 na, quæ per summam cutim ferre, & applicari so-
 lita, immisse ad intima perniciæ repugnarent.
 Hæc itaque, quæ disseruit Erasistratus, veritati cō-
 sentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodi-
 cos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus
 illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse cau-
 sam diffiteantur, verum rudiusculè nomini at-
 tendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθορο-
 γοῖς, id est mortifera, nominatur: φθορογοῖς
 autem nullius officij alius esse potest, quàm cau-
 se. Aiunt hæc nomina, μαρτοῖος & ἀν-
 ατοῖος.

DIOSCORIDIS

καλὸν ὅτι τὰς, esse reliquis omnibus similia, in quibus
 partes quaedam dictionum non pro virtute, sed nuda
 enunciatione comprehenduntur. Enimvero quæ
 admodum in his uocibus μαλ' ὅσι πος & ἀνακαλὶς
 πται, partes neque certos, neque principes retinent
 significatus: sic in hoc uerbo φθοροποιεῖν partes
 productionis gratia, non pro uirtute coaluerunt.
 Hinc ad causarum differentias transeunt, affir-
 mantq; causarum aliquas evidentes esse, quæ dum
 aduersam ualeitudinem creant, separantur: cuius-
 modi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quas-
 dam continentes, quæ permanent postquam mor-
 bum excitant, hoc est, quibus præsentibus, & ef-
 fectus eorum adsunt: incrementibus, effectus au-
 gentur: decrementibus, minuantur: & cum desi-
 nunt, idem finiuntur: quibus solis ac per se ma-
 nentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia qui-
 dem receptissima sunt causarum discrimina, quo-
 rum nulli phthoropœon subijci potest. Evidens
 enim causa nō est, quoniam morbus ipse perma-
 net, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens
 causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit:
 quemadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt
 demorfi. Quod si neque evidens causa, neque
 continens fuerit, neque per se, neque alterius con-
 sortio causa erit. Quod si à nulla causarum diffe-
 rentia phthoropœon deducere possumus, con-
 sequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod

LIBER SEXTVS. 263

autem asserunt, vocabula quædam in se non habere
 re parteis rerum significatrices. sed nuda, & simplici
 pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia,
 sed per pauca talem nancisci conditionem existamandum est: neque enim $\pi\alpha\iota\delta\epsilon\iota\varsigma$
 in hoc nomine $\phi\theta\omicron\gamma\omicron\omega\tau\omicron\upsilon\varsigma$ perinde atque assumpti-
 tia profertur, sed longè principè obtinet significa-
 tionem. Quemadmodum enim $\phi\theta\omicron\gamma\alpha\varsigma$, id est corrup-
 tionis nomen mutationem in peius significat, sic
 hoc verbum $\pi\alpha\iota\delta\epsilon\iota\varsigma$ sumi debet, ut nihil amplius ex
 eo quod hæc dictionem $\phi\theta\omicron\gamma\alpha\varsigma$ secum habeat, decla-
 ret. neque prorsus id significat, quod omnes palam
 audiunt, et huic simile redditur, $\pi\alpha\iota\delta\epsilon\iota\varsigma$ $\chi\epsilon\iota\varsigma$ $\delta\iota\phi\theta\alpha\varsigma$.
 Si dant à corruptione sanis fieri morbum, conce-
 dunt utiq; vim in huiusmodi verbo $\omega\tau\omicron\upsilon\varsigma$ subes-
 se, siquidem aliquid est quod corruptionē efficiat.
 Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per
 singulas causas, quæ corporibus subiiciuntur, idq;
 tam in lethalibus venenis, quam in iis, quæ corpo-
 ribus ingeruntur. Verum nonnihil subiacere cau-
 sarum differentiis produnt. Quinetiam aberrar-
 runt, non ex auctam diuisionem assumentes. Qui
 vero se dogmaticos profitentur, causam esse par-
 tim preparantem, partim continentē asserunt: ut
 inguinū vlcus, et inguinariam febrim, et quæ affe-
 ctui tum assistat, tum etiā separetur, ut à fractis
 præcipitatio. In summa, quoties quidpiā suapte na-
 tura causa fuerit, nec vlla diuisione cōprehēditur,

DIOSCORIDIS

vitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ
idem genus sortiuntur. Sed quod phihoropeon cau-
sa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quæ
contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causam
arbitratur esse post impressum à serpentibus ictum,
quàm ex animante vim, & illapsam in corpora
virus? Neque enim frigus, neque æstus, neque sectione
corporis, neque cruditatem, neque aliud quicquam si-
mile causari possunt. Verùm quoniam causarum
differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias
evidentes appellant: ipsis dicendum, utroque istorum
modorum evidentem quidem causam esse, quod ef-
fectum præcedit, & quod corporis substantiam
præoccupat: continetem vero, quod morbis præsen-
tibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa
euenerant. Sed de ijs hæcenus. Statuendum itaque
mortiferam vim intrinsecus manifestissimam esse
causam, ipsamque principem facere scopum oportet.
Et antequam ad ima decumbant morbi, varijs
modis est certandum, donec vis tota corporibus ex-
cutiatur. Modo enim reuocari debet ea parte, quæ
pestis intraverit: modo aliqua alia, præsertim prin-
cipatum non obtinente, aut è coerceatur, quàm al-
tius irrepens viscera tægat: aut eius perniciēs elua-
tur, retundaturque, cum iam membratim peruaga-
tura est. Atque venena si hausta sunt, crebris vo-
mitibus: si morfu impressa, scarificatione, affi-
xis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione,

nonnunquam amputatione extremae partis, euocantur. Retinentur vero infusione, et imposito medicamentorum acrium cohibetur. Haec simul utique arcere virus, & eluere possunt. Restinguuntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quae acrimonia sint praedita. Postremo deiectione alui, euocatus sudor, et alia quaedam in commune, quae membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enimvero non lethiferam modo materiam, sed & magnitudinem, et tempus, prospicio considerare oportet. Etenim ab ijs remedia quam plurimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pericula minantur: alia putredines altas aut exteriores excitant: alia vehemētissimos dolores aut cecos cient: alia vis medicamentis cedunt, & magis minusue molestias excitat. Oportet autem ea, quae pericula ferunt, peruicacioribus auxilijs expugnari. & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segravioribus medicamentis homines in discrimē adducere: in minoribus uero, uehementium auxiliorum iniuria corpus laceffere. Finitio à temporibus in promptu est, hoc enim subito in pericula, & praesentes molestias adducit: illud uero sensim, & dilatas in diem longam aut breuiorē producit. Itaque in acutis quidem cōfestim multa simul auxilia representari oportet: reliquis, paulatim. Haec quae

D I O S C O R I D I S

Iam artis formula breuiter definita sint. Iam me-
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforum
ab eo. Cap. XXXV.

DE rabiosi canis morfu sermonem alijs prepo-
suimus, quod id animal domesticum ac frequens
esse consuevit, & in rabiem sepius agitur, ac pe-
rit, ab eoq; cauere difficile: inde periculum inuita-
bile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs.
Canis plerumq; flagrantissimis aestibus in rabiem
efferatur: interdum quoties frigora inceserunt.
Rabiosus autem potum, & escam auersatur: larem
spumantemq; pituitam naribus, & ore proij-
cit: toruere & solito tristius intuetur: in omnes pas-
sim sine latratu irruit, & aequas hominesq;
tam familiares, quam ignotos mordet: nec protin-
us infestum quicquam infligit, nisi, ut vulnus, do-
lor: exinde morbus ille, qui ab aque metu hydro-
phobicus Graia est voce appellatus, contrahitur.
Eueri autem cum distentione neruorum, totiusq;
corporis rubore, praesertim faciei, cum sudore, &
lauguore quodam. Aliqui aures splendorem fugiunt:
alii sine ulla doloris intercapedine vexantur. Sunt
etiam, qui canum more latratus edant, & obuia
factos morfu adoriuntur, ac mordendo simili vitio
labefactant. Proinde ex ijs, qui hoc vitium senses-
runt, neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex
historia unum aut alterum euasisse audiamus: si quis
dem

dem Eudemus superasse quendam affirmat. The-
misonem aliqui demorsum in hunc furorem inci-
disse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico
aquâ expauescenti morē gereret, & officium exhi-
beret, quadā naturarū concordia similē contraxis-
se affectū: sed post multos tandē cruciatus seruatiū
extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo
multos, antequā ipsam experirētur, uindicauimus:
& complures ab alijs medicis seruatos nouimus.
Remedia demorsorum à cane rabioso.

Cap. XXXVI.

Ratio medendi duplex: una cōmunis, qua
utendum in omnes morsus, quos uirulē-
tē animantes impresserunt: alia peculiaris
priuatāq; eorum duntaxat, quos rabiosi canes mo-
rderint: quæ nonnullis quidem summam opem
ferre consuevit: alijs uerò inutilis, maximè qui ex
multo iam tempore ictū acceperunt. Quæ ad hanc
pertinent, primū exponemus, deinde cursim per-
stringemus, quæ ad communem medendi rationem
pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmentis
albæ uitis tremare oportet, & cinerem eorū quā
minutissimè tritum habere reconditum: itidem gē-
tiane radicem tusam cribratāq; reponere. Quo-
ties autem canis rabiosus morsum intulerit, in qua-
ternos cyathos meraci uini, bina cineris cancro-
rum cochlearia, unumq; gentiane coniiciantur:
hec in polentæ dilutioris modum subacta, quatri-
L!

DIOSCORIDIS

duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morfu bini terniue dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque vnum satisfecit, eoq; cum fiducia vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil ceteris vti prohibet. Satius autem multò fuerit etiamsi in vanum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac desidiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, et vlcusculis cutis similia: quippe maiori uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In vtrisque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitulae cum multa flamma agglutinate id iuuamenti praestant, vt veneni vis extrahatur. Contra virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, vtpote cū ignis cetera viribus praestet, simul quod virus domet, & ferri penitus non patiatur: simul quod pars igne experta, postea non vulgare

fundamentum curationi futurae præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crusta decident, ne vlceris ora coalescant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest ad multum, idque præstitutum tempus, vlcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optime præstabit, & syluestre allium detritum: item cepe, succusque, præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, quam non mansa imponantur: siquidem subacta pistane à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verum id certum non est. Cæterum tempestiuus eorum vsus minimè est contemnendus. Si verò, quod per sepe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturque, manum postulabunt. namque eas didacere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inuere, expedit. Vbi vero propositum tempus præterit, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod e salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multo post sinapismo vtendum.

Ratio uictus in morfu rabiosi canis.

Cap. XXXVII

QUæ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum uictus ratione ex ijs quæ veneno aduersantur, conie-

Ll ij

DIOSCORIDIS

Etura quadam colligere oportet, simul ut veneni vires hebetet restinguatq; simul ut arceat, quò minus ad intima pernicies illabatur. Etenim assumpta, perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorum utrumque præstare potest vini meracioris, passi, & lactis potus: quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quod omnem eius acrimoniã obtundat. Simili modo alliorum, porrorum, cæparumq; cibis: quòd ea difficulter cõficiantur, vixq; aboleantur. Nã multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vsus accommodatur, & theriaces, Mithridatij, & eius, quod eupatorio temperatur. Denique omnium, quæ magnam aromatum partem sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantijs egrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet: Nosse conuenit, pauorem aque non statò definitoq; tempore exoriri: plurimùm tamen ad quadagesimũ usque diem neglectis differri cõsuevit. Post semestre etiã nonnullos inuadit: quendam post annũ aquam horruisse constat. Quæ nobis visu comperta fuere. Narrat & aliquos post septennium aque metu fuisse tentatos. Auter principia demorsorũ à cane rabiosa curandi ratio talis est. Verũenimvero si ea, quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermisã fuerint, nec scalpro carnẽ

circinare, nec vstionem experiri operæpretium est. Non enim quod iam pertransiit, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut vtilitas, sed incassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis modus accedat. Deiectio magnum præbet iuuamentum, utpote cum mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ colocynthidem recipit hiera. Item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Ceterum sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi sinapismiq; alternatim per corpus totum adiiciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus uti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam, qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam vitio têtatos nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curâ contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus: iam ad alia, quæ venenatis morsibus seuire consueuerunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus cõuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus eo, quæ sua proprietate nonnullis auxi-

DIOSCORIDIS

lium præstare possunt. Postremò subnectètur etiam
venenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à uenenatis demorsi
sunt. Cap. XXXVIII.

DEmorsis à phalāgyis locus quidem ipse, quasi
ab impacto aculeo rubet, nō intumescens, nec
per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit:
ubi verò contrariorum occurso refrixit, cōsequitur
corpore toto tremor, distēt ones poplitum & ingui-
num, cōuulsionibus non dissimiles. In lumbis colle-
ctio exoritur, et perpetua vrinae libido laceßit, mule-
taq; reddēdis excrementis colluctatio. Vniuersa cus-
te frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offus-
sisq; nebulis caligāt. Si scolopēdra aut dicta ophio-
etene, morsum intulit, locus per ambitum liuore su-
gillatur, & computrescit: interdumq; , licet raro,
feculentas atque ruber cernitur. A morsu ipso ex-
ulcerari locus incipit, ulcusq; id negotium exhibet,
ferè remedijs inuictum: præterea toto corpore pru-
rigo sentitur. Scorpionis morsu inflammari sta-
tim incipit locus, & indurescit, ac intentus rubet,
uicissimq; dolore premitur. Modò siquidem ex-
æstuat, modò frigore occupatur. Labor repentè fati-
gat, & aliquando meliusculè habet, aliquando ue-
rò recrudesceat. Consequitur sudor, horroris sensus,
& tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt,
inguina extolluntur, per sedem flatu exiunt, capil-
li eriguntur, pallor membra decolorat et dolor, tã

quam ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur. Si marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidue conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. Mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olēs excernitur. A mure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens vlcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas vrinæ, & frigide asperginiis offusio consequuntur. Si vipera momordit, corpus intumet, vehementer arescit, subalbidumque colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primum suppinguis, mox cruenta: pustulae adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit: gingivæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erumpit: tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Consimilia eveniunt ijs, qui à cecilia nomine, aut amphibæna demorssi sunt, eademque ferè auxiliantur: quare hoc venenum priuatam descriptionem sortitum non est.

DIOSCORIDIS

neque visum est dignum quod alio genere comprehendatur. A dryino morsis pustula molestiq; dolores incidunt, præsertim quâ diluta saniei emissariû subest. quinetiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab hæmorrhoo ictis vehemētes cruciatus accidunt, qui angusta contractaq; corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit: et quæcunque parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur, profluensq; sanguis in globos coit. A pu'none sanguinem extusunt, & in vomitiones effusi sine remedio cōmoriuntur. Quos dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisq; vsque eò pertinax, vt satiari non possit, ac sine vlla intercapedine excruciet: etsi potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. Quare propter continuam sitim, & præster, & causon, aut dipsas appellatur, Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & lividum ac ingens euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malo olēs, non secus atque ijs, quæ serpunt vlceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est, putridum vlcus sequitur. Carnes antea, vt in aqua inter cutem, prætumide, defluunt. Lethargo corripiuntur, & veterno pressi somno captant. Erasistratus eos iocinere, intestino ieiunio, coloq; conflari author est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferè

partes corruptæ reperiuntur. A ceraste percussis locus attollitur, cum duritiæ pustulosus. E plaga sanies profluit, modo atra, modo pallidior: sed toto cōcretu varicosus intumescit genitale intēditur: mēs labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore nervorum distenti commoriuntur. Ab aspidē iētis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino levis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrē cecinit: At vir perit absque labore, virens atque discolor. Mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellit: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent. Hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro, quē de medicaminibus & venenis condidit, de vocato basilisco scitē ita refert, Cum basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus eiaculantur, comites notæ ita se habent. Transeuntes utique ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

Communis curatio in omnes iētus virulentos. Cap. XXXIX.

ADuersus quidem omnem animalis iētum. Quod venenum vibrat, oris suēctio conuenit. Sugentem verò oportet ieiunum non esse, sed & ci-

DIOSCORIDIS

bum sumpsisse, & vino os abluisse: postea exiguum
olei in ore continens plagam exugat. Locus ipse
spongia fouendus, deinde scarificandus: sed vlcus-
cula altius imprimere expedit, quo virosa mate-
ries profundo euocetur. Circinatio autem carnis,
& sectio, scarificatione longè potentius opitulan-
tur: nanque ab ijs duo peculiaria presidia fiunt.
Vnum, quod virus è loco tollitur. Alterum, quod
eius veneni pars, quæ ad interiora grassatur, cum
multo copiosoq; sanguine excernitur. Quod si locus
sectionem non admittat, cucurbitule cum largiori
flamma adfigende sunt. Sed iam de vstione supra
in rabiosorum morsu differuimus. Si verò icta pars,
utpote extrema, eam sectionem commodè non res-
puat, præsertim in omnibus serpentium ictibus,
ut aspidis, cerastæ, similiumq; proculdubio ampu-
tanda est. Conuenientiora supra dictis auxilia
sunt, quæ epithemata vocant. Imponatur sarmen-
titius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio stillatio sub-
actus, garo, & acris salsamento: porri, cepæ, & al-
lia modo minutissime contrita illinuntur, modo cre-
mata vulneribus iniiciuntur. Quinetiam dissecti
gallinarum pulli, cum maximè tepent, percussio lo-
co applicentur. Nec desunt qui hisce tanquam dis-
cordia quadam naturali pugnantibus utantur: ve-
rum huius rationem inire facillimū fuerit. Galli-
næ enim calida natura prædite sunt, argumento,
quod deuoratum insigne virus cōficiunt, & aridis

sima quæq; semina consumant, item nōnunquam
 arenas lapillosq; ingluvie sua deuoratos, dissoluūt.
 Itaq; animātis admoti calore adiutus spiritus, ab
 ista parte impetū capeffens exiliensq; secum vene-
 nū exigit. Nec me fugit quid in Aegypto fieri so-
 leat. Cū spicas Aegyptij metunt, ollam picis para-
 tam habēt, & appensam fasciam: tunc enim ma-
 ximè serpentū iniurias expauescunt, tum propter
 spicilegij tempus, tū quòd opacis simul abdite spe-
 luncis & cauernis, densoq; aruorum cespite delite-
 scunt. Molestissima enim animalia et virus eructā-
 tia, Aegyptus in cāpis ferre cōsuevit. Vbi ergo aut
 in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt,
 qui adsunt, fasciam in ollam picis coniiciunt, &
 semel aut iterum brachiū aut crus paulū supra
 vulnus obligant, & arctissimè duo è præsenti-
 bus distringunt, locumq; secantes, qua circumactus est
 laqueus, picem instillant. Cumq; satis vulnus exce-
 pisse videtur, laqueum resoluunt, & cæpis alijsq;
 suprā memoratis illiniunt. Præterea pix liquida cū
 sale trito & feruente illita, præsenteo est auxi-
 lio, si iugiter innouetur. Conuenit & cedria, & fi-
 mum caprarum ex vino decoctum. Locum aceto ca-
 lido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida
 muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam nō
 desunt emplastra vehementissima, & calidissima,
 quæ venenū elicere, expugnare, et discutere possūt.
 Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, &

DIOSCORIDIS

cachrye componuntur: de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incesit, qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephanti fel, crocodiliue sanguinem, ouaq; testu linis, & consimilia. Nam cum iuuantia quædam literis tradidisse videntur, plane in hæc sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cum difficile, nisi regia facultate, peruestigari possint: neque, quò nostra fides ijs obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentum præstiterint. Quæ autem ad communem omnium usum pertinent, quæq; facile suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaque, & erica, & astra galus, cum aceto pota, contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virentes platani pilule in vino diluto coctæ, & paliuri decoctum: radix aristolochie, & eryngij: decoctæ etiam lauri bacce & deuorata, piperq; largius esitatum, ruta, anethum, et cyclaminus: coma porrorum priuatim ex pane aut allium, aut cepe, salsamentaq; quàm acerrima: origani decoctum cum vino potum, sceniculi, pulegij, calaminthæ, porrorumq; succus cum melle desorptus. Hæc quidem à plantis conquiruntur. Ab animalibus verò quædam utiliter peti solent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum cum vino, itidem castorij sextans: testes mari-

na testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxiliaia medicamenta est. Comendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent, hæcenus. Percussus à serpente prodest alui deiection, diffluens sudor, urina copiose reddita. Sunt & compositæ quedam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum uino. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones trite, & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent: dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia uirulentorum
ictuum. Cap. XL.

INter ferientium uenenatorum notas nihil de uestpis et apibus articulatim digestimus, quod conspicuæ omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus utrarumque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-

DIOSCORIDIS

neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fatus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerē, adiecto sale trito, & vino, imponere oportet, aut radicē sylvestris punice quā tenuissimē tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactā. Vlcera aqua maris proluēda, aut apiastri decocto, foliaq; eiusdem illinēda. Lauacris perpetim vtendum, & propinādum abrotono semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticem, & trifoliae herbae semē: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina cōuenit. Item myrice fructus & chamæpitios, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt qui fluuiatilis cācri expressi succum, cum lacte, assumpto apij semine, cōfestim molestijs liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sed quā leuissimē tritus ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta sylvestris superponēda. Locus acidus muria fouēdus, & dāda in potu aristolochia cum vino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussus à scorpione, presenti est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatū. Scorpium ipse, qui ictum vibrauit, tritus, & percusso loco impositus, suae plagae remedium est, ob cecam quandam naturarum (vt constat) discordiam, quae antipathia appellatur. Praeterea tritus & impositus cum sale, lini semine, & althaea, scorpium conuenit. Sulphur

ignem non expertum, resina terebinthina exceptū,
 & emplāstri modo adiectum auxiliatur. Itidem
 galbanum ad splenij formam ductū, & calamin-
 tha, quæ trita illinatur, & farina hor lei in vino
 parata, in decocto rute. Semē trifoliæ herbæ tritū,
 & vulneri iniectum opitulatur, Hæc ad affectum
 locum pertinet. Post hæc quàm efficacissimis po-
 tionibus vtendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præ-
 sertim corticis binæ drachmæ cum vino, tusa gen-
 tiana, & pulegium decoctū, & bacce lauri pau-
 co numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua
 magnopere discoqui debet: cupressus cum vino &
 ruta, nec secus ficulnæum lac, la serpitium, si adsit:
 sin desideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est
 potus trifolij, & ocymi semē. Horum autem om-
 nium vicem pēsant iugis lauacri vsus, euocatus su-
 dor, & dilute vini potiones. Ei, qui marina pasto-
 naca icitur, omnia quæ de viperarum morso paulo
 post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter
 autem ictus à marino scorpione, & dracone in-
 feruntur, qui molestos cruciatus cient: interdum au-
 tem, sed raro, nomas excitant. Quibus absynthij,
 saluæ, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit.
 Pastinaca diuulsa & vulneri imposita, sui ictus
 medela est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur
 ex galbano splenium, per se vulneri exterius im-
 positū, vt medicamēti modo aceto tritum, & hordea-
 cea farina cū aceto mulso illita. Quinetiā mus ipse

DIOSCORIDIS

qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus
sui ueneficia luit: resistunt quoque acini dulcis pu-
nici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita,
necnon aque calide fofus: sed hæc ad locum perti-
nent. Prodest potum abrotoni decoctum, maximè si
in uino detur. Præterea serpyllum, & galbanum,
& eruca uino madefacta, recentes cupressi pilule
cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyre-
thrum cum uino, & chamæleonis herbe radix.
Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt,
tritum murem araneum contra suos ictus commo-
de bibi. Quam historiã apud alios inuentam, di-
gnam duntaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij
asseruerant demorsum non aliàs exulcerari, nisi præ-
gnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari fe-
runt. Si uiperæ morsum impressit, finum caprinum
cum uino, studiose impositum opitulatur. Item lau-
rus, & abrotonum, & galbanum splenis loco sus-
periectum, & origanum uiride inditum. Pulli galli-
narum discerpti, & confestim admoti: erui farina
uino subacta: radice cortex usque eò tusus, ut in
puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum
chamæmelum hordeaceæ farine cataptasma in
aceto mulso preparatum: sed locus antè eo calido
foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos
ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam te-
nui folio constantè auxiliari produunt. Leporini co-
agulæ in uino terni oboli bibuntur, et porracei succi
hemina

hemina in mero, & foliorum apiaſtri ſuccus, & ſylueſtris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia m. idenda, & capæ, & porri recentes, ſalsamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc ſunt. Percuſſis à vipera præclare auxiliatur medicamētū, quod myrrhæ, piperis, caſtorei floris portulacæ ſeminisq; dimidio acetabulo cōſtat: hæc oīa in Gretico paſſo teruntur, aut in alio probato. Eraſiſtratus ī eo libro, qui περὶ δυνάμεων, id eſt de viribus, inſcribitur, pleraq; alia tradidit, quæ iſtis ab vipera auxilium ferre poſſunt: inter quæ talia maximè laudātur, Gallinacea cerebella cum vino pota, ſemen ſatiuæ braſſicæ tritum, & acetabuli mēſura cum vino potum. Quinetiam bonum eſt digitum in liquidā pacē intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc ſunt, quæ contra viperae iſtus auxiliantur. De amphiſebena mentionem hoc loco fecimus, quoniā ſerè re medijs ad viperas ſcriptis, percūſſi ab ea adiuuari ſoleant. A dryino iſtus conuenit ariſtolochia cū vino pota, trifolium herba, radix haſtulæ regiæ ſimiliter aſſumpta, et fructus ex omni quereus genere, & tuſæ ilicis radices, & illitæ parti iſtæ auxiliantur. Hæ morrhoi diſſadisq; morſus velut ī medicabiles à plerisq; maiorū deplorati relinquebantur: quare ſi peculiaribus cōtradipſadē remedijs egeamus, cōmunia experiri operæpretiū erit. Protinus autē ſcarificatione vti, vſtionem facere, et ſi locus

DIOSCORIDIS

patiat, extremorum amputatione opus erit: con-
 sequenter quàm acerrima cataplasmata admove-
 re, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit,
 acres cibos, maximè à salsamentis, vtilis esse. Me-
 racæ potiones et lauacra prosunt, quæ subinde in-
 teriecto breui spatio assumenda sunt, priusquam
 morbi genus emergerit: quo semel erumpente, opem
 ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæmor-
 rhoi eadem prosunt. Insuper quæ in commune opi-
 tulantur, vt scarificationes, vstiones, acres cibi, me-
 raci potus, & quæ nunc in dipsade definiuimus.
 Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle tri-
 ta. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tri-
 tum & aqua subactum, lixiuia cum oleo indita,
 aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minis-
 tim contrita, & hordei farina cum aqua & mel-
 le colliquata. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ
 drachmæ in potione poscæ cyathis duobus deinceps
 marrubij succus, vel decoctum alterius cum vino.
 Fauus recens datur in aceto. Morsus à cenchridio
 auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus,
 & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllū
 cum duabus hastulæ regiæ drachmis, & tribus
 vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Item carda-
 momum & gentiana. Si cerasites percusserit, cita
 partis amputatio suffragatur: quare sine mora
 ictam partem amputare, aut scalpro confestim
 circuncidere, & ijs similia prosequi oportet. Vren-

LIBER SEXTVS. 274

tia insuper reliquiis admonenda, siquidem virus
hoc veneno basilisci simile est. Ius, qui ab aspidē fe-
riuntur, quæ de ceraste scripta sunt auxilia dari
debent. Nam venenum hoc, quemadmodum basili-
sci, aut sanguis bubulus, celerrimè in arte-
riis sanguinem cogit. Ad basilisci mor-
sum, vt Erasistratus author est,
auxiliatur castorii drach-
ma in vino pota: item pa-
paueris succus.
Ictuum reme-
dia ita se
habent.

SEXTI ET VLTIMI
LIBRI FINIS.

Mm ij

NOTHA ET DIOSCORIDI

falso adscripta, quæ ut facile, si quis
ita uelit, suis singula locis appli-
centur, numeris notantur.

5. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs thelpide, ab
alijs vrania, à nonnullis catheron aut thauma-
stos, à Romanis marica radix, à quibusdam gla-
diola, ab alijs opertritos, ab alijs consecratrix, ab
Aegyptijs nar appellatur.

6. Aliqui choron aphrodisias, Romani vene-
ream, aut radicem nauticam, Galli piper apium
vocant.

6. Romani iunci radicem aut iuncum.

9. Magi sanguinem Martis, Latini perpensam,
alijs bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij cerea,
alijs nardum rusticum, Galli bacchar, Hetrusci sue-
cinum: odorata herba est, qua in coronamentis
utuntur.

10. Quibus odor inest cinnamomo proximus:
asperum siccumque solum amat. Eius radix, rus-
ptis, conuulsis, in tussi vetere, & spirandi difficul-
tate, & si vrina ægrè redditur, opifera est: menses
ciet, contra serpentium ictus, eam in vino bibere
salutare est. Folia, ut quæ adstringant, illita capie-
tis doloribus, oculorum inflammationibus, incipiē-

NOTHA.

tibus ægyptijs, mammis tumentibus à partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnū gignit. Crate nas herbarius de eo ita scriptum reliquit: Asarum.

14. Alij sphagnon, alij phasganon, Syri diaxyelon vocant.

16. Ab aliquibus caſtor, ab alijs cynomorphos, à Magis Herculis sanguis appellatur.

16. Symphyton aliqui vocant, alij persicam, alij medicam, alij oreſtium, alij neſtario, alij cleoniā: alij ideamboton, aut phlomū idem, Latini termīnālium, aut enulam campanam, Aegyptij lenen.

36. Iuniperum paruum Græci arceuthida, alii qui mneſitheū, alij acatalidem. Aphrixuorinſipet, Aegyptij libyum, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant.

37. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus magna, quā aliqui ſylueſtrē cupreſſum appellāt, alij mneſitheū, alij acaterā, Romani iuniperū, vulgò cognita eſt, cupreſſo aſſimilis: aſperis maritimisq; locis plerūq; naſcitur, eaſdē quas ſupradicta vires habēs.

37. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Romanis herba Sabina appellatur.

40. Rhamnum alij perſephonion vocāt, alij leucacantham, Romani ſpinam albam, aut cerualem ſpinam, Aphri atadim.

40. Halimum alij damafonium vocant, alij erymon, alij britanicam, alij rhabdon, alij baſilion, Magi Mercurij baſim, aut Oſiridis diadema, alijs

M m iij

DIOSCORIDIS

ely Stephanon, aut sacrum caule, Pythagoras anthe-
noros, Aegyptij asontiri, alij asphen, alij ascaluri,
alij asariphen, Latini albucium aut ampeluciam.

45. Agnon aliqui agynon, alij lygon vocant, alij
amictomienon, alij tridactylon, Magi semnon, alij
hamaideos, Aegyptij sum, Romani salicem maris-
nam, alij piper agreste, alij lecristicum.

63. Eorum venter sale conditus, & in umbra
siccatus, contra eximias vacuationes medicamen-
torum, trium drachmarum pondere, presenti est
auxilio: quandoquidem protinus deiectiones cohibet.
Teri autem debet in farinam, et aqua subactus dari.

81. Telin, alij carpon, alij buceron, alij egocero,
alij ceraitiden, Latini foenum graecum appellant,
Aegyptij itasin.

82. Aliqui linocalamin vocant, alij annon, alij li-
von agrion, Romani linum, Pœni xeraphoes.

84. Thermon, Romani lupinum, Aegyptij bre-
chon vocant.

85. Gongylen satiuam, alij gongylida, alij golz-
gosium, Romani rapum vocant.

85. Alij polyides eryngium, Aphri thorphat

86. Sylvestris raphanus quam Romani armo-
raciam vocant, alij montanum raphanum, alij
apium, alij ischada, alij chamaebalanum. Romani
etiam radicem sylvestrem: ramulos tenues, iuceos,
duos siue tres spargit, rubentes: folijs rutæ sylue-
stris, oblongioribus, & angustioribus: semine par-

uo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyrri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radicis superior vomitione bilem pituitamq; extrahit, inferior per aluum, tota susq; deq; purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernat succus pinna eximitur. Is sesqui obolo potus, vtraque parte purgat.

86. Romani napium dicunt.

86. Aegyptij echlotripam appellant, alij riplā, Romani blitum, Daci bles.

86. Pythagoras anthema vocauit, Zoroastres diadema, Aegyptij chocortem, Magi lienem caprae, aut muris vrinam.

87. Atraphaxin, Romani atriplicem, Aegyptij ochi vocant.

87. Cramben Romani brassicam vocant.

87. Romani rusticam appellant.

88. Portulaca syluestris. Cap. Syluestris portulaca, quā aliqui aizō syluestre vocāt, alij telephio, Romani illecebrā, aliqui portulacā, Aphrimœmoe, Daci lax, Aegyptij mochmutim, folijs pusillis, ad satiuā accedētibus, hirsutis, latioribus. nascitur in petrosis, nonnunquā in hortis, folia oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubētes cauliculos, ex vna radice multos, in terra sessiles, qui māducati bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantū salusti. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: discit

DIOSCORIDIS

Arum, cum axungia illita.

89. Aliqui petreon, alij myacanthan, alij myon vocant.

89. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probac-
tion, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij poly-
neuron, Magi eurenemona, Aegyptij asonth, Ro-
mani plantaginē, Hispani thesaricā, Pœni atyrco.

90. Syrius plantaginis, & calamintha, cum
melle produnt ijs mederi, quos vires defecerunt, da-
tum die secunda, & quarta, & parasceue, id est,
Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito,
quod veraci experientia compertum est.

90. Aliqui aquatilem anagallida, alij darenion,
alij lauer, alij schinon aromaticum vocant.

90. Alij Veneris coronam, Romani veneream,
aut eusteralem.

90. Aliquibus ammonos, alijs astrion, Pœnis
atirsite, Romanis caciatrix, alijs stilago, alijs san-
guinaria dicitur.

91. Sonchon asperum aliqui cichorion vocant.
Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

91. Alij picrida appellant, Aegyptij agon, Roma-
ni intubum.

92. Thridaca hemeron, Romani lactucam sati-
nam, Aegyptij embrosi dicunt.

92. Magi sanguinem Titani, Zoroastres phe-
rumbrum, Romani lactucam sylvestrem appellāt.

93. Romani bisacutum, Aegyptij dorisatru, Sya

NOTHA.

ri adorium, Aphri tirieta appellant.

93. Romani herbam scanariam, aut aculam nominant.

93. Alij caucum, alij myitin, Democritus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedem pulli, Aegyptij seselin vocant.

93. Euxomon Romani Erucam vocant, Aegyptij ethrericem, Poeni asuric.

93. Alij cynomoriō appellant, à similitudine canini genitalis, alij leonem, Cyprij thyrfinem, communiter lycon.

95. Crommyon aliqui polyidos vocant, Magi calabotim, Romani cepam.

95. Græci scorodon, alij geboscon, alij elaphoboscon vocant.

96. Romani sinape vocant.

97. Cardamon alij cynocardamon, alijs iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Romanis nasturtium dicitur.

97. Aliqui thlaspidion, alij sinapi Persicum, alij myiten, alij sylvestre synapi, alij dasmophon, alij myopteron, alij bitron, Aegyptij sui tempsum, Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedengalinaceum vocant.

97. Aliqui chamæplion, Magi Herculis alphita, Aegyptij erethmon.

99. Ab aliquibus cerdon, ab alijs catharsis, ab alijs struthocamelus, à quibusdā chamerrhytō, à

DIOSCORIDIS

Magis callirrhytō, ab Aegyptij ceno, à Poenis syris, à Latinis lanaria herba. aut radícula appellatur.

99. A quibusdam cissanthemon, ab alijs cisso-
phyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyotheron,
ab alijs silene, à Zoroastre triūphalites, ab Osthane
aspho, à Magis miaspho, Aegyptijs thesce, à Ro-
manis rapum terre, aut terre vmbilicus, ab alijs
arcar vocatur.

100. Dracunculus. Cap. Draguntium magnum
aliqui aron, alijs isaron, alijs iarō, alijs hieracium, alijs
biaron, alijs armiagrion, alijs ciperida vocāt: in vmbrosis
sepibus gignitur. Caulem habet rectum, le-
uem, diuum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus
draconum maculis, purpureis tamen euiscentibus:
folia rumicis, inflexa. fructum summo caule facit,
racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem
in crocum & purpurā vergentis: radicem prægrandem,
rotundam, cādidam, cortice tenui vestitam. Colligitur,
& dum maturascit, succus exprimitur, siccaturq; in vmbra.
Radix quoq; messibus effoditur, elotaq; particulatim
conciditur, & funicula transfixa siccatur in vmbra.
Cum diluta potione, crudam coctā melle delingi prodest,
contra orthopnoeas, rupte, cōuulsa, tuſsim, & destillationes:
pota cum vino venerem stimulat: vlcera que cacoethe
vocantur atq; que phagedenica, expurgat, præsertim cum vite
alba, ex ea & melle collyria ad fistulas & partus

erocandos componuntur: ad vitilignes cum melle
 efficaciter illinitur: polypus & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra
 nubeculas, caliginem, albuginesq; effectum præbet:
 herbae radicesq; odor, teneros conceptus abortu vitiat: item si triginta grana eius in posca bibantur.
 Sunt qui eius succum cum oleo aurium doloribus
 infudere: quinetiam folia, utpote quæ adstringant,
 vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino
 pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem
 exemerit, posse à vipera feriri inficiantur.

101. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracontia,
 Cyprij colocasion dicunt.

101. Græci asphodelon, alij narthecion, Romani
 albucum vocant.

101. Floret mæsis albu. Quare æquinoctio
 verno, antequam semine adoleuerit, demetendum. Radicem
 aiunt potam, Veneris cupiditatem inhibere,
 quod herbarius Crateuas asseuerat: addiditq; sanare
 podagræ dolores, si drachmæ pōdere bibatur.

102. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe impositi,
 tumores ac tubercula velocissimè ad suppurationem
 perducunt, & rumpunt.

103. Aliqui cynosbaton alij capriam, alij coru
 malum, alij ophioscorodon, alij phyllostaphylon,
 quidam thalliam, aut petræam, alij olophyton,
 alij ionitem, nonnulli oligochloron, aut acōtion,
 aut hippomanes, alij trichomanes, Magi po-

DIOSCORIDIS

tera, alij pentheron, aut cor lupi, alij aloschorodon,
alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum synapi
aut inturim, Aphri herbia athon.

104. Ranunculum aliqui sylvestre apium vo-
cant.

104. Anemonem, alij agriam, aut nigram vo-
cant, alij anemonen phoenicam, alij enemion, non-
nulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinen,
aut harbylam, Osthane berilion, item ornios cera-
nio, Pythagoras attractilida, Magi cnicū agriam,
Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

105. Aliquibus ænone vocatur, alijs anthemis,
alijs homonœa, aliquibus flos campestris, Roma-
nis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia, Gallis
corona.

105. Ea, vt herbarius Crateus author est, con-
trita cum axūgia, strumas discutit. Cribrata eius
farina cum nitro, & sulphure ignem non experto
contra vitilignes efficax est: easq; sicco linteo an-
tea cōfrictas in balneis sanat: facit & ad scabiē.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone,
quam artemonem aliqui, alij arselam, aut sarco-
collam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syl-
vestri papaueri similis est. Recens trita interci-
siones impositu sanat. oculorum inflammationes
mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur:
vulnera conglutinat: convulsis, & vellicatibus im-
posita medetur, inflammationibus utilis, contra

NOTHA.

Serpentium morsus cum vino bibitur.

105. *Anagallis purpurea*, quibusdā *aeritis* aut *agitis* vocatur, alijs *sauritis*, Magis oculi sanguis, aut *chelidonium*: Romanis *macia*, *Hetruscis* *masytipos*, *Gallis* *sapana*, *Dacis* *cerceraphron*. *Anagallis communis*, quibusdam *corchoron*, alijs *halicacabon*, alijs *xeliaurus*, Magis *nycteritis*, *Aegyptijs* *mecij*, Romanis *aneciaton*, *Aphris* *asirrisoe*.

105. *Aliquibus* *citharō*, alijs *cissaron*, alijs *chrysocarpos*, alijs *poetica*, alijs *corymbethra*, alijs *cysion*, alijs *dionysia*, alijs *ithytheriō*, alijs *persis*, alijs *cemos*, alijs *asplenos*, Romanis *sylva mater*, alijs *hedera*, *Gallis* *suibites*.

106. *Chelidonium magnam* nonnulli *paeoniam* vocant, alijs *crateam*, alijs *aijbium*, alijs *glauciam*, alijs *pandios radix*, quidam *philomedion*, alijs *othonion*, *Romani* *fabium*, *Galli* *thonan*, *Aegyptij* *mothoth*, *Daci* *crustana*.

107. *Auricula muris*. Cap. *Myosota* alijs *myoson*, alijs *anthyllion*, alijs *alsinen*, nonnulli *myorthoeon*, alijs *myrthosplenon*, *Latini* *muris auriculam* vocant, *Aphri* *labatholabat*. Nomen ideò accepit, quòd muscutorum aures folijs imitetur. *Lucos* & *fabulosa loca* amat, ideò *alsine* dicta est. Ea *helxine* similis, sed *humilior*, ac folijs *minor*. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflammationibus convenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur: in totum eadem po-

DIOSCORIDIS

test, quæ helxine.

107. Isatis sativa aliquibus angion, alijs egne. Magis arusion, Romanis gluta aut glastum dicitur.

107. Sed sciendum est, ne tralita errorem pariant, sativum glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos lingue speciem representantes, in quibus semen continetur melanthio simile, caulemq; supra binum cubitorum altitudinem attolli: sylvestre vero nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiore. florem purpureum, aut coeruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito. divisum.

107. Aliqui sylvestre semperivum, alijs portulacum sylvestrem appellant, Romani illecebram, Aegyptij anoth, Aphri atirtopurum.

109. Aliqui rhiam vocant.

109. Aliqui centauriam radicem, alijs aloen Gallicam, alijs narcem, alijs chironion, Dardani aloitin, Romani gentianam aut cicendiam, alijs ciminalē vocant.

110. Alijs melocarpos, alijs teuxinon, Latine aristolochia.

110. Appellatur à quibusdam ararisa, & mele caprum, ephestios, lestitis, pyxionyx, Dardanion, iontitis, Gallis theximion, Aegyptijs sophoeph, Siculis chamamelon, Italis malum terre, Dacis absyris

NOTHAP

thium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus: & petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si nidore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur. vulnera impo-
sita sanat: carcinomatis narium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest. rigoribus me-
detur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq;. Crate-
nas herbarius, & Gallus, eadem de hac tradide-
runt, & praeterea podagricis eam auxiliari.

110. Glycyrrhizam aliqui ponticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticam, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylithra, alij libyestason, alij homœnomenœon, alij peenthaomenœon, Latini dulcem radicem appel-
lauiere.

110. Aliqui narcem vocant, alij lymnesion, alij maronem, alij plectroniam, alij chironiam, alij li-
mnestim, Magi Herculis sanguinem, Romani phie-
ri, & vneseram, & fel terre.

111. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs: pulsationes vulnerum vrinae stillicidia, calculosorum cruciatus, clyste-
re immissa sedat. Legitur matutinis, sola ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumi-
ne complentur.

111. Aliqui limnesion, alij helleboriten, alij amarathon, Magi Herculis sanguinem, Latini fe-

DIOSCORIDIS

brifugam, alij auram, multi radicem, Daci tulbelā
appellant.

111. Quibusdam chrysisceptron, alijs ixia, Ro-
manis carduus varinus, Aegyptijs epher dicitur,
alijs ephthofechin.

112. Pancarpon aliqui, alij vophonon, alij ixia
alij cynomaxon, alij ocimoides, alij cnidion coccon,
alij cynoxylon, Latini carduum nigrum aut verni
laginem, Aegyptij sobel vocant.

112. Aliqui crocodilion vocāt, alij chameleonē,
alij onoc.irdion, alij Veneris lauacrum, Romani la-
brum Veneris, alij Carduum Veneris, Aegyptij se-
seneor, alij chir, alij meleta, Daci sciaram.

113. Aliqui agriocinnaram, alij donacitim, alij
erysisceptron vocant, Romani spinam albam aut
regiam, alij carduum ramptarium.

113. Quaeacanthis aliquibus dicitur.

113. Aliās pherusa, aliās pyracantha nomina-
tur, in Aegypto cnius.

113. Aliqui phrynion, aliqui acidoton.

113. Acantham aut herpacantham, quidam
melampyllon, aliqui topiariam, alij mamolariā,
quidam crepulam vocant.

114. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij
ischiada vocant, Romani spinam albam.

115. Aliqui eryngē, alij erynerē, alij caryon, alij
gorginion, alij hermiō, alij origanū, chlounion, alij
myac anthon, alij moly, Aegyptij crobysen, Magi
syferton,

NOTHA.

*syferton, Romani capitulum Martis, Daci sicupno
ex, Hispani centumcapita, Aphri cherdam, alij orō
am chloem, alij chida appellant.*

*115. Aloe aliquibus amphibion, alij herminion,
alijs eryngion, alijs tragoceros, Romanis aloa, Bar
baris aloe dicitur.*

116. Aegyptij somi, Romani absynthium.

116. Latini Sandonicum vocant.

*117. alij abutunon, alij absynthium, alij heras
clion, alij cholopæon, alij absynthiomenon, alij the
lyphthorion, alij procampylon, Magi aeuraphæni
cos, alij cynanchitē, Romani absynthium ponticū,
nonnulli thelythamnū, alij glycin ancona vocāt.*

*117. aliqui later vocant, alij cassialā, Aegyptij
pesalem.*

*117. atiqui syncliopa, alij alcibiadem, alij pan
eration, nonnulli styphoniam, Aegyptij suphlo,
Magi pythonis oculum, Romani sciolebinam vo
citant.*

*118. vers. vlt. Glichona alij blechron, alij arsen
canthon, Latini pulegium vocant, Galli aluolum,
Aphri apoleium, quidam galisopsim.*

*119. alijs embactron, alijs belouacos, alijs arte
medeion, alijs cretica, quibusdam ephemeron, non
nullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidion, aut
helbunion, Romanis vstilago rustica.*

*119. alij elaphoboscon, aliqui phacon, alij cios
min, alij phagnon, Aegyptij becion, Romani salz*

N n

DIOSCORIDIS

wiam vocant.

120. Hedyosmon sativum alii minthā, alii calamintham, Latini mentham vocant, alii nepetā, Aegyptiis, alii pherthrumerthumonthu, alii perko, alii maceto.

120, quidam cephaloton, alii epithymida, alii thyrison, Latini thymum, Aegyptii Stephanen, Daci mosulam.

121. aliqui zygin sylvestrem, alii polion vocant, Aegyptii meruopyum, Latini serpyllum.

121. aliqui nominant amaracum, alii triphyl-
lon, alii agathides, alii cnecon, alii acapuon, Py-
thagoras thramben, Aegyptii sopho, Armenii mys-
ron, Magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, La-
tini maioranam.

122. aliqui origanida, aut hysobriū vocant.

122. alius sylvestre basilicū, Latini ocimastrū.

122. ruta montana, quam aliqui rhyten mon-
tanam vocant: & hortensis, quam Aegyptii epnu-
bum, Syri harmala, alii besasa, Aphri churma.

123. Sylvestris ruta Cap. Rutam sylvestrem
alii appellant hypericon, alii androsemon, alii
coron, alii chamæpitin, Romani hederalem, aut cē-
tonalem, Aphri churma semmaced, odor seminis
resinosus est, ideo chamæpitys aliquibus nomina-
tur. Frutex est surculosus, rubescens, folia ruta fi-
gura: flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo
manant, unde androsemon vocitarunt. Ramuli

NOTHA.

subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus semen nigrum resinam olens, gignitur incultis & asperis. Vrinam ciēt, menses appositu trahit, pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis illitu medentur, & diebus quadraginta epota ischiadicos sanant.

124. aliqui syluestre leucoion appellant.

126. aliqui cerascomen vocant, Latini rusticā pastinacam, aliqui carotam, Aegyptii babibyron, Aphri sicham.

126. nonnulli sphagnon vocant.

126. Aegyptii cyonum phricem vocant.

127. Anethum quod estur, aliqui polgida vocant, alii anicetum, Magi cynocephali genituram, aut capillos, alii Mercurii semen, Latini anethum, Aphri sicciriam Aegyptii arachu, Daci pulpum.

127. siue cuminum syluaticum.

128. Ammi, Latini ammium Alexandrinum, quidam regeum cuminum appellant.

128. Aegyptii ochion vocant, Aphri gæd.

128. aliis sonchites, Romanis lampuca, Poenis si thileas.

128. aliqui sonchiten, alii entimon agrion, Romanis intybum syluestrem uocant.

129. a quibusdam pedinon, ab aliis hydrofelinon agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

129. aliqui petroselinon syluestre appellant, Aegyptii anonim.

Nr ij

DIOSCORIDIS

129. aliqui grielon, alij agrioselinum.

130. aliqui elaphicon, alij nephron, alij ophigon, nonnulli ophioctonon, aliqui herpyceen, alij lymen vocant, Romani cerui ocellum, Aegyptij chemin, Aphri ascaucau.

130. hippomarathron, aliqui marathin, alij marathrum agrion, Aegyptij sampsoth, Magi thymarnolion, Latini foeniculum erraticum, aliqui mion, Galli sistrameor.

131. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs paraly sis, alijs camarus, alijs hyacithus, alijs delphinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosandron, aut cronion, Romanis bucinus minor vocitatur.

131. aliqui dorycnion, alij pyrinon, alij pyrotō, aut pyrothron, alij arnon pyriten, Magi pyriten, Romani saluarem vocant.

131. aliquibus xea aut campsanema appellatur.

132. aliqui arangem vocant, alij phalangion, alij asterion, nonnulli nesyrin aut sphondylin, quidam chorodanon, aut xenanthen, Romani herbam rutinalem, Aegyptij apsapher, Magi osirin.

133. aliqui agrion vocant, alij agriophyllō, Magi bonum demonem, Romani satariam.

134. aliqui melanthium, alij mecona agriō melana, Romani papauer nigrum appellant.

137. herba est, ex qua ammoniacum fit suffimen, quod thymiama vocant, aliqui agaxyllon,

NOTHA.

aliū criothēum, aliū heliūstrum, Romani guttam.

138. aliqui ampelocarpon, aliū omphalocarpon, nonnulli philanthropon vocant.

138. aliqui aspidion, aliū haplophyllon, aliū accyseton, aliū adyseton nuncupant.

138. aliqui cission, aliū cissophyllon.

138. aliqui armyrō vocant, aliū enicō sylvestre, aliū aspidion, Magi aphedron, Aegyptij chenō, Romani præsepiū, aliqui fusum agrestem, aliū colum rusticam.

139. quidam clinopodion, aliū polygonaton, aliū Iouis colum, aliū echeonymon vocant.

139. Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ violentie vocantur, magno esse præsidio.

139. aliqui cleonicon, aliū ocimoides, aliū xopyron vocant.

139. aliquibus leontopodion, aliū leuceoron, alijs leontion, alijs doris, aut doriçteris, alijs lychnis agria, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rhapezion, alijs cornutum papauer, alijs anemone, Romanis patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

140. aliqui athanathon uocant, aliū acylonion, aliū ballarion, aliū geranopodion, quidam corymbion, aliqui taurion, aliū sceptron, aut maloion, Aegyptij semeon, Magi sanguinem apocathemenes, Romani genicularem aut ballariam.

140. aliàs tragonaton, aliàs atocion, aliàs hiera

N n ij

DIOSCORIDIS

copodion, aut lampas vocant, Aegyptiis semura,
Magis apocathemenes taurus, Romanis agreste in
tubum.

140. Crinō basilicon alii crinanthemon vocāt,
alii gallirion, Magi Martis sanguinem, Osthane
aurem crocodili, Aegyptii symphæphon, quidam
trialō, Latini lilium, aliqui rosam iconis, Syri sasa,
Aphri abiblabon.

140. Alii magnū vocant, aliqui naphthan, alii
notiano scemin, alii nosprasson, alii nothera, alii no
ehelin aut nostellin, alii nophryn, alii gnotorim, alii
gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut ulcea
rariam, aut marrubium nigrum, alii canthurinū.
Aegyptii asphon, magi Isionis sanguinem.

140. Alii melyteon, alii meliphyllon, alii erys
thran, alii temele, Latini apiastrum aut citraginē.
Galli merisimorion vocant.

141. Prasion, alii eupatorion, alii phyllophares,
alii tripedilon, alii camelopodion, Aegyptii asterō
pen, Magi tauri sanguinem, aliqui aphedron, alii
Horigenituram, Latini marrubium, aliqui labeo
niam, Aphri atierberziam.

141. Aliqui phyllia, alii acaulon, alii sylvestre
lapathum vocitant.

141. Aliis leucacantha dicitur.

141. Alii cnicion vocant, Romani trifolium acu
tum, aut odoratum.

142. Polium montanum, aliqui tenthrion, alii

NOTHA.

pheux aspidion, alii achamenin, alii ebenitin, alii melosmon, nonnulli belion, quidam leontocharon vocant.

142. Aliqui scorbion, alii pleuritid, alii disosmō, alii syluestrem calaminthen, quidam chamædryn, alii mithridanion, Magi Podotis sanguinem, Aegyptii apho, Romani trissaginem palustre appellant.

143. Pechion quidam rhechion, alii petrinam vocant, alii peganon, alii pithion, alii pagonaton, alii chamæleucem, alii procheton, alii arcophyton, alii chamægeron, Aegyptii saarthan, Latini tussilaginem, quidam pharphariam aut postulagine, Bessi asa.

143. Quibusdam polyclonos, alii monoclonos, alii toxitesia, alijs ephesia, alijs anaetorios, alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, Magis hominis sanguis, alijs chrysanthemon, Romanus valentia, aut serpyllum, aut herba regia, aut artemisia, alijs rapiu, aut tertana, Gallis pona, Dacus xuoſte dicitur.

143. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sampsuchi odorem reddunt. Si quis stomacho laboras, herbam cum amygdalino oleo bene contundat in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur: qui nervorum dolore cruciatur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

143. Romani caprum syluaticum vocat, quidam

Nn iiij

DIOSCORIDIS

botryn, alij apium rusticum, Aegyptij merseon.

144. Aliqui Pelonitin, alij tricam, alij geranon geronta, Romani vchinastrum, Aphri iescen appellant.

144. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij oxyphyllon, alij cardamomon, alij origanum vocant, Magi hierobryncas, Latini gruina, aut pulmoniam, aut cicotriam.

144. Gnaphalion, alij hires, alij ampetocon, alij anaxiton, alij anaphalin, Aegyptij semeon, Galli gelasonen, Latini centumculum vocant, quidam tucularem, alij albinum.

144. Aliqui cerascomion, alij leucanthon vocant.

144. Conyza magna. Cap. Conyza magna alijs quibus cynoxematitis, alijs danais, alijs tanachio, aliquibus phycos, alijs ischys, alijs dynosmos, Magis brephoctonos, quibusdam anubias, nonnullis hemedias, Aegyptijs ceti, Romanis intybum, aut militaris, aut deliarium, aut febrifuga, alijs phragmosa, alijs musteros, alijs pissa nuncupatur.

145. Aliqui conyzam parvam, alij panion, alij libanotidem, Magi cronon vocant.

145. Alij hemerocatalacton, alij crinon agrio, alij crinanthemon, alij porphyranthes, alij bulbum hematicon, alij anticantharon, Aegyptij iocri, Romani bulbum, aut lilium sylvestre, aut marinum, Aphri abiblabon vocant.

NOTHA.

145. Aliqui basilicon vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

146. Alij melion aqueum, alij entaticō, alij priapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

146. A Latinis geminalis, à Dacis hormia dicitur.

147. Aliqui osmada, aliqui ononin, alij phlonistin appellant.

147. Hanc nymphona alij vocant.

147. Sunt qui picrada appellant, alij leucen, alij thalassiam.

147. Alij pteryx, alij lonchitim, alij aturion, alij phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodoten, Magi mustele sanguinem.

148. Quidam anthyllon, alij anthemida vocāt, alij eranthemin, alij leucathemon, alij soranthin, alij campestrum florem, Romani solastrum.

148. Anthemida aliqui leucanthemon, alij eranthemon, quoniam vere floreat: alij chamæmelon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melanthemon, alij chrysocomam, alij calliam, Romani mælium, Aphri astertiphen appellant.

149. Alij anthemida, alij leucanthemō, alij chamæmelon, alij chrysocalin, alij melabathrō, nonnulli campestrum florē, Romani solis seculum aliqui millesolium. Hetrusci cantam, Aphri thamath.

DIOSCORIDIS

149. Alij balsamenam, Magi hemorrhan, alij
Mercurij genituram, alij aphthitis semē, aut mne
sithem, Romani Cappacoraniā, Aphri narat.

149. Alijs orobeliō, quibusdam orobax, alijs he
magogon, alijs pæsedon, alijs monogenion, alijs me
niō, alijs pæoniō, alijs pāthiceratos, alijs ideī dacty
li, alijs aglaophotis, alijs theodonion, alijs seleniō,
Magis selenogonon, alijs phthipsis, Romanis casta.

150. Alij agonychon vocant, alij leontion, alij
leoninum lapidem, alij gorgonion, alij tantalitin,
alij diosporon, Romani columbam, Daci gonoletā,
alij heracliam.

150. Aliqui tenthron, alij dracanon, alij cinna
barim, Latini rubiam, Hetrusci lappam minorem,
Aegyptij sophobi vocant.

150. Alias cestron aut medusa dicitur, Latine
venerea aut lanceola.

151. Latini longinam, aut calabrinam dicunt.

151. Alij althiocon vocant.

151. Aliqui cannabion, alij schinostrophon, alij
asterion appellarunt.

151. Aliqui hydrastinam, Romani terminalem
dicunt.

152. Aliqui acopon, alij anagyron, alij agnaco
pion, vocant.

152. Alij alceam, alij acyron, alij lyron.

152. Aliqui onobrochilon, alij eschasmenen, alij
hypericon, alij corion, alij chamæpytin, Romani

NOTHA.

opaeem, alij brichilatam, alij loptam, alij iocinale,
Daci aniaffexe appellant.

153. Alij ascyron, aut dionysiadem.

153. Alijs pitysorysis, alijs orixelon, ijs qui Pon-
tū incolūt olocyrō, alijs bryonia sylvestris, Athenis
ionia, Eboicis sideritis, Magis Minervæ sanguis, La-
tinis ainga aut cypripū, Dacis dochela appellatur.

154. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pra-
tis & montibus, locis mundis, & opacis, circa fru-
tices. animas hominū & corpora custodit, nocture
nas ambulationes, & loca sancta: grauibus som-
nis resistit: ad omnem medendi vsum cōmendata.
Radicem habet rubram, odoratā, porracea folia,
medio eorum puniceo, in recto calamo triangula,
floribus in cacumine purpureos. Farina recētis vul-
neribus capitis indita, dolorem finit: vulnera gluti-
nat: fracta ossa extrahit: sed quotidie imponi de-
bet, dum persanescent: dolori capitis medetur, si iu-
re decocti perfundatur, aut temporibus cum bitu-
mine illinatur, aut radix suffiatur.

155. Aliqui polygonatum appellant, alij cyno-
chalam, alij heracliam, alij asphalion, alij chilio-
phyllon, alij clema, alij polycarpō, alij carcinethrō,
alij teuthalida, alij myrtopetalon, alij cnopodion,
alij xaritheam, alij pedalion, Aegyptij thephin, ali-
qui stemphin, Magi genituram herois, aliqui vn-
guem muris, Latini sanguinariam aut seminale,
Aphri chulum.

DIOSCORIDIS

156. Alijs phileterion, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

156. Aliqui epigeton, Aegyptij philacum, Romani ambuxum vocitant.

157. Romani soldaginem vocant.

157. Rutaceis similes.

157. Alij tobion, Romani stipam vocant.

157. Alij calycanthemon, ali j periclymenon, ali j heliophyes, nonnulli hepatitim, ali j milacem, ali j anatolicon, ali j diticon, ali j merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptij oxyui, ali j clymenon, ali j clymenion, quod & agonon nuncupant.

158. Aliqui Aeginam, ali j clymenon, ali j carpathon, ali j splenion, ali j epatitim, ali j axinam maiorem, nonnulli clematitim, ali j myrsinen, ali j calycanthemon, Magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

158. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauroceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

158. Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon, aliqui sarxiphragon, ali j empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: Strangurie prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit, & vrinam ciet.

158. Aliquibus potamogiton appellatur.

NOTHA.

alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Mysijs mendruta, Syris neuda, alijs lycosemphyllon: alijs helleborosemata, alijs scyllion, Magis lus icor, Romanis viartum nigrum, quibusdam tintinabulum terre, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

158. Aliqui leporis cuminum appellant.

159. Aliqui medicam appellant, alij triphyllō, alij clemation, nonnulli osmon, quidam trigonon, alij cypellion, alij polyphyllon, Romani trifolium odoratum, Aegyptij epaphon.

159. Ab alijs erineos, ab alijs thrias, à nonnullis pollyrrhizon, à Romanis vindicta nominatur.

159. Aliqui anactorion, alij phasganō, alij macheronion, alij arion vocant, Romani gladiolam, quidam genitalem.

159. Alij bolon vocant.

159. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos, à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis acprus dicitur.

160. Anchusam aliqui catanchusam vocant, alij libycam, alij archibellion, alij alcibiadion, alij onophyllon, alij porphyrida, alij mydusam, alij sallyca, alij noneam, Aphri buinesath.

160. Aliqui aridam, alij alcibiadion, Romani alcibiaceum nominant.

160. Aliqui & hanc echion vocant, alij scorpiuron, alij sparganon, alij altheam, alij amarantida, alij probateam, alij elaphiō, alij antiminō, alij

DIOSCORIDIS

porphyrida, alii augion, alii nemesion, alii phileterson, alii hyenopsolon, alii thyrstitim, alii thermustin, alii misopathos.

161. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

161. Agrostin aliqui egicon, alii amaxitin, Aegyptii amphivocant, Latini gramen, aliqui asyphyllion, alii sanguinalem, alii vniolam, Hispani apuriam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

161. Magi genituram, aut sanguinem Titani, alii scorpionis urinam, Pythagoras parmiron, Andreas xanthophanea, Osthanees beephthalmion, Aegyptii sendionor, Romani vertemium, alii soiteastron, Aphri udedonin.

162. Aliqui myriomorphon nominant, alij chiliophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, Latini supercilium Veneris, alij acron sylvaticum, alij militarem, alij millefolium.

162. Batos, ab alijs cynosbatos, ab alijs selinoritiō, ab alijs asyntrophos, à Magis Titani sanguis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus, ab alijs sentes, à quibusdam mora baticana, à Dacis mantia, Aegyptijs hemoos, alijs ametros appellatur.

163. Alij hepatorium, aut hepatitis, Romani uolucrum maius.

163. Pentaphyllon aliqui pentapetes, alij pentatomon, alij pentadactylon, alij pseudoselinum, alij callipetalon, alij xyoloton, nonnulli xylopetalon, alij asphalton, alij pentacænon, alij thymiatitin,

NOTHA.

Aegyptij orphitebeocen, alii enotron, Magi ibidis
vuguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon,
Romani quinquefolium, Galli pempedulam, Daci
propedulam appellant.

163. Aliqui rhon, alii anchinopa, alii phœnicas-
pteron, alii rhon stachyos, alii osthalen, Aegyptii
athnon nominant.

164. Alii rhodida nominant.

164. Hippurin, alii trimachion, alii anabasin,
alii cheredranon, alii phædran, alii itiandendron,
alii gis, alii schœniostrophon vocât, Aegyptii pher-
phram, Magi Saturni cibum, Romani equinalem,
alii equi salicem, aut anabasion, alii ephydron.

164. Aliqui equition, & alii chedran, alii gy-
non, Romani salicem equinam appellant.

164. alii scorpion, alii garganon, Romani cornu
lacam, alii bituensa, Daci saliam, Aegyptii sober,
Aphri achæosim.

165. Oxyschœnos aliquibus schœnos levis, aliis
oxypternos, aliis Solis supercilium, Romanis iucus
marinus, aut manualis, Aphris chudua dicitur.

165. Aliis adocetos, aliis neuras, aliis phrynion,
Romanis bouinalis.

165. Aliis chrystitis, aliis chrysanthemon, nōnul-
lis amaranton, aliis diospogon, Aphris dubath,
vel burchumath, Romanis Iouis barba appel-
latur.

165. Aliqui chrysspermon vocant, alii das

DIOSCORIDIS

spin, alij origanon, alij arcophthalmon, Romani
arilariam.

166. Aliqui chalchitin vocant, alij chalcathon,
alij chalcanthemon, Romani acantham, Hetrusci
garuleum, Aphri churseten.

166. Alij trigonion, alij bunion, alij hierobotan-
nen, alij philtrodoten, Aegyptij pemsempe, Magi Iu-
nonis lacrymam, nonnulli mustela sanguine, alij
sanguinem Mercurij, Romani cristam gallinacea,
alij pheriam, alij trixalidem, alij exupera, aliqui
herbam sanguinalem.

166. Alij erigenion, alij chamelycon, alij sideri-
tin, quidam curitin, alij persephonion, alij Iouis co-
lum, alij dichromon, alij callesin, alij hipparison,
nonnulli demetriada, Aegyptij pemphithenphtham,
Pythagoras eryscisceptron, Romani cinnamolem.

167. Aliqui chamaefycen, alij gatalen, alij ony-
cha vocant, Romani pinum triuam, aut ficum ter-
re, aliqui glandulam alij tium, alij nonariam.

167. Aliqui heloniam, alij porphyranes, Roma-
ni vaccinium, alij vlcinum vocant.

167. Nonnulli oxytonon, Romani papaueralem,
Aegyptij nanti.

167. Papauer satium aliqui chamaefycen, alij
papauer rhœada, alij oxytonon appellant, Romani
papauer, Aegyptij nanti.

169. Aliqui paralion, alij sylvestre papauer,
alij thalassion, Romani fabulum marium, Aphro-
disium

NOTHA.

sifimacam uocant.

169. Qui hoc papauer hauserit, nō alia accidēt,
quām qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur
auxilijs. Semē æstate dum siccū est, colligitur. Deco
ctum radicis bibitur cum uino, sanatq; dysenteria.

169. Alij pythionion, aliqui dioscyamon uocant,
ali j adamantā, ali j adamenon, ali j hypnoticon, ali j
emmanes, ali j atomon, nonnulli dithiambrion, Ma
gi, Pythagoras & Osthānes, xeleo, Zoroastres ti
phonion, Magi rhapōticā, Romani inanano enta
riam aut apollinarem, Aegyptij saphtho, Hetrusci
fabulum, Galli bilinuntiam, Daci dieliam.

170. Aliqui cataphysin, ali j cynocephalion, ali j
chrystalion, ali j cynomyam, ali j psyllerin, ali j sice
lioticon, Siculi comidijn, Romani herbam pulicarē
aut silbacium, Aphri uargugum appellant.

170. Romani strumum uocant, ali j cacubalum,
Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismu
sim uocant.

171. Aliqui dircion appellant, ali j strychnon ma
nicon, ali j dorycnion, ali j calliada, Romani apollina
rem minorem, ali j ulticanam herbam, aut opsagi
nem, Daci cycolidem, Pœni catabum.

171. Strychnonmanicon, ali j anydron, ali j penta
dryon, ali j enoron, quidam orthogyion uocant.

172. Ali j exeranthēs, aliqui antimnion aut anti
mion, ali j bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij
apemum, Pythagoras anthropomorphon, ali j alce

DIOSCORIDIS

ten, alij thridaciam, alij cāmaron, Zoroāstres dia-
monon, aut archinen, Magi hemionos, aliqui gonos-
geonas, Romani caninum malum, alij terreſtre
malum.

173. Alij cyamon leucon, Rom. colomeſtrum.

174. Conion, aliquibus æginos, alijs ethuſa, alijs
apoleguſa, alijs dolia, alijs amauroſis, alijs paraly-
pſis, nonnullis aphron, quibusdam creidion, alijs cœ-
ten, alijs catechomenion, alijs abioton, alijs apſeu-
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanody-
nos, alijs dardanis, alijs catapſyxis, Oſtani babas-
thy, Aegyptijs apēphi, Romanis cicutā appellatur.

174. Aliqui cynanchon appellant, alij pardalian-
ches, alij cynomoron, alij cynoctonon, alij phaleon,
alij cynāchen, alij oligoron, alij hippomanes, alij on-
ſtin, alij ophioſcorodon, alij cynaricam, alij elapho-
ſcorodon, Magi paralyſin, Romani Braſſicam ruſti-
cam aut caninam.

174. Alij ſpongon, alij hæmoſtarin, Romani rho-
dodendron, Lucani icmanen, Aegyptij ſchimphen,
Pœni rhododaphnen dicunt.

175. Aliqui elitim uocant, alij canocerſeam, alij
amelxinen, alij euſinem, alij amorginem, alij ſucota-
chos, alij pſychuacos, alij melampelon, alij eittampe-
lon, alij ciſſamethon, alij anatetamenon, Romani
uolutum laparon, Aegyptij apap, alij parthenion,
alij ſideritim, alij heracleam, nonnulli agriam, qui-
dam clibodion, alij polyonymon.

NOTHA.

176. Alij myortochon dicūt, alij myortosplenon, Romani muris auriculam: Pœni labatholabat.

176. Agriam phacon aliqui, alij epipteron, Romani uiperalem, alij icoosmigdonon uocant.

176. Aixoon maius, aliqui aithales, alij ambrosion, alij chrysispermon, alij zoophthalmon, alij bophtthalmon, alij stergethron, alij æonion, alij aichryson, alij holochryson, nonnulli chrysanthemon, alij protogonon, alij boron, alij notion: Magi paronychiam, alij chrysitin, Romani ceriam cuspiam, aut Iouis caulem nominant, alij leapetes, alij sedum maius, Aegyptij pamphanes.

176. Aixoon paruum, alij petrophyes appellant, alij brotion, alij theobrotton, crobysson, alij chimerinen, alij cerauniam, Romani uitalem, alij semperuiuum, Aegyptij etijceltam.

176. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui aixoon paruum, alij petrophyes, alij aixoon syluestre, Romani semperuiuum minus appellant.

177. Aliquibus cymbalion, alijs scytalion, alijs hortus Veneris, alijs terra umbilicus, alijs stœchis, alijs stergethron, Latinis umbilicus Veneris dicitur.

177. Acalyphen aliqui cnidem, alij adicen, Latini urticam, Aegyptij selesion, Dacidyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui cniphen, Romani urticam mollem uocant.

DIOSCORIDIS

177. Alijs galeobdolon, uel galephos, Aegyptijs ætopi, Latinis urtica labeo dicitur.

177. Alijs galation, aut gallerion.

178. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio uocatur, alijs erechthites.

178. Marinum bryon, aliqui ballarin, alij iranè, Latini gnomeusilon uocant.

178. Alijs stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

178. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nūcupatur, Aegyptijs tibus, Magis eluri sanguis.

179. Phlomon, alij phlonon, Latini uerbascum, alij pheminalem uocant.

180. Arcion alij prosopida, alij prosopion, alij a parinen, Latini personatam, aut lappam appellāt.

180. Alijs borion appellatur.

180. Capnon, aliqui corydalion, aut corion uocant, alij syluestre corydalion, alij capnon in hordeis, alij capniten, alij marmariten, alij capno gorgion, alij chelidonion micron, alij peristerion, alij cātharida, alij chalcocri, Romani apium aut fumariam, Aegyptij enyx, alij tucin.

180. Alij tripodion, alij tribolion.

180. Aliqui libyon, alij triphyllon.

180. Aliqui telinen, alij lotum magnum, alij triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

181. Alij melophyllō, alij stratioticem, alij achil lion, Latini millefolium uocant, aliqui supercilium

NOTHA.

ueneris, Galli beliocandas.

181. Alij myrrham, alij conilen uocant.

181. Aliqui buglossum magnum uocant, Romanis spinam mollem.

182. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alij asterion, quibusdam hyophthalmion, Romanis inguinalis, Dacis rathibis.

182. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter qui ignari antea non uiderunt, esse inane, simulacrum arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhi xotomus hæc de ea refert: Si uiridis cum axungia uetere tundatur contra rabiosorum morsus, turgentia guttura, proderit, suffitu quoq; serpentes fugat.

182. Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij ion syluestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut mura-riam, aut uiolam purpuream uocant.

182. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

182. Aliqui aton, alij actinen, alij anemosphoron uocant magi paradacry, Aegyptij erxoen, Romani scopam regiam, Aphri xigar, nonnulli thepso.

183. Alio nomine chamæleuce, alio cissos acarpos, aut terræ corona, aut selinitis, Latine hedera pluuiatica dicitur.

183. Magi eluri gonon, Osthane txauchi, Aegyptij autucrimbesor, Romani linguam bubu-

O o iij

DIOSEORIDIS

lam, alij libanium, Poeni asanaph uocant.

183. *Alij phyton, alij caballation, alij splincion, alij scolymon, Romani linguam canis, aut caninā appellant.*

183. *Aliqui zoonychon uocant, alij aetonychon, alij cemos, alij damnamenem, alij idiophyton, nonnulli phytobasilā, aliqui crosion, alij crossophthoon, Magi sanguinē crocodili, alij crocomerion, Aegyptij daphnocenen, Romani minerciū, alij palladium, alij neumatum, alij flammulam.*

183. *Aliqui & id antirrhinon, alij anarrhinon, nonnulli lychnida agriam uocant.*

183. *Nonnulli lychnida agriam appellant.*

184. *Catanance aliquibus damnamete, alijs dionysias, alijs thyrsion, alijs demos, alijs cemos, alijs crotion, magis archaras, alijs arcopus, Romanis herba filicula, alijs datisca, Dacis caropithla dicitur.*

184. *Aliqui psychen, alij merida, alij potamogitona, alij stachyiten, Romani calium marē nomināt.*

184. *Alij callitrichon, alij trichomanes, alij ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron, Aegyptij epier, Romani cinnamalem, alij terrae capillum, alij superciliū terrae, Daci phithophthethela uocant.*

185. *Aliqui pterion, alij opteron, Romani capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli & eam adianton appellant.*

185. *Aliqui phasganon, alij antithesion, alij chascaron, alij choeradolethron, alij & hanc apariz*

NOTHA.

nam nominant, Latini lappam.

185. Aliquibus sit ospelos, alijs siphon, alijs brocos, Romanis auena dicitur.

185. Aliqui siphonion, alijs acrospelon uocant.

186. Alijs epapitis, alijs lycanthemon, alijs cynosbaton, alijs aniceton, alijs heliophiton, alijs anatolicon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lyisthe, Romanis mergina, Hetruscis radia appellatur.

186. Alijs hieromyrton, alijs myacantha, alijs agonon, alijs scincos, alijs mintha, alijs catangelos, alijs anangelos, alijs aceron, alijs ocneron, alijs cinen, alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamæmyrte, Bæotis gyrenia, Magis Herculis genitura appellatur.

186. Aliqui idean, alijs danaen, alijs hippoglottō, alijs xaliā, alijs stephanen, alijs daphnon, alijs samothracicen, alijs methrion, alijs hypoglossion uocant.

186. Daphnoides alypo simile, flos ut nymphæe, cuius medium nuci cypressi non dissimile, in quo semen: aliqui chamædaphnen, alijs peplion, alijs eupetalon uocant.

187. Aliqui & hanc alexandrinam appellarūt, alijs daphniten, alijs hydragogen, Romani laureolā, alijs lactaginem, Galli vsu bim.

187. Aliqui ascida uocant, alijs atomon, alijs pigatoxin, Magi sanguinem Herculis, alijs polyidos, alijs anaphyston, Aegyptij somphia, alijs unre, Galli laginum, aliqui anepsa.

DIOSCORIDIS

187. Aliqui melanpodion uocant, alij ecstomon,
alij polyrrhizon, alij protion, alij melanorrhizon,
alij cyiranion, Magi xomarition, Aegyptij iscam,
alij elaphine, alij cemeleg. Latini ueratrum nigrū,
alij saraca, Daci prodiorna.

188. Aliqui sesamiten, alij sesamin, alij lycocytæ
lion, alij helleborum album appellant.

188. Aliqui coronion, alij sesamon syluestre.

188. Aliqui elaterion uocant, alij grynion, alij ba
lin, alij syncrisin, alij bubalion, alij scopion, alij phe
rombron, alij peucedanon, alij notion, Romani ance
tum, alij agrestem, Pœni cusimexar.

190. Sativus cucumer. Cap. Satiui cucumeris tri
ta radix, & drachmæ unius pondere pota in hydro
melite, uomitus ciet. Si quis facile secundum cœnā
uomere uelit, binis obolis sit contentus,

190. Alij triphyllon, alij stefion, alij astaphida,
alij phthiroctenon, alij phthirion, alij apathropon,
alij polyides, alij pseudopathes, alij arsenoten, Aegy
ptij ibesæden, Romani herbā pediculariam uocāt.

190. Aliqui hypopyon uocāt, alij pancranon, alij
scammonion, alij thelyterim, Romani ferulaginē,
alij ferulam syluestrem, Pœni bæden.

191. Aliqui lygon, alij lobon appellant.

192. Aliqui narcisson anydron, alij autogenes,
alij bulbon emeticon, alij lirion, Romani bulbū mor
bitarium dicunt.

192. Alij hippophyes, alij hippophanes, alij hip=

NOTHA.

pion, alij echinion, alij pelicinson, Romani lappaginem uocant.

193. Aliqui sesamon syluestre uocant, alij seseli cyprion, alij crotona, Aegyptij systhanna, aliqui trixin, magi sanguine febris. Latini ricinu, alij lupā.

193. Aliquibus cometes, alijs gobios.

195. Aliqui clema, alij crambion, alij paralion, alij canopicon uocant.

195. Aliqui sycen, alij mecona aphroden.

196. Alij spumosum papauer uocitant.

196. Aliquibus scambonia radix, alijs colophonia, alijs dactylion, Romanis colophonium, Magis apopleumonos, Aegyptijs sanilum dicitur.

196. Alij chamelea nigra, alij pyros achnen, alij heraction, alij bdelyram, alij coccon gnidion, Romani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam oleastelum uocant.

197. Alij chameleam, alij pyros achnen, alij cestron, aut cneoron uocant.

197. Acten aliqui dendron arctu, alij hemeron, Latini sambucu, Galli scobiem, Daci sebā uocant.

197. Alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Euboica, Gallis ducone, Dacis olma.

198. Nonnulli ischiada, alij chamebalanum agriam, alij linoxostin, Latini radicem syluestrem, Pæni thorpathsade appellant.

198. Aliquibus colocyntha egos, alijs sicya pitera, alijs alexandrina colocyntha, Zoroastri thym

DIOSCORIDIS

bra, Osthani autogenes, Romanis cucurbita syluati-
ca, Dacis tutrastra dicitur.

199. Alij cedæes, Romani involucrum uocant.

199. Alij ophiostaphylon, alij chelidonium, aut
melothron, aut psyllothron, aut archexostin, aut
agrostin, aut cedrostin appellant.

200. Alij chironion ampelon, alij bucranion, Ro-
mani oblameniam, alij batanutam, alij betisalcā,
Daci priadelam, alij pegrinam, Aphri lauother.

200 Pterin alij pterion, alij pterineon, alij dasy-
clonon, alij anasphoron, alij blechnon, alij polyrrhi-
xon uocant, Magi hermubain, Romani filicem, alij
laculā, alij filisfanariā, Aegyptij asini sanguinem.

200. Thelypterin aliqui nymphaeam pterin no-
minant, Romani linguam ceruinam.

201. Polypodion aliqui scolopendron, alij pte-
rin, alij polyrrhizon, Latini filiculam uocant.

201. Aliqui pterion, alij nymphaeam pterin no-
minant.

201. Alij Argyron, alij aritrillin, alij chrysitin,
Aegyptij aplhopho, Latini mercurialem masculā,
alij tesserculatam, Aphri asumes.

202. Aliquibus linoxostis, Aphris armas, alijs
asumes labon dicitur.

202. Aliqui scorpiuron uocant, alij heliotropon,
alij dialion, alij heliapon, alij scorpioctonon, alij ses-
samon agrion, alij scorpj uram.

202. Aliqui scorpiuron uocant.

NOTHA.

205. Idem adstringit: prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Itē q̄s qui ilei dolore conflictantur: conuenit in grauidarū malacia: sorptum auxiliari constat, cū populatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

217. Quam alij Medicinā, alij symphyton, alij idēum phlomon, alij orestion, alij nectarion uocāt.

226. Alij larbason, alij gynacion, alij Chalcedonion.

231. Alij pecton, hepthon, aracton, lonchoton.

255. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat si lente luna, & secum ferat, cōtra uenena & improbos homines proderit: pecoribus inuandis appenditur: nauigijs circūponi solet: ualet contra capitis dolores & laruas.

De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter facit, lassitudinem discutiet. & si in pedibus ferat, bestias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa- luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est: strangulatuī uulue mirum in modum auxiliatur: urinae stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylum si quis circū corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos consillarū

DIOSCORIDIS

tumores. vnam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, p[er]foram perniciali fame contracta iuuat: remoratos à partu menses eicit: infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam cūm luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa doloribus oculorum auxilium tur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De dictamno.

Dictamnium siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta uini stilla, corpus tangito: siquidem contra omnes serpentium iniurias auxilium tur: vlcera & putrescentes nomas prapurgans explet: adactis corpori aculeis oblinitur, ut presenti sit auxilio: ad lienem & in abditis locis uitia inflammatione turgentia, redactū in farinam illinito. Herbam uere, magnis aestibus, autumnūq; eruito.

De Saluia.

Salvia singultū tuſsimq; discutit: omnibus malis ulceribus cum cera & rosaceo sumpta auxilium tur: lienis dolorem dysenteriamq; pota cum uino albo pari modo sanat: sanguinem excreantibus, potio

N O T H A .

medetur : ad extrahenda uulue onera efficax est : pessimæ mulieres pessum ex ea subiiciunt, ut partus excutiant.

De Cupresso.

Cupressus herba contra rauedines auriculasq; prodest: induratos tonsillarum tumores, aquam inter cutem, & coxendicum cruciatus persanat.

De Centauro.

Centaureum contra inflammata uitia & pulsantes ictus ualet fœminis uulue malo laborantibus auxiliatur: stillicidij urinae, calculorumq; tormenta leuat. Herbam uere oriente sole legito.

De Buphthalmo.

Buphthalmum crescente luna legere oportet. Facit autem contra paiores, laruas, & mala medicamenta, fascinationes, utpote cum eas auertat. Radicem si quis mandat, dentem expuet, fluxionemq; cōfestim sistens auxiliatur: quin & uentrē resoluit.

De Pæonia.

Pæonia herba per æstus Caniculæ ante Solis ortum uellitur: appensaq; contra uenena, fascinū, paiores & laruas prodest: item contra febrem cum horrore uenientem, diurnam nocturnamue, & aduersus tertianam. Proditur lemures à monte, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, ueneficiorum & fascinationis amuletum est.

DIOSCORIDIS

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce-
to, & faciem illinito cum ad negotia te conferes :
uegetiores reddit pueros, imo uentri appensa & ad
arcendos pauores nocturnos manuteneo. Contra
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-
tur: cum enim fascinantes recedunt, arescentem ra-
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit,

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortum erua-
tur, & collo appedatur, ueneficas mulieres omnesq;
fascinantes amolitur.

De Eryfimo.

Erysimon cum uino tritum, aduersus uentris do-
lorem bibitur: si quis grana septem domum iniece-
rit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs boion dici-
tur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bi-
bitur contra omne uenenum, & iocineris uitia.

FINIS.

INDEX OMNIVM

QVAE IN DIOSCORIDE
CONTINENTVR.

A Brotonon	117	Adianton	184
Absynthium	116	Aegilops	185
Absynthiū marinū	116	Aeris squamma	222
Absynthiū Sātonicū	117	Aeris flos	222
Acacalis	40	Aerugo rasa	223
Acacia	43	Aerugo scolecia	224
Acacia altera	43	Aes ustum	222
Acanthus	114	Aethiopsis	179
Acanthum	113	Actites lapis	241
Acāthus syluestris	114	Agallochon	15
Acetum	209	Agaricum	108
Acetū ē betonica	215	Ageraton	166
Acetum mulsum	209	Agnus	45
Acetū scillinum	210	Aiuga	152
Acetū ē stoechade	215	Alabastrites	242
Achillea	162	Alcea	151
Achras	52	Alcibiadion	160
Acida muria	210	Alcyonium	239
Acinos	122	Alisma	132
Acorum	6	Allium	95
Aconitum	173	Aloe	115
Adarces	239	Alfne	176
Adeps omnis	70	Althea	151

INDEX.

Alumen	234	Anisum	127
Alumen scissile	ibidē	Anonis	114
Alus	157	Anthemis	148
Alysson	138	Anthericum	101
Alypon	199	Antyllis	148
Amaracum	121	Antipathes	240
Amaranton	166	Antirrhinon	184
Ambrosia	143	Antispoda	222
Amiantus lapis	241	Aparine	138
Anmi	128	Aphaca	94
Ammoniacon	137	Apiastrum	140
Amomis	12	Apios	198
Amomum	12	Apium	129
Ampelitis terra	245	Apocynon	174
Ampeloprason	54	Apollinaris	169
Amphisbena ictus note		Apri iecur	63
267. eius curatio	268	Apum ictus curatio	271
Amurca	46	Aqua	208
Amygdale amare	53	Aqua frigida	259
Amylum	81	Aqua marina	208
Anagallis	105	Aqua mulsa	208
Anagyris	152	Arabicus lapis	242
Anchusa	160	Araneus	65
Androsaces	147	Arbutus	53
Androsemon	153	Arcion	180
Anemone	104	Arction	179
Anethum	127	Arcturon	ibidem
Anguium senectus	60	Arena	244
		Argemone	

INDEX.

Argemone	105	Astragalus	167
Argēti recrementū	227	Athamanticum	6
Argenti scoria	ibidem	Athera	80
Argenti spuma	ibid. & 257	Atractylis	138
Argentum uiuum	230.	Atramentum librarium	246
& 257		Atramentū sutoriū	231
Arisarum	101	Atriplex	87
Aristolochia	110	Auellana nux	54
Armeniaca mala	51	Auena	80
Armenius lapis	229	Auricula muris	107
Armoracia	86	Auri pigmentum, siue ar senicon	234
Aron	101	Bacca lauri	38
Arrhenogonon	145	Baccharis	122
Arthemisia	143	Balaustium	49
Arundo: vide Harundo		Ballote	140
Asarum	9	Balsamum	13
Asclepias	138	Barbula hirci	94
Ascyron	153	Basilisci ictus notæ	269
Asininum iecur	63	eius curatio	273
Asini ungula	62	Bdellium	30
Asinus lapis	240	Beta	88
Aspalathus	14	Betonica	154
Asparagus	89	Bitumen	35. & 36
Asplenon	142	Blata pistrinaria	62
Aspidis ictus notæ	269	Bliton	86
eius curatio	273	Botrys	143
Aster Atticus	182		

Pp

INDEX

Brassica	87	Cancamum	15
Brassica marina	88	Canceri	59
Brassica sylvestris	87	Canis rubus	41
Britanica	155	Canis rabidi iecur	63
Bromus	185	Canis rabiosi signa	264
Bryon	15	curatio morsus eius	
Bryonia	199	255.ab eo morforum	
Buccina	57	nictus ratio.	256
Buglossum	183	Cannabis	151
Bulbus esculentus	102	Cantharides	65
Bulbus vomitorius	102	Capnos	180
Bunion	182	Capparis	103
Buprestis	65. & 252	Capre ungula	62
Buphthalmos	149	Caprinum iecur	ibidem
Butyrum	68	Cardamomum	7
Butyri fuligo	ibide	Cardamina	90
Acacia	182	Carduus	113
Canchrys	132	Carpasi succus	154
Cadmia	219	Cariota	48
Cecilie ictus nota	167	Carum	127
curatio eadem que uis-		Casews	67
pere morsus.		Casia	10
Calamus odoratus	13	Castanea	47
Calamintha	120	Castorium	60
Calcifraga	199	Catanance	184
Caltha	257	Caucalis	93
Calx	230	Cedria	37
Calx uina	238	Cedrides	38

INDEX

Cedromela	51	Chamaesyce	183
Cedrus	37	Chamaelea	197
Celticum nardum	8	Characias tithymalus	
Cenchri ictus nota	268		193
eius remedia	273	Chelidonium	106
Centaurium magnum		Chelidonium minus	106
110		Chia terra	245
Centaurium minus	111	Chondrylla	92
Cepa	95	Chrysanthemon	166.
Cepaea	152	& 229	
Cera	78	Chrysocolla	229
Cerastia	50	Chrysocome	165
Cerastia ictus nota	260	Chrysogonon	ibidem
eius curatio	273	Cicade	64
Gerui genitale	62	Cicer sativum	82
Cervinum cornu	64	Cicer arietinum	ibidem
Cerussa	228. & 256	Cicer sylvestre	82
Cestron	154	Cichorion	91
Chalcitis	232	Cici	193
Chamae	58	Cicuta	174. & 154
Camæactæ	197	Cimices	62
Chamaecissos	183	Cimolia	245
Chamaelaphne	187	Cinis sarmentitius	238
Chamaedrys	139	Cinnabaris	230
Chamaeleo albus	111	Cinnamomum	11
Chamaeleo niger	112	Cionia	57
Chamaeleuce	183	Circea	144
Ch. mæpitys	152	Cirsum	181

Pp ij

INDEX.

Cistus	41	Gornus	52
Citria mala	51	Corruda	89
Clematis	156	Cos Naxia	244
Clinopodium	139	Costus	12
Clymenon	157	Cotonca mala	51
Cnicus	201	Cotyledon	177
Coagulum	69	Cratæogonon	145
Coccum gnidion	197	Crimnon	80
Coccum infectoriū	164	Crithmum seu critha = mon	90
Cochleæ	58	Crocodilion	112
Cœruleus	230	Crocomagna	16
Colchicon	175	Crocum	ibidem
Colligendorū ratio	4	Croton	193
Colocasia	83	Cucurbita	92
Colocynthis	198	Cucumis sativus	92
Colymbades	45	Cucumis sylvestris	188
Communis curatio in o= mnes ictus virulentos		Cuminum sativū	127
269.		Cuminum sylvestre ibi= dem	
Conyza	144	Cunila	118
Corallium	240	Cupressus	36
Coriandrū 128. & 253		Curmi	79
Coria veteramentaria		Cyclaminus	99
63		Cyclaminus altera	100
Coriarius frutex	48	Cydonomeli	212
Coris	152	Cynia	202
Coronopus	90	Cynocrambe	ibidem
Cornu cerui	64		

INDEX.

Cynoglosson	183	Dracunculus	100
Cynosorchis	146	Dryini ictus notæ	268
Cyparissias tithymalus		eius curatio	273
194		Dryopteris	201
Cyphi	15	Dulcis radix	110
Cypirus	7	E Benus	42
Cytinus	49	E Ebulum	197
Cytisus	180	Ebur	64
D Amascena pruna		Echinus	57
55		Echion	160
Damasonion	132	Elaphoboscon	130
Daphnoides	186	Elaterion	183
Daucus	131	Elatine	162
Delphinium	ibidem	Electrum	39
Dendroides tithymalus		Elelispheos	119
194		Elæomeli	18
Deuteria	206	Eleoselinum	129
Dictamnium	119	Elichryson	166
Dictamnii Cretense	119	Empetron	199
Diphryges	233	Ephemeron 175. et	252
Dipsacum	112	Epimedium	159
Dipsadis morsus notæ		Epimelis	52
268. eius curatio	273	Epipactis	180
Dorycnion 171. &	253	Epirotica mala	51
Draba	97	Epithymum	199
Draco marinus	59	Equisetum	164
Draconis marini ictus		Equorum lichenes	63
remedia	271	Eretria terra	244

P p iij

INDEX

Erica	40	Flos aris	222
Erinaceus	57	Flos salis	237
Erinei	56	Flos punice	49
Erinus	161	Flos sylvestris punici ibi	
Eruca	93	dem	
Eruca olerum	65	Foeniculum	130
Eruca pinorū 65. et	251	Foeniculum erraticum	
Erum	84	ibidem	
Eryngium	115	Fœnum græcum	81
Erysimon	97	Fraxinus	38
Erythrodanon	150	Fuligo è myrrha, resina,	
Eupatorium	163	styrace	32
Euphorbium	135	Fuligo liquide picis	35
Faba	82	Fuligo pictoria	245
Faba Aegyptia	83	Fuligo thuris	32
Fæx	238	Fumaria	180
Fagus	47	Fungi	175. & 256
Farina crassior	80	G Agates lais	242
Fel	74	G Galactites lapis	
Ferri rubigo	225	242	
Ferula	133	Galaxias	ibidem
Festuca	185	Galbanum	136
Fibrini testes	60	Galerita	64
Ficus	55	Galion	177
Filicula	201	Galiopsis	ibidem
Filix	200	Galla	47
Filix femina	ibidem	Gallina	63
Fimum	75	Gallina cerebellum	ibid.

INDEX

Garum	62	Gummi amygdala	53
Genitale cervi	62	Gummi cerasi	50
Gentiana	109	Gypsum	238 & 256
Geranium	144	H Aematites	241
Geodes lapis	244	H Hæmorrhoi ictus	
Gingiberis	98	note 268. eius curatio	
Gingidion	93	273	
Gith	134	Halica	80
Gladiolus	159	Haliacacabō solanū	171
Glans	47	Halimus	49
Glans Iouis	47	Harundo	39
Glans Sardiana ibidem		Harundo Cypria ibidem	
Glans unguentaria	192	Harūdo wallatoria ibid.	
Glastum sativum	107	Hastula regia	101
Glastum sylvestre	107	Hedera	105
Glaucium	137	Hedysaron	147
Glaux	185	Helcysma	227
Gluten piscium	137	Helenium	16
Glutinium	ibidem	Helenium alterum	16
Glycyside	149	Helioscopius	194
Gnaphalium	144	Heliotropium magnum	
Gnidium granum	107	202	
Gobius	61	Heliotropium parvum	
Gramen	161	ibidem	
Gramen arundinaceum		Helleborum album	187
ibidem		Helleborum nigrum	187
Gramē Parnasi ibidem		Helxine	162. & 175
Grossi	56	Hemerocallis	145

P p - iiij

INDEX.

Hemionitis	148	Hypocistis	41
Herba sabina	37	Hyssopum	117
Hieracium magnū	128	Iaspis	243
Hieracium paruum ibi-		Iberis	56
dem		Ibiscum	151
Hippace	68	Ichthyocolla	137
Hippocampus	57	Idea radix	164
Hippoglosson	183	Iecur apri	63
Hippolapathon	86	Iecur asininum	ibidem
Hippomarathon	130	Iecur canis rabidi	ibid.
Hippophaes	192	Iecur caprinum	ibidem
Hippophaeston	193	Iecur mergi	ibidem
Hippopotami testes	60	Illecebra	176
Hippofelinon	129	Ilex	47
Hirci barbula	94	Indicum	230
Hirculus	8	Inguinalis	182
Hirundines	64	Intybus	91
Hirudo	255	Iouis glans	47
Holostium	157	Irio	97
Hordeum	79	Iris	5
Horminum	146	Isopyron	182
Hyacinthus	167	Iudaicus lapis	243
Hydromeli	212	Iuglandes nuces	53
Hydromelon	212	Iuncus	165
Hydropiper	99	Iuncus odoratus	13
Hyoscyamus 169. et	254	Iuniperus	36
Hypericon.	169	Ius piscium	62
Hypericon	152	Ixia	256

INDEX

L Abrū Veneris	112	Lens palustris	176
Labrusca	203	Lentiscus	33
Lac	66	Lentiscina resina	34
Lac coagulatum	257	Leontopetalon	139
Lac humanum	67	Leontopodion	183
Lac schiston	67	Lepidium	104
Lactis serum	ibid.	Leptocarya	54
Lacerta	66	Lepus marinus 60. et	58
Lactuca sativa	92	Lepus terrestris	60
Lactuca sylvestris	ibid.	Leucacantha	114
Ladanum	42	Leucanthemon	148
Lagopus	158	Leucas	139
Lampsana	86	Leucoion	145
Lana	68	Lichenes equorum	63
Lana cremata	ibidem	Lichen	165
Lanaria herba	99	Lignorum marcor	39
Lappa	185	Ligusticum	125
Lapathum	86	Ligustrum	41
Lasfer	134	Lilium	140
Laserpitium	ibidem	Lilium sylvestre	145
Lathyris	195	Limonion	158
Lauer	90	Lingua bubula	183
Laurus	38	Linoxostis	201
Laurus Alexandri =		Linum	82
na	186	Lithocolla	243
Lauri bacca	38	Lithospermon	150
Lemnia terra	231	Locustæ	64
Lens	83	Lolium	81

INDEX

Lonchitis	150	Malum praeox	ibid.
Lora	409	Malum punicum	49
Lotus arbor	52	Malum sylvestre	ibid.
Lotus Aegyptia	181	Mādragoras	171 et 254
Lotus sylvestris	180	Manna thuris	31
Lotus urbana	ibidem	Marcor lignorum	39
Lupinus	84	Maron	122
Lychnis coronaria	140	Marrubium	141
Lychnis sylvestris	ibid.	Marrubium nigrū	140
Lycium	43	Mastiche	33
Lycopsis	160	Meconium	255
Lygos	45	Medica	94
Lysimachia	155	Medica mala	51
M Acer	39	Medion	159
M Mene	61	Medulla	73
Magnes	242	Mel	77
Magudaris	185	Mel heraclion	253
Malabathrum	10	Melampsythium	232
Malicorium	49	Melanteria	232
Malua	86	Melanthium	134
Malum	51	Melia terra	245
Malū Armeniacum	51	Melilotos	122
Malum cotoneum	51	Melimela	81
Malum dulce	51	Melissophyllon	140
Malum Epiroticū	ibid.	Melitites lapis	242
Malum Medicū	ibid.	Melomeli	212
Malū orbiculatū	ibid.	Memphites	243
Malum Persicum	ibid.	Mentha	120

INDEX

Menthastrum	ibidem	Myagron	181
Meon	6	Myosotis	207
Mercurialis	201	Myrica	40
Mergi iecur	63	Myrrha	28
Mespilus	52	Myrrha Boeotica	29
Metopion unguentū	27	Myrrhis	181
Milium	80	Myrtidantum	50
Millefolium	181	Myrtussatiua	50
Millepede	62	Myrtus sylvestris	186
Misy	232	N	
Mituli	58	Aphtha	36
Moly	124	Napus	85
Molybdæna	226	Narcaphthon	15
Molybdoides lapis	227	Narcissus	192
Morochthus	242	Nardi genera	7
Morus	54	Nardum Celticum	8
Mullus	60	Nardum montanum	9
Mulsum	208	Nardinū unguentū	28
Muralis herba	175	Nasturtium	97
Muria	237	Natricis ictus notæ	268
Mures	66	eius curatio	273
Muris auricula	207	Nepeta	120
Mus araneus	66	Nerion	174
Muris aranei ictus notæ	268	Nitrum	237
eius curatio	264	Nitri spuma	237
Muscus	15	Nux auellana	54
Muscus marinus	178	Nux iuglans	53
Mustela	61	Nux pinea	32
		Nymphaea	147

INDEX

O Chra	230	Oleum sinapinum	19
Ocymastrum	160	Oleum styracinum	30
Ocymum	93	Oleum terebinthinū	20
Oenanthe	144. & 204	Oliuæ colymbades	45
Oesypum	69	Oloschoenos	165
Olea sylvestris	45	Olusatrum	129
Oleaster	ibidem	Omphacium	204
Olea ethiopica lacry =		Omphacomelites	212
ma	46	Onagra	181
Olei vires	17	Onitis	118
Oleum amygdalinū	19	Onobrychis	152
Oleum balaninum	19	Ononis	114
Oleum cicinum	18	Onosma	147
Oleum enicinum	19	Onyx	58. et 242
Oleū è gudio grano ibi.		Ophioscorodon	96
Oleum hyoscyaminū	19	Ophites lapis	243
Oleum laurinum	20	Opium	168
Oleum lentiscinum	20	Opobalsamum	13
Oleum mastichinū ibid.		Opopanax	24
Oleum melanthinū	19	Orbiculata mala	51
Oleum melinum	52	Oreoselinon	129
Oleum myrteum	20	Origanum	118
Oleum oliuæ sylvestris		Origanū sylvestre ibid.	
17. & 45		Ornithogalum	94
Oleum omphacinū	17	Orobanche	93
Oleum picinum	35	Oryza	80
Oleum raphanium	19	Osisifragus	64
Oleum Sicyoninum	18	Ostracites	244

N D E X

Osyris	185	Parthenium	149
Othonna	106	Passum	205
Ouorum natura	63	Pastinaca herba	126
Oui candidum	ibidem	Pastinaca marina	60
Oxalme	210	Pastinacæ marinæ ictus	
Oxylapathum	86	notæ 268 eius cura =	
Oxymyrsine	168	tio 272	
P Aederota	114	Pedicularia	190
Pœnia	149	Pelecinon	147
Paliurus	40	Peplis	195
Palma	48	Peplos	ibidem
Palma elate	49	Pepo	92
Palma Thebaicæ	48	Periclymenon	158
Panaces Asclepij	125	Peristereon	166
Panaces Chironiij	ibid.	Persea	56
Panaces Heracleum	125	Perfica mala	51
Pancration	103	Personata	180
Panicum	80	Petasites	ibidem
Papauer corniculatum		Petroselinum	129
169. & 255		Peucedanon	133
Papauer erraticum	167	Phalangium	141
Papauer sativum	ibid.	Phalangij morsus no-	
Papauer spumeum	169	tæ 267 eius cura =	
Pappi	255	tio	271
Papyrus	39	Phalaris	150
Paralios	194	Pharicon	255
Pardalianches	173	Phasiolus	84
Paronychia	165	Phœnicobalanus	48

I N D E X

Phœnix	163	Polion	142
Phrygius lapis	240	Polycnemon	139
Phu	9	Polygala	185
Phycus marinus	178	Polygonaton	156
Phyllitis	141	Polygonon	155
Phyllon	145	Polypodion	201
Phyteuma	183	Pompholyx	220
Picea	32	Populus alba	38
Picis liquida fuligo	35	Populus nigra	ibidem
Pineæ nuces	32	Porrum capitatum	94
Pinorū erucæ 65. et	251	Portulaca	88
Pinus	32	Potamogeton	178
Piper	98	Poterion	113
Piscium ius	62	Propolis	78
Pissasphaltos	36	Prunus, pruna	82
Pisselaon	35	Pseudobunion	182
Pistacia	53	Pseudocasia	10
Pityusa	195	Pseudocinnamomū	12
Pix liquida	35	Pseudodictamnium	119
Pix sicca	35	Psoricon	232
Plantago	89	Psychotrophon	154
Platanus	38	Psyllion 170. &	253
Plumbago	226	Ptarmica	99
Plumbum elotum	225	Pulegium	118
Plumbum ustum	ibid.	Pulegiū sylvestre	119
Plumbi recrementū	226	Pulicaria	170
Pnigitis terra	245	Pullicula	80
Polemonia	156	Pulmones animalū	62

INDEX

Pumex	235	Rheon	ibidem
Purpura	57	Rhodia radix	164
Pygnoconon	198	Rhododendron	174
Pyrafter	52	Rhus	48
Pyrethrum	131	Ricinus	193
Pyrites	241	Rofa	43
Pyrorum genera	52	Rofei pastilli	ibidem
Q Vercus	47	Rofmarinus	131
Quifquefoliū	163	Rofmarinum corona =	
R Adicula	99	rium	132
Radix	85	Rubeta	258
Radix dulcis	110	Rubia	150
Radix fylueftris	86	Rubigo ferri	225
Rana	61	Rubrica fabrilis	231
Rana paluftris	258	Rubrica Sinopica	ibid.
Ranunculum	104	Rubus	162
Rapum	85	Rubus canis	41
Recondendorū ratio	5	Rubus Idæus	162
Recrementū argēti	227	Rumex	86
Refine uarie	34	Rufcum	186
Refina lentifcina	34	Ruta	122
Refina liquida è pinu et		Ruta fylueftris	123
picea	34	S Abina herba	37
Rha	109	Saccharum	77
Rhamnus	40	Sacra herba	166
Rhaphanus	85	Sagapenum	135
Rhaphan^s fylueftris	86	Sal	236
Rhaponticum	109	Salis flos	437

INDEX

Salis spuma	437	Scammonia	196
Salamandra 65 &	252	Scandix	93
Salinaris	131	Schistum lac	67
Salunca	8	Schistos lapis	242
Salix	48	Scilla	192
Salvia	119	Scincus	66
Sambucus	197	Scolopendra	59
Samia terra	244	Scolopendræ ictus notæ	
Samius lapis	ibidem	267. eius curatio	271
Sampsuchum	121	Scolymos	113
Sandaracha 234 &		Scordion	142
257		Scorodoprasum	96
Sandyx	234	Scoria plumbi	226
Sanguinaria	155	Scorpioides	202
Sanguinaria fœmi =		Scorpius marinus	59
na	156	Scorpius terrestris	ibid.
Sanguis	74	Scorpij ictus notæ	267
Sanguis tauri	257	eius curatio	271
Sapa	265	Securidaca	147
Saphirus	243	Sedum magnum	176
Sarcocolla	137	Selenites lapis	243
Sardianæ glandes	47	Selinusia terra	245
Sardonis	254	Semen	80
Sarmentitius cinis	238	Semperiuium	176
Satureia	121	Semperiuii minus	176
Satyrion	146	Senecta anguim	60
Satyrion erythronion		Senecio	178
ibidem		Sepia	60

Seps

INDEX

Seps	66	154	
Seris	91	Smilax aspera	185
Serpyllum	121	Smilax levis	186
Sertula campana	122	Smyris lapis	244
Serum lactis	67	Smyrnion	129
Sesama	81	Solanum hortense	170
Sesamoides	188	Solanum manicum	171
Seseli	126	Solanū somniferū	ibid.
Seseli Aethiopicū	126	Sonchus	91
Seseli Greticum	ibid.	Sorba	52
Seseli Peloponnese	ibid.	Sory	233
Setanium	32	Sparganion	159
Sicyonium oleum	18	Spartion	191
Sideritis	161	Spatha	48
Sidion	49	Sphondylion	132
Siligo	80	Sphragis egos	231
Siliqua	51	Spina acuta	41
Silphium	134	Spina alba	113
Silurus	61	Spina Arabica	ibid.
Silybum	192	Spongia	239
Sinapi	96	Spongiarū lapides	243
Sion	90	Spuma nitri	237
Sifer	86	Spuma salis	236
Sifon	126	Spuma argenti	227 .
Sisymbrium utrūq;	90	☉ 257.	
Sitania	79	Squamma eris	223
Smarides pisces	61	Squamma exacie de-	
Smilax 94. ☉ 185. ☉		cussa	223

Q9

INDEX

Stachys	141	Terebinthus	33
Stacte	27	Terebinthina	ibidem
Staphis agria	190	Terra	244
Stercus ferri	225	Terra fornacum	245
Stibium	227	Teste	245
Stimmi	ibidem	Testiculus canis	140
Stœbe	157	Teucrion, Teucris	139
Stœchas	117	Thalossomeli	209
Stomoma	223	Thaliëtron	178
Stratiotes	178	Thapsia	190
Stratiotes millefolium		Thelygonon	146
ibidem		Thlaspi	97
Strigmēta balnearū	18	Thracias lapis	242
Struthia cotonea	51	Thunnus	62
Struthion	99	Thus	30
Styrax	29	Thuris cortex	31
Succinum	39	Thuris fuligo	32
Suillus pulmo	62	Thuris manna	31
Suillus talus	64	Thyites lapis	242
Sulphur	235	Thymelea	197
Sycomorus	54	Thymoxalme	210
Symphyton	157	Thymus	120
T Alus suis	64	Tilia	41
Tamarix	40	Tihymali	193
Taxus	174. & 254	Tordylion	126
Tauri sanguis	257	Torpedo piscis	59
Telephion	107	Toxicon	255
Tellinæ	58	Tragacantha	114

INDEX

Tragium	164	Vimen	45
Tragoriganum	118	Vina marina	211
Tragos 80. &	164	Vina picata	214
Tribulus	158	Vina resinata	214
Trichomanes	185	Vini natura	205
Trifolium	141	Vinum abiegnum	214
Trimestria	228	Vinum abrotonites	216
Triphyllon	141	Vinū absynthites	215
Tripolion	184	Vinum acorites	217
Trissago	139	Vinum adynamon	207
Triticum	75	Vinum anethinum	218
Tuber	94	Vinum apiites	212
Tussilago	143	Vinum aromatites	216
Typha	144	Vinum asarites	217
V Eneata	259	Vinum bunites	216
Veneris umbili =		Vinū calaminthites	216
cus	177	Vinū catorchites	213
Veratrum album	187	Vinum cedrinum	214
Veratrum nigrum	187	Vinum cedrites	214
Verbascum	179	Vinum cestrites	214
Verbenaca	166	Vinū chamædryites	215
Vermes terreni	66	Vinū è chamælea	218
Vesparum ictus cura =		Vinū chamæpitinū ibi.	
tio	271	Vinum è conixa	216
Vesicaria	171	Vinum cupressinū	214
Vetonica	154	Vinū cydonites	211
Victus ratio in morsu		Vinum daucites	217
rabiosi canis	266	Vinū dictamnites	216

Qq ij

INDEX

Vinum è flore salis	218	Vinum pineum	214
Vinum helleborites	218	Vinum è pipere	217
Vinum hyssopites	215	Vinum è pulegio	216
Vinum ex iride	217	Vinum resinatum	214
Vinum iuniperinũ	214	Vinum rhodites	212
Vinum laurinum	ibid.	Vinum rhoetes	ibid.
Vinum lentiscinũ	213	Vinum saluiatum	217
Vinum mandragorites		Vinum è satureia	216
	218	Vinũ scammonites	219
Vinũ marathrites	218	Vinum scillinum	211
Vinum è marrubio	216	Vinum selinites	218
Vinum melites	211	Vinũ stœchadites	215
Vinum melities	207	Vinum strobilites	214
Vinum melomeli	217	Vinum è sycomorìs	213
Vinum è myrrha	217	Vinũ è Syriaca nardo,	
Vinum myrsinites	213	celtica, malabathro	
Vinum myrtites	212		217
Vinum à nardo sylue-		Vinũ terebinthinũ	213
stri	217	Vinum thymites	216
Vinum nectarites	217	Vinũ è thymelœa	217
Vinum œnanthinũ	212	Vinum tragoriganites	
Vinum omphacites	207		216
Vinum palmeum	213	Viola alba	145
Vinum organites	216	Viola purpurea	182
Vinum panacites	217	Viperæ ictus notæ	267
Vinum phthorion	218	eius curatio.	272
Vinum è petroselino ibi.		Viperinæ carnes	59
Vinum picatum	214	Viscum	137

INDEX

Vitis alba	199	Vng. nardinum	28
Vitis nigra	200	Vng. ocyminum	23
Vitis sylvestris	199	Vng. œnanthinum	22
Vitis vinifera	203	Vng. onychinum	25
Vitex	45	Vng. rosaceum	21
Vlmus	39	Vng. sampsuchinũ	22
Vmbilicus Veneris	177	Vng. styracinum	25
Vredo	53	Vng. susinum	23
Vnguentorũ ratio	20	Vng. telinum	22
Vng. abrotoninum	23	Vngula asini	62
Vng. amaracinum	26	Vngula capræ	ibid.
Vng. anethinum	23	Vnguis odoratus	58
Vng. butyrium	25	Vrina	76
Vng. cinnamominũ	27	Vrtica	177
Vng. crocinum	24	Vstio contra uenena =	
Vnguentũ cyprinũ	25	tos ictus	265
Vng. elatinum	21	Vua	203
Vng. gleucinum	26	Vua passa	204
Vng. hedychoon	27	Vulpinus pulmo	62
Vng. iasminum	28	X Anthion	185
Vng. irinum	25	X Xyphion	159
Vng. lilinum	23	Xylobalsamum	13
Vng. malabathrinũ	28	Xylocinnamomum	11
Vng. megalinum	27	Xyris	159
Vng. melinum	22	Z Ea, seu semen	80
Vng. mendesium	27	Z Zopissa	35
Vng. metopion	27	Zythum.	79
Vng. narcissinum	24		

FINIS.

Rq iij

INDEX NOMEN-
CLATIONVM, QVIBVS OF-
ficinae Seplasiariorum, & Herbarij
nostri temporis utuntur.

A Cacia	43	Buglossa	181
Agnus castus	45	C Alamentum	120
Agrimonia	163	Camomilla	148
Alcanna	41	Capillus Veneris	184
Alkekengi	170	Caprifolium	158
Aloe	15	Cartamus	201
Apium	129	Cataputia maior	193
Apium risus	144	Cataputia minor	195
Aphrodilos	101	Cauda equina	104
Arabis	97	Centinodia	155
Artichault	113	Cerefolium	93
Aspergula	138	Ceterach	142
B Alsamita	90	Cheiri	145
Bardana	180	Coloquintida	198
Basilicon	93	Consolida maior	157
Berberis	41	Cornu cerui	90
Berula	90	Crassula maior	107
Bismalua	151	Cucumer asininus	188
Borago	183	D Ragagan =	
Branca ursina	114	tum	114
Bruscus	186	E Nula campana	16
Bryonia	199	Eupatorium vulga	

INDEX

tum	151	M	Aluaniscus	151
F Aba inuersa	107	M	Malū granatū	49
Filipendula	144	Mastix		33
Flammula	156	Matricaria		149
Fumus terræ	180	Matrisylua		158
G Allitrichum	146	Melissa		140
Genista	191	Mexereon		197
H Edera terre =		Milium solis		150
stris	183	Millefolium		178
Hepatica	165	Morsus gallinæ		176
Herba Iudaica	161	N Asturtium a =		
Herba Simeonis	151	quaticum		90
Herba tetrahil	161	Nenuphar		147
Hermodaetylus	175	O Robus		
I Arus	101	84		
Iringus	115	P Apauer cornu =		
Iua arthritica	152	tum		255
Iusquiamus	169	Papauer rubrum		167
L Acca	15	Parietaria		162
Lapatium	86	Perforata		152
Lappa maior	180	Persicaria		145
Lappa minor	185	Pes columbinus		144
Laureola	186	Petroselinum		129
Lenticula aque	176	Piperitis		104
Lilium conuallium	175	Plantago aquatica		152
Linaria	185	Polytrichon		185
Lingua hircina	160	Prasium foetidum		140
Liquiritia	110	Pulicaria		144

Q 9 iiij

INDEX

R <i>Esta bonis</i>	114	<i>Squinantum</i>	13
<i>Reuponticum</i>	110	<i>Stichas Arabica</i>	117
<i>Rostrum porcinum</i>	91	<i>Stœchas citrina</i>	166
<i>Rubia tinctorum</i>	150	<i>Sumach</i>	48
S <i>Aponaria</i>	102	T <i>Amariscus</i>	40
<i>Satyrion</i>	146	<i>Tapfus barba =</i>	179
<i>Scariola</i>	91	<i>tus</i>	179
<i>Scrofularia minor</i>	106	<i>Terpentina</i>	33
<i>Sicla</i>	88	V <i>Ermicularis</i>	176
<i>Sigillum Salomonis</i>	156	<i>Vicia syluestris</i>	94
<i>Siler montanum</i>	126	<i>Vincamperuinca</i>	156
<i>Solatrum</i>	170	<i>Virga pastoris</i>	112
<i>Sparagus</i>	89	<i>Vngula caballina</i>	143
<i>Spelta</i>	80		
<i>Squilla</i>	102		

FINIS.

CVRATIONVM
MORBORVM IN
DIOSCORIDE
contentarum Index.

ABSCENSVM
remedia.

M^{El}
Cucurbitæ

Thlaspi Mentha

Viscum

Bechion siue Thussilago

Pentaphyllon

Buglosson

ABORTVM

facientia.

Asparagus

Ampeloleuce

Hedysaron

Populus alba

Oxyacanthos

Coagulum

Brassica sativa

Cyclaminos

Dracunculus duplex

Onosma Elaterium

Scammonium

Thelypteris

Vinum phthorion, siue
abortivum

Vinum helleborites

Conixa.

ABORTVS,

remedia.

Sabina

Galbanum

ACONITO

contraria.

Balsamum

Morus

Lac schiston

Coagulum

Chamæpitys

Vinum in communi

Scoria, siue recrementum
ferri.

Diosco. lib. 6. cap. 7.

ACVLEOS ex=

parto acer

*herba bene-
nosa*

INDEX

trahentia.
Vide, spicula corpori in-
fixa extrahentia.

putura *despectus* remedia.

Laurus
Malua
Sisymbrium
Anisum
Althea
Oxalme
Vinum thymite
Adipum medelæ
Diosc. lib. 2. cap. 63.

ch brusaro ADVRENTES
medicinæ.

Buprestis
Cantharides
Pityocampe
Salamandra.

ADVSTIONVM
remedia.

Vide, Ambustorum
remedia.

spes mōhi AEGYLOPIAE
remedia.

Asarum
Iuglans

Malua Plantago
Myosota, uel myosotis
altera

Baccharis Anthemis
Strychnon satium siue
Solanum hortense

Aegilops
Vua cenanthe Alica.

ALARVM uirus
extinguentia.

Myrrha Myrtus
Scolymos, siue Car-
dus Alumen.

ALGORIS res
media. *frigoris*

Laurinum oleum
Ocyminum unguentum
Cinnamomum
Aristolochia terra
Abrotonum

Vinum scilliticum
Eleomel, uel Eleomeli.

ALLII acrimoniam
aspza extinguentia.

Ruta

ALOPECIAE mor-
pelaria bi remedia.

Oryza Harundo Iuglans

CVRATIVVS.

Auellana

atque purgantia.

Erinaceus terrestris

Asarum

Crocus

Hippocampus

Crocomagma

Rane

Locusta

Oleum amygdalinum

Adeps

Fimum

Oleum cicinum

Rhaphanus

Beta

Oleum balaninum

Cape

Milium

Oleum cnidium

Sinapi

Cyclaminus

Olea Aethiopica

Asphodelus

Fagus

Galla

Batrachion

Faba Thebaica

Myosotis

Siliqua

Nymphaea

Mespilus

Cornus

Cynoglosson

Ficus Aegyptia

Adianton

Thapsia

Caprificus

Aerugo ferri

Cerasia

Melimela

Sandaracha

Citrea mala

Pruna

Halcyonium

Cotes

Amygdala amara

Cinis ungularum capri-
narum.

Morus

Ficus

Telline

Chama

ALVVM con-

Iuncus odoratus

turbantia. *Vet. n.*

Cochlea terrestres

Eruum

Orobis

Sepia

Silurus

Brassica sativa

Pisces saxatiles

Allium

Capparis

Lac

Lac schistum

Peplus

Vua recentes

Butyrum

Medulla

Vinum dulce

Fel

Fimum

Aqua maris Flos salis.

Tragus

Iinum

ALVVM soluentia

Lens

Phaselus

INDEX

Rhaphanus		Hippophaes	
Lapathum		Characias	Linosthis
Nasturtium		Lathyrus	Quercus
Eruum	Eruca	Chamaesyce	Cici
Scandix	Lactuca	Scammonium	
Cucumis		Ampeloleuce	
Cucurbita	Atriplex	Thelypteris	Passum
Brassica sativa		Melicratum	
Brassica marina		Vinum Albanum	
Malva Blitum		Vinum Lesbium	
Asparagos		Coccimela	
Porrum	Cape	Vinum melitite	
Struthion	Zinziber	Thalassomeli	
Cyclaminos	Scilla	Vinum absynthite	
Bulbus esculentus		Vinum helleborite	
Agaricum	Aloe	Vinum scammonite	
Absynthium scriphium		Rubrica sinopis.	
Hyssopum		ALVVM sistentia.	
Ammoniacum		Aspalathus	
Phyllitis	Cestron	Mastichinum	
Scordion		Laurinum	
Chamaepitys		Populus nigra	
Androsomon		Populus picea	
Papaver ceratitis		Paliurus	
Vrtica	Cynoglosson	Oxyacantha	
Spartum		Cynosbatos	
Balanus myrepica, siue		Cistos	Rosa
glans unguentaria		Acacia	Palma

CVRA TIVVS.

Palma elate		Polygonon mas
Malum punicum		Lagogus
Malus	Siliquæ	Clematis daphnoides
Cotoneæ		Xyris Anchusa
Mala epirotica		Gramen Parnasium
Pyra	Mespilus	Rubus Pentaphyllum
Lotus	Cornus	Phoenix herba
Sorbus	Pruna syriaca	Idea radix
Lepus terrestris		Oxyschœnus
Lac	Caseus	Rubrica sinopis
Fulygo butyri		Aizoon
Sanguis	Fimum	Papauer sativum
Lyncurion	Triticum	Adianton
Brassica sativa		Phlomidès Vna
Hordeum	Plantago	Vinum phalernum
Crimnon	Seris	Vinum œnanthe
Bromos	Chondryllæ	Vinum passum
Oryza	Alica	Vinum rhoite
Milium	Faba	Vinum myrtite
Lens	Anethum	Vinum cedri
Apium	Aphace	Vinum lauri
Smyrnion		ALVINIS utilia.
Hippomarathrum		Coagulum
Acantha		Nymphaea
Aloe	Hæma	Clymenon
Ruta	Anisum	Papauer sativum
Orchis serapias		Omphacomeli
Pœonia	Althea	AMATORIIS nec

INDEX

icati.

neficijs attributa.

Cyclaminos
Catanance
Dorycnion
Cotyledon
Mandragoras
Leontopodion
Phyteuma.

Lilium
Morus
Narcissus
Oliue colymbades
Ouum
Platanus
Sesamum
Sal
Myrtus
Malua
Picea
Plantago
Stimmi
Thus

AMBUSTORVM

Vnguentum felinum.

brusati

remedia.

AMPHISBAENAE

Acacia

serpe morsus curatio.

Asphodelos

Diosc. lib. 6. cap. 64.

Aristolochia

ANGINAE re

Althea

Ascyron

scavalia media.

Aixoon maius

Acetum Absynthium

Archion

Alumen

Cyprinum unguentum

Atramentum scriptorii

Cedria

Cape

Buccinum

Beta

Crocodilium

Cyros

Cistos

Elaterium

Corium ustum siue ueterum calceamentorum

Fel animalium

Fimum

Hirundo

Cynoglossum

Hyssopus

Irinum

Cinnabaris

Laserpitium

Ebulus

Fimum

Mel

Oxymel

Phlomis, siue uerbascu

Spartum siue genista

Gallion

Hedera

Sal

Viola

Hypericon

Helxine

Piper

Pix

Lactuca sylvestris

Rhaphanus

CURATIVVS.

ANHELITVS dif Bdelium

ficulatis re-

media. *fiato*

Panaces heracleon

Terra lemnia

Asarum

Balsamum

Diosco lib. 6. cap. 55.

Naphtha

ANIMI defectus

Centaurium maius

remedia.

Baccharis Peucedanum

Cucumis

Pulegium

Galbanum

Coris

Parthenion

ANIMI volupta-

Adianton

tes auget.

Ampeloleuce

Buglosson.

Et infra in uerbo Ortho
pnoicis.

ANIMI deliquia
generantia.

ANIMALIVM fe-
ritas mitigatur.

Diosc. lib. 6. in prefat.

ANODYNA.

Oenagra

Hyoscyamus

ANI remedia.

Aconitum pardalian-
ches.

Vide, Sedis remedia.

ANIMALIA uen-
tris expellentia.

ANTIDOTVM

ingredientia. *remedio
contra veneno.*

Vide, Tineas latas pellen-
tia.

Acorus

Phu

ANIMALIA que
perimunt.

Amomum

Costum

Iuncus odoratus

Cy hi

Diosco. lib. 6. in prefat-
tionis fine.

Scincus siue scingus

Sanguis Rape satine.

ANIMALIVM

Napum, siue bunias

ictus remedia.

Brassica satina

INDEX

Piper	Abrotonum	ARANEIS con-
Stichas	Ruta	traria.
Caros	Anethum	Morus
Petroselinon		Grossi
Hedysaron		Melanthion.
Mandragoras		ARANEI ictus
Rubrica, siue terra le-		remedia.
mnia.		Mullus piscis
APVM ictus		Allium
remedia.		Melissophyllon
Laurus	Malua	Coris Oxyschœnus
Sisymbrium		Hyacinthus
Althea		Aizoon maius.
Diosc. lib. 6. cap. 57.		ARGENTI uiui
APOSTEMA-		curatio.
tum remedia.		Diosc. lib. 6. cap. 28.
Vide, Suppurationum		ARGEMATVM
remedia.		morbi remedia. <i>in 2.</i>
APPETITVM ge-		Fel animalium <i>in 2. p. 10.</i>
nerantia.		Vrina <i>oculorum</i>
Cerasia.		Lactuca sylvestris
APPETITVM		Cera Argemone
incitantia.		Anagallis Ocyminum
Vinum in communi		Papauer ceratitis
Vinum Selenite.		Lotus satina.
AQVAE inter cu-		ARQVATORVM
tem remedia.		<i>morbi</i> remedia. <i>regii</i>
Vide, Hydropicorum.		Onos siue millepeda
		Asparagus

CVRA TIVVS.

Asparagus	Ruta	Thapsia
Cyclaminos	Thymoxalme	
Sphondylion	Vua passa	
Oenanthe	Vinum melitite.	
Buththalmos	ARTERIAE <i>cania illa golla</i>	
Chrysanthemon	remedia.	
Vinum absynthite.	Irinum	
ARSENICI, siue au	Myrrha	Thus
ripigmenti cu	Caryota, siue caryotis	
ratio.	des	
Diosc. lib. 6. cap. 29.	Ficus	
ARTICVLORVM	Sinapi	
<i>io</i> ura morbis utilia.	Prason, id est porrum	
Amurca	Glycyrrhiza	
Anethinum	Triticum	
Agaricum	Rhaphanus	
Arction	Laserpitium	
Bulbus esculentus	Pentaphyllon	
Centaurium minus	Vua passa	
Cinis uitium	Rhodomeli	
Helleborus niger	Tragacantha.	
Scammonium	ASPIDVM mora	
Mandragoras	sus remedia.	
Meon	Napththa	
Nardus	Narcissus	Cimices lecti
Ouum	Oxymel	Butyrum
Palma elate		Clematis
Pentaphyllon		Daphnoides
Psyllium		Aqua maris
		Diosc. lib. 6. cap. 70.
		Rr

INDEX

ASTRICTO =		Pyra	Pyra sylvestria
ria medicinae.		Mespilus	
Aspalathus		Mespilus alia	
Bryon	Crocus	Cornus	Morus
Oleum omphacinum		Lixivia ex ficu	
Oleum ex oleastro		Ionia siue Cionia	
Myrrha		Adeps	
Vnguentum melinum		Adipum medicinae	
Vnguentum œnanthinum		Faba Aegyptia	
Cortex thuris		Lens	Portulaca
Picea ac pinus		Seris	Porrum
Pityides	Lentiscus	Hedera	Myosotis
Terebinthus		Agaricum	
Fuligo picis		Rhaponticum	
Cypressus	Iuniperus	Gentiana	
Vlmus	Paliurus	Absynthium	
Cyprus	Lilia	Absynthium seriphium	
Cistos	Hypocistis	Mentha	Melilothus
Cydonia	Rosa	Maron	Ruta
Acacia	Salix	Cuminum sativum	
Vitex		Hieracium maius	
Olea sylvestris		Conixæ tertium genus	
Quercus	Castanea	Lysimachium	
Galla	Thus	Clymenos	Anchusa
Palma	Palma elate	Idea radix	
Malicorium	Myrtus	Granum tinctorum	
Myrtidanum	Malus	Chrysocome	
Cotonea	Persica	Aizoon maius	

CVRATIVVS.

Phlomidēs
Lotus syluestris
Ebulus
Vitis syluestris
Nuclei acinorum
Vua ænanthe.
Omphacium
Passum
Vinum omphacite
Vinum nigrum è labrusca
Vinum cydonite
Omphacomeli
Vinum apÿte
Vinum myrtite
Vinum palmeum
Vinum è cedro
Vinum pissite
Vinum absynthite
Vinum tragoriganite
Vinum prasite
Vinum calaminthite
Vinum aromatite
Spuma argenti
Chrysocolia
Cinnabaris
Chalcanthion
Diphryges

Arfenicum
Fax uini
Lapis Phrygius
Lapis Asiū
Lapis scissilis
Terra eretria
Lapis Samius
Fuligo pictoria.
ASSVLAS fixas cor
poribus extra-
hentes.
Cochlea terrestres.
ATTONITIS utilia
Ampeloleuce.
AVRGINEM morbus re-
tollentia. gius colore
auri.
Lycium Agaricum
Libanotis coronaria.
AVRICVLARVM
remedia.
Bulbus esculentus.
AVRIVM medi-
cine.
Cannabis sativa
Araneus
Adipum medicinae
Asphodelus
Absynthium Anisum
R r ij

INDEX

Aparine	Aqua maris	Omphacium	Pix
Acetum		Populus alba	
Acetum scilliticum		Plantago	
Alumen	Aphronitrum	Porrum	Peucedanus
Blattæ	Beta	Prasum	
Crocus	Cistos	Polygonon mas	
Cornix	Cucurbita	Papauer satium	
Cape	Capparis	Psyllium	
Cucumis anguinus		Rhus obsoniorum	
Daphnides		Rosa	Salix
Dracunculus maior		Senecta serpentis	
Ficus		Sesamum	Sinapi
Fel animalium		Spondylium	Stoebe
Faba Aegyptia		Strychnum satium	
Flos æris	Flos salis	Sulphur	
Hedera	Helxine	Thus cum pice	
Irinum unguentum		Terebinthina	
Hyssopus	Laurinum	Vermes	Vrina
Lycium	Lupation	Vinum myrteum, siue	
Malum punicum		myrsinite	
Myrtus	Mel	Vinum cedrites.	
Myosotis	Mentha	B DELLARVM,	
Melilotus	Myrrha	siue hirudinum cio	
Oleum amygdalinum		ratio	
Oleum balanium		Diosc.lib.6.cap.32.	
Oleum hyoscyaminum		BESTIAS su	
Olea sylvestris		gantia.	
Onos	Origanum	Acantha lence, siue spic	

CVRA TIVVS.

na alba.

BESTIARVM ue-
nenatarum remedia.

Balsamum.

BESTIARVM mor-
sus remedia.

Helenium Aegyptium

Sanguis Porrum

Allium Argemone

Eryngium Pulegium

Apium Vinum cedrite

Sal Terra samia.

BILEM adgene-

rantia. *colera*

Iuglans.

BILEM pur-

gantia.

Agriorhaphanus

Androsamos

Anchusa Apios

Brassica canina

Calamintha

Clematis Cici

Cucumis anguinus

Characias Chamælea

Helleborum nigrum

Elaterium Ebulus

Epithymum Empetron

Helenium Hippophaes

Heliotropium

Iris Illyrica

Lychnis sylvestris

Lathyrus Linoxostis

Malus Melanthion

Mentha

Mandragoras

Ocimum Parthenion

Peplos Scammonia

Thlaspi Thapsia

Thymelea

Vitis sativa

Unguentum susinum

id est, lilij.

BLATTAS in se

contrahentia. *Larme*

Phlomidès.

BOVM scabiem

emendantia.

Cedria.

BRONCHOCE-

las discutientia. *tumor & gutture*

Vide, gutturis remedia.

BVPRESTIS ue- *aiat vene-*

neni remedia. *natu*

Lac schiston

Diosc. lib. 6. cap. 3.

R r iij

INDEX

CACHEXIAE, id Bdellium Daphnides
 cest maciei remedia. Paliurus Pruna
 Aqua maris. Fimum Lapathon

CACOETHE Sisybrium Ononis
 remedia. Cuminum sylvestre

Vnguentum rosaceum Artemisia
 Crocinum Thus Hippomarathon

Glandes Ficus Asplenon Anthemis
 Cicer Plantago Parthenion Peonia

Dracunculus maior Lithosperma
 Dracunculus minor Althæa Tribulum

Hedera Viscum Saxifragum
 Asclepias Psyllium Gramen Tragion

Vrtica Petasites Acanthus
 Cadmia Diphryges Cotyledon prima

Flos salis. Vitis sativa
CALCIS curatio. Myrtus sylvestris

Diosco. lib. 6. cap. 29. Oxalme
mal Tyda. **CALCVLI** remedia. Lapis Iudaicus Ochra

Cyperus Lapidès spongiarum.
 Cardamomum **CALEFACTO**

Oleum amygdalinum rie medicine.
 Cerasia Adipum medicine

Amygdalus amara Medulle animalium
 Osifragus Fel Cera

Vrina Sium Propolis Triticum
 Struthion Rhaphanus

Centaurium maius Rhaphanus agria

CVRATIVVS.

Sisymbrium	Eleomeli	Laurinum
Sisymbrium aquaticum	Sampsuchinum	
Sinapi	Nasturtium	Ocyminum
Thlaspi	Erysimon	Anethinum
Piper	Zingiber	Susinum
Dracunculus maior	Cyprinum, siue ligustri-	
Dracunculus minor	num	
Asphodelus	Irinum	Gleucinum
Bulbus esculentus	Amaracinum	
Agaricum	Metopium	
Gentiana	Stacte	Nardinum
Anonis, siue Ononis	Malabathrinum	
Eryngion	Myrrha	
Absynthium	Myrrha Bæotica	
Absynthium seriphium	Styrac	Bdellium
Hyssopum	Thus	Terebinthus
Origanum	Resina	Palimpissa
Tragoriganum	Iuniperus	
Pulegium	Sabina	Cedria
Mentha	Cedrides	Laurus
Serpyllum	Daphnides	Cyprus
Sampsuchum	Cistos alia	Vitex
Maron	Amygdale amara	
Aspalathus	Ficus	
Crocomagma	Lixivia ex ficu	
Helenium	Cisseris	
Oleum vulgare	Cochleæ terrestres	
Oleum sicyonium	Fiber	
Strigmenta gymnasto-	Buprestis pityocampa	
rum & palæstrarum.	Rr iij	

INDEX

Salamandra		Aerugo aurificum	
Oesyphus		Chrysocolia	
Panaces heraction, siue		Chalcanthon	
herculeum		Alumen	Sulphur
Ligusticum		Flos salis	Pyrites
Seseli Massiliense		Lapis hematites	
Sison	Anisum	CALEFACTO	
Caros	Anethum	rum remedia.	
Cuminum sativum		Lana succida. <i>no lota.</i>	
Ammi	Oreoselinon	CALIGINIS	
Smyrnion		oculorum re-	
Hippomarathrum		media.	
Daucus	Libanotis	Fel animalium	
Laserpitium		Lactuca sylvestris	
Galbanum		Ocymum	Cape
Ammoniacum	Stachys	Dracunculus maior	
Scordion	Artemisia	Sinapi	Nasturtium
Anthemis	Chrysocome	Erysimon	Piper
Portulaca agrestis		Zinziber	
Lotus sylvestris		Dracunculus minor	
Vinum picatum		Anagallis	
Vinum in communi		Chelidonium maius	
Aqua maris		Sagapenon	
Vinum è cedro, arbori-		Chamaedrys	
busq; alijs		Chamaesyce	
Vinum è cypresso		Flos eris	
Vinum cedrite		Pumex	Fex vini
Vinum chamaedryite		Lapis thyites	

CURATIVVS.

CALLORVM

remedia.

Triticum

Laserpitium

Chalcitis lapis

CANCRESCENT

tibus ulceribus

medetur.

Vrtica.

CANES occidentia.

Asparagus

Apocynon.

CANIS rabie sanat.

Alyssum.

CANIS rabiosi mor-

sus remedia.

Lycium

Cancr

Cinis uitium

Garum

Omotarichos

Smaris

Iecur ardens canis

Triticum

Sanguis

Mel

Grosi

Panaces heracleon

Cape

Laserpitium

Vrina

Aster atticus

Melissophyllon

Vrtica

Cynoglosson

Fœniculum

Ballote

Oxalme

Aphronitrum, siue spu-
ma nitri.

Diosc. lib. 6. cap. 37.

Herm. Coroll. cap. 212.

CANIS non rabidi

morsus remedia.

Amygdalæ amaræ

Iuglans

Ficus

Mituli

Gobius

Cucumis

Bulbus esculentus

Mentha

Ebulus.

CANIS impetum

cohibentia.

Iecur & dens canis.

CANES necantia.

Chamæleon albus.

CANVM scabiem

emendantia.

Oleum lentiscinum

Cedria.

CANTHARIDES

fugantia.

Vnguentum melinum.

CANTHARIDVM

sp. ver.
mi tem-
mi.

INDEX

ueneni remedia.
 Lac schiston
 Adipum medicine
 Diosc. lib. 6. cap. 1.
CAPILLORVM
 defluuium repri-
 mentia.
 Oleum ex oleastro
 Myrrha
 Cistos alia, siue ladanū
 Myrtus
 Brassica satina
 Nasturtium
 Aloe Adiantum.
CAPILLVM
 denigrantia.
 Cupressus
 Fagus Ilex
 Palma elate
 Myrtus Hedera
 Elelisphacos Rubus
 Vinum myrtite.
CAPILLVM
 rufantia.
 Cyprus Lycium
 Lotus Fex uini.
CAPILLVM flauū
 reddentia.
 Aqua maris.
CAPILLVM pur-
 gantia.
 Fœnogrecum
 Linum.
CAPILLOS
 tingentia.
 Acacia
 Myrtus Morus
 Stratiotes terrestres
 Ebulus
 Terra ampelites.
CAPILLOS
 nutrientia.
 Iuglans
CAPITIS ulcerum
 remedia.
 Balsamum
 Oleum ex oleastro
 Oleum amygdalinum
 Vnguentum rosaceum
 Telinum
 Narcissinum
 Myrrha Thua
 Vrina Fœnogrecum
 Cicer Linum
 Malua Allium
 Cyclaminos

CVRATIVVS.

Bulbus esculentus		Melanthion	
Melilotus	Lilium	Conixa maior	
Bettonica, siue Britan-	Anagyris	Bettonica	
nic.	Radix hederae		
Xyris	Rubus	Oxyshoenos	
Rubus Ideus	Oxalme	Psyllium	
Vinum myrsinite	Sal.	Papauer rhoeas, siue erra-	
CAPITIS doloris		ticum	
remedia.		Strychnon, siue solanum	
Iris Illyrica	Asarum	fatium	
Meon siue meu		Aixoon maius	
Oleum oleastri		Hippoglosson	
Oleum amygdalinum		Chamedaphne	
Vnguentum rosaceum		Myrtus sylvestris	
Narcissinum	Cyprus	Elaterium	
Rose	Vitex	Scammonium	
Amygdale amara		Vitis sativa	
Torpedo		Vinum	
Lac humanum		Vua cenanthe	
Lana succida		Aqua maris	
Curmi	Sisymbrium	Acetum scillite	
Sesamum	Hedera	Lapis ophites.	
Portulaca	Aloe	CAPITIS dolorem	
Mentha	Serpyllum	facientia.	
Baccharis	Ruta	Styrax	Oliuæ
Anisum		Glandes	Palma
Sphondylium		Arbutus	
Pencedanum		Iuglans	

INDEX

Eruum	Lascepitium
Absynthium	Nasturtium
Ferula	Olea sylvestris
Meu, siue meon	Pix Plantago
Peucedanus	Panaces heracleon
Mandragora	Sabina Vna passa.
Vinum gypsatum	CARDIAC O=
Vinum phoenicite	rum reme= <i>mal di</i>
Vinum rhetinite	dia. <i>uor.</i>
Vinum mesagite.	Buprestis
CAPVT purgantia.	Seris Rubus.
Anemone	CARNEM tenerio=
Brassica sativa	rem reddentia.
Beta	Cape Vrtica siue acalyphe.
Chelidonium minus	CARNEM coalescere
Chalcanthum	<i>Crescere</i> facientia.
Cyclaminos	Lixiua ficus
Origanum.	Symphyton.
CARBUNCULO=	CARNES superuas
rum medicine.	cuas compefcentia.
Brassica sativa	Characias Cadmia
Cupressus	Aes ustum
Cinnamomum	Flos aris
Cyprus	Lascepitium
Coriandrum Characias	Lana usta
Eruum	Fimum Lapis Afius
Iuglans	Spuma argenti
Lupinum satium	Smaris

CURATIVVS.

[CARCINOMA= Rosa Sal
tum remedia. *cacro* Dioscor. lib. 6. cap. 55.
& 69.

Fuligo thuris

Buprestis

Cicer

CERVSSAE

Erysimon

curatio.

Dracunculus maior

Diosc. lib. 6 cap. 22.

Dracunculus minor

CERIONVM ulce=
rum remedia.

Aristolochia tertia

Vrtica

Galiopsis.

Grossi

Pepo

CASEVS ne cariem
carls sentiat.

Quere, Fauos rum=
pentia.

Dracunculus minor.

CERVICIS rigoris
medicinae.

CAVA implentia.

Cadmia

Pompholyx

Vide, Opisthotonicorum
remedia.

Cerussa

Lapis schistos

CHIRONIORVM *ulcus 2*
ulcerum remedia. *pedibus*
et crinibus

Lapis morochthus

Plantago

Terra samia

Ampelolence.

Fuligo thuris

Aristolochia tertia.

CHOLERICIS

CAEPAE acrimo=
spiza niam retundit.

utilia.

Ruta.

Cotonea mala.

Calamintha

CAERASTAE

Ferrum

Mentha

scorpi ictus remedia.

Polygonon mas.

Cedria, siue cedrinus li=
quor

CICATRICVM

remedia.

Harundo

Anemone

INDEX

Aloe	Adeps	Herm. Cor. cap. 366.
Bulbus esculentus		& 806.
Balanus myrepfica		CLAVORVM
Cistos	Centaurium	remedia.
Chamaesyce	Smaris	Fimum
Calx uina	Lasertitium.	
Corallium		COELIACORVM
Aes ustum		remedia.
Aeris flos	Myrrha	Hypocistis
Aerugo aurificum	Lycium	
Fuligo butyri	Olea syluestris	
Faba	Fax uini	Quercus aut robur
Oleum myrtinum	Galla	Thus
Oleum Balaninum	Myrtus	Cotonea
Oleum cicinum	Morus	
Olea Aethiopica	Lixima ex ficu	
Peucedanum	Ceruinum cornu	
Plumbum elotum	Faba Aegyptia	
Pumex	Lapathon	
Scoria argenti.	Plantago	Coronopus
CICVTAE con-	Rhaponticum	
traria.	Acantha leuce, siue spi-	
Passum & uinum	na alba	
Vinum in communi	Ferula	
Acorum	Lasertitium	
Herm. Cor. cap. 17.	Tragos herba	
CIMICES fugan-	Papauer satium	
tia & negantia.	Vinacei	

C V R A T I V V S.

Nuclei uinaceorum	Myrica	Paliurus
Eleomeli	Cyprus	
Vinum phœnicite	Olea syluestris	
Vinum rhetinite	Glandes	Morus
Ferrum	Grossi	Ouum
Lapis morochthus.	Triticum	Hordeum
COLI remedia <i>qus tor</i>	Fœnogræcum	
Colocynthis <i>meti.</i>	Linum	Cicer
Fimum	Galerita	Agriorhaphanus
Mel	Petroselinum	Plantago
Ruta	Sesamum	Nasturtium
Talus suis.	Bulbus esculentus	
COLOREM com=	Argemone altera	
mendantia.	Rhaponticum	
Acetum scillite	Acantha leuce	
Buphthalmos	Thymus	
Cerussa	Coriandrum	
Cyminum satium	Smyrniun	
Laserpitium	Libanotis	Viscum
Mastichinum	Parthenion	
Vnguentum rosaceum	Cannabis syluatica	
Vinum	Anagyris syluatica	
Vinum aromatite.	Helxine	
COLLECTIO=	Pentaphyllon	
num remedia. <i>humo</i>	Peristerion supinus	
Amomum <i>us phernam</i>	Papauer satium	
Vnguentum telinum	Stratiotes aquaticus	
Zopissa	Naphtha	Cytisus

INDEX

Ampelos leuce
Vinum in communi
Vinum adynamon
Vinum cydonite.

mal caducus COMITIALIS morbi remedia.

Cardamomum
Balsamum Naphtha
Populus nigra Ficus
Iuncus odoratus
Lepus terrestris
Mustela
Vnguis asini
Lichen equi

Iecur hirci Hirundines

Serum Lac humanum

Coagulum Fel

Sanguis Fimum

Plantago

Eryngion Ruta

Seseli Massiliense

Libanotis

Spondylion

Peucedanum

Laserpitium

Galbanum

Sagapenum

Ammoniacum

Trifolium

Conixa Anthyllis

Symphyton Cestron

Pentaphyllon

Papauer aphrode'es

Viola purpurea

Helleborum nigrum

Hippophaston

Ampelos leuce

Ampelos melena

Oxymel

Acetum scillite

Lapis selenites

Lapis aetites

Cotes.

CONCEPTIONI

contraria.

Epimedium

Heliotropium maius

Aerugo ferri

Alumen

Lapis ostracites

Herm. Coroll. cap. 267.

CONCEPTIO

nem facilitantia.

Coagulum

Lolium

Staphylinos agrios

Lapis

CURATIVVS.

Lapis samius. alsamum Helenium

CONCOCTIO = Calamus odoratus
ni utilia, *Sigestio* Sampsuchinum

Anethum Althæa Metopium

Acetum scillite Bdellium Iuniperus

Balsamum Crocus Cedrides Halimos

Crocomagma Lixivia à ficu Fimum

Caros Cestron Dracunculus maior

Calx uiua Eruca Dracunculus minor

Ligusticum Pulegium Asphodelus

Papauer satium Capparis Argemone

Resina Styrax Rhaponticum

Seseli Masiliense Gentiana

Sulphur Vinum Aristolochia tertia

Vinum resinatum Centaurium maius

Vinum absynthite Acantha leuce

Vinum tragoriganite. Abrotonum

CONSTRICTO = Origanum Pulegium

ria medicina. Calamintha

Vide, Adstrictoria me- Serpyllum

dicina. Baccharis

CONVULSIO = Panaces heracleon

nis remedia. *spasmo* Libanotis

Iris Illyrica Peucedanum

Acorus Laserpitium

Cardamomum Sagapenor

Asarum Costus Galbanum

Iuncus odoratus Clinopodium

ss

INDEX

Chamedrys	Vinum in communi
Alisma	Cestron Dioscor. lib. 6. cap. 9.
Xyris	Symphytum
Psyllium	Phlomidis
Ampelo leuce	functa à corruptione dus tuetur.
Vinum scilliticum	Cedria.
Vinum chamedryte	CORPVS MA =
Vinum tragoriganite	crescentia.
Vinum daucite	Canchamum.
Vinum panacite.	COXA EDOLLO =
<i>spes mor</i> GONDYLOMA =	ris remedia.
<i>in circa colu</i> tum remedia.	Strigmēta à palestris.
<i>na am</i> Strigmenta à balneis	COXENDICVM
Myrteum	doloris remedia. <i>usta</i>
Cotonea	Ouum
Aloe	Anethum
Libanotis	Agaricus
Ballote	Stachys
Phalangion	Aster Atticus
Penthaphyllon	Acetum scilliticum
Vitis sativa	Ferrum
Plumbum elotum	Centaurium minus
Sandaracha.	Calamintha
CORDIS TRE =	Coris
moris medicina.	Cestron
Nardi spica.	Cucumis sylvestris
CORIANthro	Erysimon
<i>spes herbe</i> contraria.	Euphorbium
	Fimum
	Garus
	Helenium
	Ammoniacum

CVRATIVVS.

Hypericon	Hiberis	gantia. <i>zenzale</i>
Heliochrysos	Cupressus	
Iris Illyrica	Lolium	Coniza Ebulus
Lupinum satium	Absynthium	
Laserpitium	Hiberis	
Naphtha	Onos	Plumbum ustum.
Populus alba		CVTEM albicantia.
Panaces heracleon		Rapum syluestre.
Peucedanum		CVTEM erugantia. <i>listedore</i>
Pentaphyllon	Ruta	Oleum amygdalinum
Scammonium		Styrax.
Vinum a sarite Xyris.		CVTEM lenientia.
CRASSITVDI =		Amygdala amara
nem extenuantia.		Oleum sicyonium
Porrum		Vnguentum telinum
Staphis agria.		Succus peponis
CROCEVM CO =		Terra Chia.
lorem facit.		CVTIS VITIA
Rhaponticum.		tollentia.
CRVDITATIS		Adarce Ampelos leuce
<i>remedia / culi</i>		Amygdala amara
Balsamum		Cochleæ terrestres
Strigmenta à balneis		Costus
Gentiana		Chamaeleon niger
Vinum scilliticum.		Iris Illyrica Lac
CRVSTAS generat		Ficus Linum
Lana usta.		Lupinus
CVLICES FV =		Lotus syluestris
		S f ij

INDEX

Mel Ponticum	Characias
Oleum raphaninum	Colocynthis
Picea	Ephemerum
Sanguis leporis	Helleborus niger
Spuma argenti.	Ficus Galba
CUTIS PRURI-	Galbanum Hedera
tus remedia.	Hyoscyamus
Lac	Hyssopus
D ENTIVM	Laserpitium
doloris remedia.	Leucacantha
Amurca	Myrica Morus
Halicacabus	Melanthion
Asparagus	Melissophyllon
Allium Anagallis	Naphtha
Aristolochia	Olea Aethiopica
Acantha leuce	Picea Plantago
Absynthium	Panaces heracleon
Arction Acetum	Pyrethrum
Acetum scillite	Peucedanum
Alumen Batrachion	Pentaphyllon
Cedria Cytinus	Rhus Rana
Cochleæ terrestres	Sepia
Capparis	Senecta serpentis
Chelidonium maius	Strychnon hypnoticon,
Chamaeleon niger	sive somniferum
Clematis daphnoides	Unguentum rosaceum
Cucumis anguinus, si-	Vermes terreni.
ue siluestris	DENTIVM STV

CURATIVVS.

poris remedia.	DEPILES faciētia.
Portulaca	Scolopendria
DENTITIONI	Characias.
infantium utilia.	DESQVAMATIS
Leporis cerebrum	utilia.
Butyrum cum melle.	Strigmenta gymnastorū
DENTIFRICIA.	Lana succida.
Purpura Buccinum	DESTILLATIO
Ceruinum cornu	nes coercentia.
Halcyonium	Irinum Styrax
Corallium.	Naphtha
DENTIBVS STV	Et in uerbo, Pituite de-
porem adferentia.	stillationis remedia.
Cadmia.	DILACRYMA=
DENTES firmātia.	tiones emendantia.
Lentiscus	Picea Pinus.
Oliuæ colymbades	DISCVSSORIAE
Myrrha	medicinæ.
Oleum omphacinum.	Androsæmon
DENTES ALBI=	Althæa Viscum
care facit.	Galbanum
Halcyonium.	Ammoniacum
DENTES VITIA	Lapis Gagates.
tos extrahentia.	DOLORVM inue=
Amurca	teratorum remedia.
Oleum oleastri.	Sinapi
DENTES mouētia.	Lana succida
Oleum oleastri.	Sf iij

INDEX

Ligusticum.	Capparis	
DOLORES lateris.	Erysimon	Aegilops
Vide, laterum dolores.	Ficus	Finium
DOLOREM ne sen-	Glans	Galiopsis
tiant qui urendi se =	Hydropiper	
candide sunt.	Ammoniacum	
Mandragoras	Lens	Linum
Lapis memphites.	Lapis alabastrites	
DORYCNI curatio	Megaliun	
Diosc. lib. 6. cap. 6.	Melanthion	
DRACONIS MA-	Mandragoras	
rini morsus.	Porrum	
Mullus piscis	Panaces heracleon	
Vrina	Ocymum	Pentaphyllon
Absynthium	Paronychia	
Plumbum elotum &	Pyrites	Styrax
crematum	Sanguis	Smyrnion
Sulphur	Terra cimolia	
Diosc. lib. 6. cap. 61.	Vinacei	
DRYINI MOR-	DYSENTERI-	
sus curatio.	corum remedia.	
Diosc. lib. 6. cap. 65.	Adipum medicine	
DVRITIEM E =	Asparagus Argemone	
mollientia.	Agaricum	
Amaracinū vnguentū	Althea	Alcea
Bdellium	Allisma	
Buphthalmos	Aizoon maius	
Cyprinum.	Butyrum	Cupressus

CURATIVVS.

Cotonea	Cornu	Pentaphyllum
Ceruinum cornu		Papauer ceratite, siue
Coagulum	Cera	corniculare
Glematis daphnoides		Quercus
Elatine		Rubrica, siue terra lenia
Eupatorium		Silurus Sanguis
Fænogracum		Sium Scordium
Faba Aegyptia		Symphyton
Ferrum	Galla	Stœbe
Omphacium		Sideritis achillea
Hypocistis		Salsugo Tragion
Hedera	Hippuris	Vitis sativa, siue vinifera
Lentiscus	Lycium	Vinacei
Lotus		Vinum cydonite
Lixivia ex fico		Et in uerbo, Intestinorum remedia.
Lac schiston		
Linum	Lapathum	E BRIETATI
Lysimachia		utilia.
Myrrha	Macer	Amygdalus amara
Malum punicum		Brassica sativa
Melissophyllum		Absynthium.
Naphtha		E LEPHANTIAE
Nymphaea		remedia.
Nuclei acinorum		Cedria
Oryza	Omphacium	Erinaceus terrestris
Oxalme	Portulaca	Serum
Plantago	Phyllitis	Fel animalium
Polemonium		Zythum Plantago

s f iij

INDEX

Calamintha.	Refina	
ELEPHANTIAS	Syrax	Viscum.
gignentia.	ENTEROCELAE	
Vinum ficyte.	remedia.	
EMOLLIENTES	Hippuris, siue equisetū.	
medicine.	EPHELIDIS	
Adipum medicine	utilia.	
Bdellium	Balanus myrepsica	
Cinnamomum	Cici.	
Cypros	EPINYCTIDIS	
Cistos	Cera	morbi remedia.
Cerussa	Chalcanthum	Olea sylvestris
Calx uiua	Oesypus	Myrtus
Foenogrecum		Amygdale amara
Cleucinum		Grossi
Ammoniacum		Brassica sativa
Irinum	Laurus	Plantago
Lana succida		Cucumis
Linum		Porum
Lapis Gagates		Absynthium
Metopium		Coriandrum cum melle
Myrrha Boeotica		passaque uiua
Medulle animalium		Viscum
Naphtha		Heliotropium maius
Palimpissa		Vua passa
Panaces heracleon		EPIPHORAE
Psyllion		remedia.
Plumbum elotum		Asarum
		Malobathrum
		Cotonea
		Crimnon
		Coriandrum
		Lilium

CURATIVVS.

Ambrosia Vna passa Ochra Pumex

Terra samia Pyrites Scordion

ERVVIS pinorum Spuma argenti Sal.

conuenit EXTENVATO =

Vnguentum melium ria medicinae.

Dios. lib. 6. cap. 2. Artemisia

ERVPTIONVM Anthemis

remedia. Iris Illyrica

Serum Hyssopus

Lupinum satium Lapis hematites

Beta Portulaca Pulegium

Penthaphyllon Panaces heracleon.

Balanus myrepica EXTRACTO =

Vinum myrsinite ria medicinae.

Alumen. Galbanum

EXCREATIO = Viscum Thasia

nis crasse pectoris Scoria argenti.

remedia. FACIES ne à sole

Pix liquida aduratur.

Dracunculus minor Ouum

Tordylon. FACIEI vitia au =

EXCRESCEN = ferentia.

tia deprimentia. Ampelos agria

Alumen Cerussa Halcyonium

Cinis vitis Adarces

Diphryges Brassica satina

Erinaceus marinus Bulbus esculentus

Lapis Asius Balanus myrepica

INDEX

Cinnamomum	Peponis radice
Cochleæ terrestres	Grossi.
Cyclaminos	FAVCIVM morbi
Eruum	Ficus remedia.
Hedera	Iris Illyrica Acetum
Lepus	Lilium Acetum scillite
Lotus sylvestris	Cacalia Aethiopis
Mastichinum	Ficus Lac
Mel sardoum	Laserpitium Mel
Oleum amygdalinum	Papauer satium
Oleum raphaninum	Styrax.
Pepo	Polygonaton FAVCES asperas
Spuma argenti	facientia.
Sisymbrium aquaticum	Characias
Thapsia.	Cimolia terra.
FACIEI rugas aufe-	FEBRIBVS con-
rentia.	traria.
Cacalia.	Mala punica.
FASTIDIVM 'ge-	FEBRIFUGIA.
nerantia.	Centaurium minus
Vinum catorchite	Coniza.
Diosc.lib.6.in præfat.	FEBRIVM remedia.
FATIGATIO	Agaricum
num remedia.	Aristolochia tertia
Adeps.	Anthemis Anchusa
FAVOS rumpentia.	Aphronitrum
Eruum	Balsamum Buglossum
Vua passa	Coctus Cucurbita

C V R A T I V V S.

Clymenon		Verbenaca supina	
Foeniculus	Hypericon	Trifolium	Ruta.
Hyoscyamus		FELLE	suffusis
Heliotropium maius			utilia.
Lac humanum		Adiantum	
Lagopus		Vinum a sarite.	
Myrrha Ouum		FELLEI	humoris
Oleum siccyonium			remedia.
Portulaca	Piper	Absynthium	
Panaces heracleon		Centaurium minus.	
Polygonon mas		FERITATEM	ani
Pentaphyllon			malium mitigantia.
Peristerion supinus		Oenagra.	
Rhaponticum		FERRVMINA	N=
Ruta	Smyrnion		diuim habentia.
Sapapenon		Spuma argenti	
Saxifraga		Rubrica sinopis	
Trifolium	Vua	Spongia	
Vinum melitite		Lapis morochthus.	
Vinum rhoite		FILIVM	masculum
Vinum hyssopite.			generantia.
FEBRIS quartane		Phyllon	Orchis
remedia.		Crataegonos.	
Arancus	Buglosson	FISTVLARVM	
Cimices lecti	Dipsacu		remedia.
Hypericon		Adeps	Arisaron
Heliotropion maius		Cinnamomum	
Pentaphyllon		Characias	

I N D E X

<p>Calcites lapis Dracunculus minor Dipsacus Helleborum nigrum Orchis Serapias Omphacinum Papyrus Plantago Pentaphyllon Stratiotes terrestris. FLATVS discus tientia. Cinnamomum Ocymum Vinum stichadite. FLATVM adges nerantia. Malus Zythum Phaseolus. FLVXIONVM remedia. Fuligo butyri Erysimon Lichen in petris Ocymum Portulaca Pepo Squama eris Papauer satium Acantha Arabica Chium vinum</p>	<p>Acetum Ebenus Licium Lixiua ex ficu Vinum rhoite Vinum terebinthinum Vinum pissite Vinum melampsythiū. FOETVS necantia. Vide, Partus necantia. FOEMINAS ste rilefcentia. Lepus terrestris Hedera FORMICAE mor bi remedia. Cicer Characias Chamæsyce Batrachion Dipsacum Heliotropium maius Lacerta Ruta Thus Vitis sativa. FRACTVRAE remedia. Fuligo pictoria. FVNGORVM ve nenatorum re= media. Verbenaca Fimum Mel</p>
---	--

C V R A T I V V S.

Rhaphanus		Malua	
Absynthium		Oleum oleastri	
Melissophyllon		Oleum amygdalinum	
Fungi		Oleum myrtinum	
Vinum in communi		Oxalme	
Acetum		Olea	Salix
Chalcantem	Sal	Vnguentum melinum	
Pyrorum ligni cinis		Vnguentum telinum	
Aphronitrum		Vrina	
Cinis uitium		Vinum myrsinite	
Lapis Afus		Allium	Beta.
Diosc. lib. 6. cap. 23.		G A N G R A E N A E	
FVRVNCVLO=		morbi remedia.	
rum remedia.		Ampelos leuce	
Ficus		Brassica satina	
Grossi	Triticum	Bulbus esculentus	
Rhaphanus		Cinnamomum	
Asphodelus		Characias	Galiopsis
Galbanum		Iuglans	
Pygnoconomum	Sal	Lixivia e fici	
Aphronitrum.		Lilium	Lens
FVRFVRES tollen		Lupinum satium	
tia.	Allium	Lasertium	
Adiantum	Alumen	Rhus	Rhaphanus
Foenogrecum		Vrtica	Vua passa.
Fel animalium		G E N I T A L I V M	
Grossi	Linum	morbi remedia.	
Lilium	Myrtus	Asparagus	Amurca

INDEX

Aloe	Aster atticus	nem deprimentia.
Cyprinum	Cotyledon	Clymenon
Fænegræcum		Heliotropium maius
Flos salis Linum.		Mentha Thelypteris
Malum punicum		Xyphion Asplenon.
Polygonon		GENITVRAM ex-
Sampsuchinum		tinguentia.
Vinum terrebinthinum.		Cannabis sativa semen
GENITALIVM		Anethum.
wirus extin-		GENITVRAM
guentia.		Augentia.
Alumen.		Semen coriandri
GENARVM morbi		Coriandrum.
remedia.		GENITALIVM
Aloe		torporem in-
Aerugo aurificum		ducentia.
Aerugo ferri		Cicuta.
Ammoniacum		GINGIVARVM
Lapis schistos		morbi remedia.
Mituli	Naphtha	Aristolochia tertia
Olea sylvestris.		Aloe Acetum
GENITVRAE		Acetum scillite.
profluuij in som-		Alumen Butyrum
no remedia.		Canchamum Cytinus
Lactuca sylvestris		Chalcitis lapis
Nymphaea		Aerugo aurificum
Hermol. Cor. cap. 932.		Aerugo ferri
GENERATIO=		Galla Lycium

CVRATIVVS.

Lepus terrestris

G V T T V R I S

Lac schiston

remedia.

Lapis alabastrites

Bdellium

Myrrha

Mastiche

Ficus

Aster Atticus

Oleum omphacinum

Vinum halosanthinum

Pruna

Plantago

G Y P S I curatio.

Pumex

Rosa

Lixiua ex ficu

Rubus

Staphis agria

Dios.lib.6.cap.24.

Sal

Tribulus

H A E M O R =

Vua cenanthe

rhoidarũ remedia.

Vinum rhetinite.

Amaracinum

G L A B R O S aut dez

Allium

Anonis

piles facientia.

Aloe Cape

Scolopendra

Irinum

Libanotis

Characias.

Lapis Arabicus

G L A D I O R V M

Ouum

Palma

aciem perstrin=

Plumbum elotum

gentia.

Rhus

Rubus.

Malum sylvestre.

H A E M O R R H O I =

G L A N D I S mem=

darum curatio.

bri remedia.

Diosc.lib.6.cap.69.

Mel.

H A L I T V S oris

G R A V E D I N I S

remedia.

remedia.

Agallochum

Styrax.

Anisum

Bromos

G V R G V L I O N I

Citrum Malobathrum

utilia.

Myrrha Mastiche

Silurus.

Vinum selenite.

INDEX

HASTVLAS in= Diofc. lib. 6 cap. 32.
fixas corpori ex= HOMINEM
trahentia. necantia.

Oxyacantha. Iuniperi ramenta
HEPATICORVM Smilax seu taxus.

remedia. HOMINIS mor-
Vide, Iecinoris morbo= sus remedia.

rum remedia. Iuglans.
HERBAE quæ pe= HORRORES excu-
rimunt. tientia.

Diofc. lib. 6. in præfat. Vide, Rigorem excu-
HERNIAE medicinæ tientia.

Cinnamomum HVL CERANTES
Cupressus Cytinus medicina.

Pentaphyllon Buprestis Salamandra
Psyllium Xyphion. Batrachion Ruta

HERPETIS con- Lonchitis Hedyfaron
traria. Clematis

Strychnon satium Portulaca agrestis
Acetum. Ampeloleuce.

HIRVNDINVM HVL CERVVM
uisus restaurantia. remedia.

Chelidonium maius. Amygdala amara
HIRVDINES Anemone Amylum

pellentia. Anagallis Aristolochia
Acetum. Aloe Anthemis

HIRVDINIS Althea Anchusa
curatio. Astragalus Aconiton

Arction

CURATIVVS.

Arction	Acetum	Lentiscus	Lycium
Arsenicum	Alumen	Lana combusta	
Brassica sativa	Beta	Lolium	Lens
Bulbus esculentus		Lupinus Libanotis	
Ballote		Laferpitium	
Caries lignorum		Lilium	Myrtus
Cistos	Chelidonium	Mel	Mandragoras
Centaurium		Nasturtium	
Chamaleon niger		Narcissus	
Coriandrum		Olea sylvestris	
Chamedrys		Oleum amygdalinum	
Chamepitys		Orobus	Orchis
Chamelca		Oenagra	Omphacium
Cadmia	Cinis vitis	Plantago	Pix
Corallium		Palma	
Dracunculus		Purpura combusta	
Eleliphacon		Pepo	Panaces
Eupatorium		Peucedanum	Prasion
Ebulus	Aes ustum	Pentaphyllon	
Ficus	Fimum	Peristercon supinus	
Aerugo aurificum		Papauer ceratitis, id est,	
Fel	Glans	corniculare.	
Grossi	Hedera	Psyllium	
Goed, id est, coriandrum		Plumbum elotum	
Gentiana		Pumex	
Iris Illyrica	Ifatis	Rhamnus	Ruta
Indicus lapis		Stratiotes terrestris	
Lixivia cum cinere ficus		Scordion	

T t

INDEX

Sandaracha	Sal	Cestron	Cotyledon
Spongia	Thus	Cucumis anguinus	
Viscum	Thelypteris	Cici	
Testæ fornacum		Helleborum nigrum	
Vrtica.		Ebulus	Ficus
HVMORVM malo-		Erinaceus terrestris	
rum medicina.		Hippophaes	
Metopium unguentum		Hippophaeston	
Nardinum		Hyssopus	Laserpitiis
Amygdalæ dulces		Lathyrus	Origanum
Mel		Plantago	Pancratium
HYDROPICORUM		Polium	Rhaphanus
remedia.		Ruta	Silla
Afarum	Amurca	Sampsuchus	
Halicacabus	Allium	Staphylinus	
Absynthium	Anisum	Smyrnion	
Androsaces	Alisma	Strychnon hypnoticon,	
Ampelos agria		sive solanum somnifi-	
Aqua maris		cum	Sal
Acetum	Aphronitrum	Trifolium	Tithymalus
Halcyonium		Vitex	Vrina
Buprestis	Cyperus	Vinum scillite	
Cinnamomum		Vinum rhetinite	
Calamus odoratus		Vinum cedrite	
Cochleæ terrestres		Vinum asarite	
Cicer		Vinum panacite.	
Chameleon albus		HYOSCYAMI	
Chamedrys		curatio.	

C V R A T I V V S.

Diosc. lib. 6. cap. 15.

IECINORIS res
media. Acorus

Nardi spica

Nardum Gallicum

Amomum

Iuncus odoratus

Agallochum

Picea

Pinus

Daphnoides

Palma elate

Amygdale amara

Lac humanum

Scandyx Struthium

Anagallis Agaricum

Rhaponticum

Gentiana

Glycyrrhiza

Eryngium

Abfynthium

Serpyllum Sphondylium

Ammoniacum

Anthemis

Chamæpitys

Vettonica Eupatorium

Hyoscyamus

Pentaphyllum

Chrysocome

Papauer ceratitis, siue
cornutum

Epipactis Isopyrone

Vinum cydonite

Vinum pissite

Vinum absynthite

Vinum nardite

Vinum asarite

Vinum ex syluestri asaro

Vinum chamelates

Rubrica sinopis.

I G N I S sacri res
media.

Asarum Acacia

Acinos herba

Anchusa Lycopsis

Aizoon maius

Brassica sativa

Acetum Beta

Baccharis Bechion

Crocus Cupressus

Coriandrum Cicuta

Cotyledon Cici

Chalcitis lapis

Aerugo ferri

Harundo Helxine

Isatis Lens

T t ij

INDEX

Lilium	Lens palustris	Myrrha	Nasturtiū
Lapis smyris		Sinapi	Propolis.
Myrtus	Malua	INCUSsis	utilia.
Mandragoras		Phlomidēs.	
Portulaca	Plantago	INFANTES	mors
Parthenion			tuos utero eijcientia.
Polygonon mas		Dictamnus.	
Pentaphyllon		INFANTIBVS	
Peristereon rectus			utilia.
Papauer satium		Athara	Aster Atticus
Psyllium Rhamnus		Strychnum satium	
Rosa	Ruta	Smilax aspera.	
Rubus	Idea	INFANTIVM	pue
Salix	sanguis		pille ut glauca,
Seris			non nigra red-
Strychnon, siue solanum			dantur.
satium		Auellana.	
Stratiotes aquaticus		INFLATIONES	
Vrina			facientia.
ILEI morbi remedia.	Allium		
Oleum vulgare	Capparis	Glans	
Strychnos halicacabus.	Laserpitium	Porrum	
IMPETIGINIS	Bulbus esculentus.		
morbi remedia.	INFLATIONVM		
Amygdale amara		remedia.	
Lapathon	Aspalathus		
Lichen in petris	Amygdale amara		
Lolium	Thus	Absynthium	

C V R A T I V V S.

Anisum	Anethum	Argemone
Anthemis	Althea	Anagallis
Costus	Cicer	Artemisia
Cuminum	Eryngion	Aizoon maius
Epithymum		Acetum Butyrum
Helenium	Hyssopum	Brassica sylvestris
Hieracium maius		Bechion
Iuncus odoratus		Brion thalassion
Iuniperus	Lac	Cassia
Ligusticum	Hordeum	Cotyledon prima
Ocymum		Elatine Ebulus
Peucedanum		Faba Ficus
Rapa sylvestris		Harundo
Rhaponticum		Hyoscyamus
Triticum		Irinum Laurus
Thymoxalme		Linum
Vrtica	Vinacei	Lupinum satium
Vinum		Lonchitis
Vinum pissite		Lichen in petris
Vinum absynthite		Lens palustris Lapis
Vinum scilliticum		Melilotus Mandragoras
Vinum chamædryite		Naphtha Ocymum
Vinum tragoriganite		Ochra Picea
Vinum sylvestris nardi.		Platanus Portulaca
INFLAMMATIO		Pulegium Parthenion
num remedia.		Polygonon mas
Coriandrum		Papauer erraticum
Adeps	Asphodelus	Rosa Rhus

INDEX

Susinum	Sabina	Agallochum	Anthemis
Sesamum		Cocleæ terrestres	
Sonchos	Scordion	Hippuris	
Symphytum		Irinum	I.ac
Stratiotes aquaticus		Linum Mastichinum	
Triticum	Tribulus	Malua hordeum	
Vinacei	Xyris.	Palma	Portulaca
INGVINVM mor=		Rosaceum	Rosa
bi remedia.		Ruta	Salix
Vide Genitalium.		Spartum	
INGENIVM prom		Vinum Surrentium	
ptum facientia,		Triticum	
Ouum.		Et in uerbo, Dysenterico	
INSANIA M in=		rum remedia.	
ducentia.		INTERTRIGO	
Hyoscyamus		ut tollatur.	
Strychnon hypnoticon		Vitex	Corium.
Mandragoras.		ISCHIADICO=	
INSANIEN=		rum remedia.	
tium remedia.		Asarum	Balsamum
Betonica		Cardamomum	
Helleborum nigrum.		Silurus	Fimum
INSOMNIA in=		Nasturtium	Thlaspi
ducentia.		Rhaponticum	
Vide, Somniferæ medi=		Thymus	
cine.		Ammoniacum	
INTESTINO=		Ieontopetalon	
rum remedia.		Erythrodanum	

CURATIVVS.

Ascyron	Alysson
Androsæmum	Thelypteris.
Chamæpitys	L ABIORVM scis
Polemonia	sura remedia.
Ocymoides	Adeps Lycium.
Aethiopis	LAC coagulantia.
Arction	Balsamum Ficus.
Chamæcissos	LAC extinguentia.
Spartum	Gicuta.
Colocynthis	LACRYMAS
Oxymeli	trahentia.
Vinum panacite	Aerugo aurificum.
Salsugo Adarces.	LACERTAE mor-
IUMENTIS con-	sus remedia.
traria.	Portulaca
Gramen cilicum	Seps, siue lacerta calchi
Nerion.	dica in uino epota.
IUMENTORVM	LACRYMAE que
scabiem emen-	perimunt.
dantia.	Dioscorides lib. 6. in præ
Amurca Alysson	fat.
Lupinum satium	LACRYMAE
Oleum piscinum	tiones emen-
Oleum lentiscinum.	dantia.
IUMENTORVM	Vide, dilacrymationes
ulcera emen-	emendantia.
dantia.	LACTIS uberta-
Oleum picinum.	tem facientia.

T t iij

INDEX

Argemone	Anethum	Bdellium	
Ampeloleuce		Cyprinum	Fimum
Cicer	Circea	Centaurium maius	
Echion Fœniculus		Gentiana	Galbanum
Halimos	Hordeum	Hordeum	
Lactuca	Malua	Leucacantha	Myrrha
Melanthion		Napththa	Phu
Ocymum		Panaces heraclion	
Sonchos	Vitex.	Petroselinon	
LACTIS coagula		Prasium, siue marrubiu	
ti curatio.		Pseudobunion	
Diosc. lib. 6. cap. 26.		Ruta	Sagapenum
LASSITVDINVM		Terebinthina	
remedia.		Thapsia	Vrtica
Anethinum		Vinum cedrite	
Adeps	Clymenon	Vinum hyssopite	
Laurinum		Vinum stichadite	
Ammoniacum	Sal	Vinum tragoriganite	
Lapis gagates		Vinum aromatite	
Vinum chameletes.		Vinum acorite	
LATERVM morbi		Vinum glycyrrhite.	
remedia.		LENDES necantia.	
Acorus	Agallochum	Cedria	Mel
Asphodelus		Myrica	Beta
Aristolochia tertia		Allium	
Ampeloleuce		Alumen	
Balsamum		LENTIGINIS ma	
Brassica satina		cula remedia.	

C-V R A T I V V S.

Alysson	Halcyonium	Ficus	Fel
Aqua maris		Hordeum	Iuniperus
Ampeloleuce		Lolium	Lapathum
Brassica satina		Lepidium	Myosotis
Bulbus esculentus		Oleum oleastri	
Balanus myrepfica		Oleum cicinum	
Cinnamomum		Olea Aethiopica	
Eruum	Galbanum	Oryza	Salamandra
Melanthion	Rhaphanus	Serum	Sinapi
Sanguis leporinus		Struthion	
Sisymbrium syluestre		Scammonia	
Spuma argenti		Sulphur	Sal
Triticum cum aceto,		Terebinthina	
LEPRAE remedia.		Thapsia	
Allium	Anemone	Terra melia	
Aristolochia		Vlmus	Vrinus
Acantha	Anchusa	Vitis satina.	
Acetum		LEPORIS marini	
Ampelos leuce		remedia.	
Halcyonium		Fiber	Cornus
Alumen	Adarce	Lapis ophites	
Buprestis		Halcyonium	
Brassica satina		Chamaeleon niger	
Cochleae terrestres		Cicer	
Clematis	Fraxinus	Cucumis anguinus	
Cucumis anguinus		Characias	
Helleborum nigrum		Helleborum nigrum	
Acrugo aurificum		Ficus	Glutinum

INDEX

Laserpitium	Olea	Rhaponticum
Pruna		Aristolochia tertia
Rhaponticum		Crocodilion
Ruta		Absynthium
Vitis sativa		Hyssopum
Vinum tethalassomea num.		Tragoriganum
		Pulegium
LIENIS morbi		Dictamnus
remedia.		Sison
		Anison
Iris Illyrica		Smyrnion
Nardum Gallicum		Peucedanum
Myrice	Acorus	Sagapenum
Ca. chamum		Ammoniacum
Oleum amygdalinum		Viscum
		Polium
Lycium	Vitex	Chamedrys Leuconion
Cotonea	Linum	Nymphaea
		Asplenon
Ficus Aegyptia		Hemionitis
Lac humanum		Erythrodanum
Lupinum sativum		Vettonica
Rha. hancus		Lonchitis altera
Lapathum	Sinapi	Polemonia
Brassica sativa		Clymenon Xyris
Nasturtium		Anchusa
		Vrtica
Piper	Struthion	Adiantum Pteris
Helera Cyclaminos		Ampelos leuce & agria
Pancration		Aqua maris
Capparis	Lepidium	Vitis sativa
Agarcum		Acetum scilliticum

CURATIVVS.

Vinum panacite

Trifolium.

Ferrum Corallium

LUMBRICOS

Lapis Asius Coris

necantia.

Hermol. Cor. cap. 124.

Coriandri semen

LINGVAE utilia.

Absynthium seriphium

Olea Aethiopica.

Brassica satina

LIPPITVDINIS

Chamaeleon albus

remedia.

Calamintha

Ebenus

Myrrha Portulaca

Lapis hematites

Oleum cicinum

Plantago Spongie.

Thelypteris

LIQVORES qui

Lupinum satium.

perimunt.

LUMBORVM affe

Diosc. lib. 6. in praefat.

Etium remedia.

LIVOREM emen-

Asparagus Capparis

dantia.

Chamaepeuce

Allium Aqua maris

Echion Harundo

Iuglans

Leucacantha

Lana succida

Papauer cornutum

Rhaponticum

Sampsuchinum

Sinapi

Smyrnion.

Lupinum satium

LVPOS necantia.

Thasia.

Aconitum pardaliane

LOCORVM mulie-

ches.

brium remedia.

Aconitum alterum

Anethum Althea

Apocynum.

Foenogrecum

LVSCIOSORVM

Linum Leucoion

remedia.

INDEX

Fel animalium
Sanguis.

LVXATIS utilia.

Asparagus Acantha

Aphronitrum

Bulbus esculentus

Fimum

Harundo

Heliotropion

Iuglans

Narcissus

Polypodion

Vitex

Vrtica

Vitis sativa

Vinum pissite

Sampsuchus

Sal.

MACIEI corpo-
ris remedia.

Erinaceus.

MACVLAS tol-
lentia.

Oleum balaninum.

MACVLAS rube-
scere facientia.

Crocodilea, id est, Croco-
dili terrestres finum.

MALIS medicamen-
tis contraria:

Adeps Ruta

Pentaphyllon

Antirrhinon.

MALORVM qua
serpunt remedia.

Acacia Plantago

Polygonon mas

Helxine Cicutæ

Strychnum sativum

Aixoon maius

Colymbades oliuæ

Sabina.

MAMMARVM
morbi remedia.

Asarum Cotonea

Iuglans Thus

Erysimon Ochra

Lens Eruum

Asphodelus

Mentha

Scammonia

Sandaracha

Triticum

Baccaris

Apium Asclepias

Hemerocallis

C V R A T I V V S.

Althæa

Passum & protropon vi
num

Chamæpitys

Epimædion

Cici

Acetum

Oxymel.

Hyoscyamus

MELICERID VM

Vinacei

morbi remedia.

Aqua maris

Serum

Fex uini

Parthenion

Terra samia.

Helleborum nigrum

M A M M A E uirginū
ne crescant.

Epithymum

Acetum scilliticum

Cicuta

Cotis.

Amomum

M A S C V L V M fi-
lium generantia.

Melilotus.

M E N S T R V A

Cratæogonos

prouocantia.

Phyllon

Orchis.

Iris Illyrica

M A T R I C I S morbi
remedia.

Meu

Cyperus

Asarum

Casia

Malua

Ginnamomum

Oleum balaninum

Costum

Pæonia.

Iuncus odoratus

M A X I L L A R V M
doloribus remedia.

Balsamum

Canchamon

Ceruinum cornu.

Helenium

Myrrha

M E A T V S aperien-
tia.

Sampsuchinum

Amaracinum

Allium

Cyperus.

Abrotonum

M E C O N I O

Syrax

Naphtha

contraria.

Cedrides Myrice

INDEX

Tilia	Hypocistos	Agaricum
Lycium	Acacia	Aristolochia tertia
Vitex		Centaurium maius & minus
Olea sylvestris		Eryngion
Lotus		Absynthium
Amygdala amara		Origanum
Ficus		Tragoriganum
Cochlea terrestres		Pulegium
Fiber	Bubrestis	Eleliphacos
Oesypus	Fimum	Calamintha
Cicer	Rhaphanus	Thymus
Lapathum		Serpyllum
Brassica sativa		Sampsuchus
Chondrylla		Baccharis
Lactuca sylvestris		Ruta
Caucalis	Eruca	Panaces heracleon
Ocimum Cape		Ligusticum
Orobanche	Allium	Seseli Massiliense
Porrum		Tordylon
Ampeloprasum		Sison
Nasturtium		Foeniculus
Thlaspi		Oreoselinum
Struthion		Petroselinum
Cyclamino		Hippomarathrum
Asphodelus		Hipposelinum
Capparis		Smyrion
Anemone		Daucus
Hedera		Libanotis
		Melanthion

Lactuca
 Sagittaria
 Equisetum
 Cynopodium
 Chamadryas
 Melilotus
 Prunella
 Trifolium
 Pelum
 Anthus
 Leucum
 Anemone
 Eryngium
 Anemone
 Anemone
 Hyssopus
 Cypripedium
 Xiphidium
 Eriogonum
 Mentha
 Vicia
 Adonis
 Myrica
 Laurus
 Dolichos
 Cisteus
 Eriogonum

CURATIVVS.

Lasertitium		Ampelos melana	
Sagapemon		Heliotropion maius	
Euphorbion		Vinum scilliticum	
Clynopodium		Vinum absynthite	
Chamedrys	Lilium	Vinum hyssopite	
Melissophyllum		Vinum aromatite	
Prasium	Stachys	Vinum daucite	
Trifolium		Vinum panacite	
Polium	Scordion	Vinum helleborite	
Arthemisia		Vinum dictamnite	
Leucoion		Staphylinus.	
Anthemis	Peonia	MENSTRVA	stentia.
Erythrodanum			
Anagyris		Lentisci succus	
Alisma	Coris	Myrica	
Hypericon		Oxyacanthos	
Cestron	Medion	Thus	Palma
Xyphion	Tragion	Malum punicum	
Heliochrysos		Myrtus	
Mandragoras		Lepus terrestris	
Vrtica	Myrtus	Fuligo butyri	
Adiantum		Coagulum	
Myrtus sylvestris		Sanguis	Acinos
Laurus Alexandrina		Acantha Arabica	
Daphnoides		Hieracium maius	
Chamedaphne		Nymphaea	
Helleborus niger & al-	Peonia	Limolion	
bus	Medion		

INDEX

Sideritis achilleos

Rubus

Idæa radix

Tragos Lysimachia

Oxyſchœnos

Heliochryſos

Papauer ſatium

Mandragora

Aizon maius

Aerugo ferri

Vinum rhetinite

Fex vini

Lapis Aſius

Morochthus

Hematites

Oſtracites

Terra ſamia.

MENTEM commo-
uentia.

Coriandrum

Oreofelinum

METALLA quæ
perimunt.

Dioſc. lib. 6. in præfat.

MOLLIENTES
medicine.

Vide, Demollientes.

MORBI regij me-

dicina.

Vide, Regij morbi.

MORBORVM quæ
ſerpunt remedia.

Vide, Malorum quæ ſer-
punt.

MVLIERVM deſi-
derio quo ſatiſfiat.

Acorum

Picea Pinus

Adeps bubulus.

MVLIERVM infir-
mitatum remedia.

Amomum

Balsamum

Suſinum

Sefeli Maſſilienſe.

MVRES necantia.

Chameleon albus

Aconitum pardalianches

Helleborus candidus

Hermol. Cor cap. 28.

MVRIS aranei me-
ſus remedia.

Mus araneus

Absynthium

Chryſogonon

Dioſc. lib. 6. cap. 62.

MVRIS

CURATIVVS.

MVRIS MOR =	Metopium	Bdellium
<i>sus remedia.</i>	Lixiua ex ficu	
Grosi	Allium.	Erinaceus terrestris
MVSCAS necantia.	Cochlea terrestres	
Lyfimachia.	Vipera	
MYRMECIAS	Vermes terreni	
<i>tollentia.</i>	Lac humanum	
Ficus.	Triticum	Poterium
NARIVM mor =	Peucedanum	
<i>bi remedia.</i>	Laserpitium	
Malum punicum.	Lilium	Satyrium
NAVSEAM DI =	Melissophyllon	
<i>scutientia.</i>	Althea	Coccus
Tragoriganum	Erigeron	Cacalia
Pulegium	Narcissus	
Foeniculus.	Hippophaeston	
NAVSEAM MO =	Vini qualitas	
<i>mentia.</i>	Aqua maris	
Laurinum	Acetum scilliticum	
Susinum.	Vinum stichadite	
NERVORVM mor	Vinum thymite	
<i>bi remedia.</i>	Fex uini	Fiber.
Oleum scyonium	NERVOS ledentia.	
Oleum eleomeli	Malus	Hedera
Laurinum	Vinum	
Cyprinum	Vinum gypsatum	
Gleucinum	Mesagite.	
Amaracinum	NERVOS tollentia.	
	V	

INDEX

Mel sardoum.

NIGREDINES

abstergit.

Sabina.

NODIS utilia.

Bdellium.

NOMARVM mor

bos curantia.

Asparagus

Sabina

Cistos

Olea sylvestris

Oliue colymbades

Malum punicum

Smarides

Fel animalium

Vrina

Plantago

Asphodelus

Maron

Orchis serapias

Britannica

Peristereon supinus

Galiopsis

Vua cenanthe

Omphacinum

Acetum

Squama eris

Papyrus

Lilium

Arisaron

Prasium

Oxalme

Aerugo aurificum

Chalcites lapis

Flos salis

Lapis ostracites.

NVBECVLAS

oculorum emen-

dantia.

Vide, Oculorum reme-

dia.

NYCTILOPARVM

morbi remedia.

Vide, Luscioforum re-

media.

OBMVTECE

re facientia.

Mandragora.

OCVLO RV M epi

phoræ remedia.

Asarum

Malabathrum

Cotonea

Sesamum

Lens

Cucurbita

Anemone

Argemone

Myosotis

Gentiana

Baccharis

Ruta

Apium

Hemerocallis

EVRA TIVVS.

Rubus idea	Populus alba	
Papauer fatium	Myrice	Acalis
Philomides	Ebenus	Rosa
Aster atticus	Lycium	Acacia
Viola purpurea	Salix	
Cici.	Olea sylueſtris	
O C V L I S contraria.	Olea	
Lactuca	Olea Aethiopica	
Porrum	Palma Thebaica	
Ocymum	Cytinus	Myrtus
Coriandrum	Ceraſia	
Anethum	Halicacabus	Mitula
O C V L O R V M mor	Cochleæ terreſtres	
borum remedia.	Scorpius marinus	
Acorum	Vipera	
Cafia	Seneſta ſerpentis	
Cinnamomum	Sepia	
Amomum	Mullus piſcis	
Balsamum	Ouum	Hirundines
Canthamum	Ceruinum cornu	
Crocum	Lac humanum	
Crocomagma	Coſtus	
Oleum vulgare	Fuligo butyri	
Eleomeli	Lana uſta	Oeſpus
Oleum amygdalinum	Fel animalium	
Myrrha	Sanguis	
Thus	Vrina	Mel
Fuligo thuris & reſina		
& picis		
Picea	Cupreſſus	
Sabina	Platanus	
	Amylum	

V n ij

INDEX

Faba	Lens	Ammoniacum
Brassica sativa		Sarcocolla
Portulaca		Chamaedrys
Seris	Pepo	Prasium Stoebe
Lactuca sylvestris		Tribulus Erinos
Ocimum	Cape	Gramen Parnasium
Sinapi	Piper	Rubus Elatine
Zingiber		Papaver sativum, &
Cyclaminos		cornutum
Asphodelus		Hyoscyamus
Dracunculus maior		Mandragoras
Dracunculus minor		Aconitum Pardas
Argemone		lianches
Anagallis		Aizoon maius
Chelidonium maius		Helleborus albus
Othonna		Cici Chamaesyce
Centaurium minus		Capnos
Tragacantha	Aloe	Lotus sativa
Absinthium		Sesamoides maius
Abrotonum		Aes ustum
Ruta	Sampsuchus	Vua cenanthe
Melilotus		Vinum Surrentinum
Ruta Galatica, siue syl-		Acetum scilliticum
vestris		Cadmia
Panaces heracleon		Squama aris
Foeniculus		Aerugo aurificum
Libanotis		Plumbum elotum
Sagapenon		Stimmi Cinnabaris

CURATIVVS.

Chalcitis lapis

ORIS VLCE

Alumen

Pumex

rum remedia.

Sal

Flos salis

Cyperus

Aspalathus

Fex uini

Spongia

Puligo picis

Cyprus

Corallium

Tilia

Acacia

Pyrites

Olea syluestris

Hematites

Castanea

Calaclites

Thyites

Malum punicum

Morochthus

Mena

Sapphirus

Lac schiston Butyrum

Geodes

Plantago

Aloe

Samius.

Origanum

OPISTHOTONI

Lencoion

corum, id est, cernicis

Orchis serapias

rigore laborantium re

Anthemis

media.

Periclymenon

Acanthion

Rubus

Eryngion

Staphis agria

Laserpitium

Vua œnanthe

Sagapenon

Omphacium

Satyrion

Coris.

Acetum scilliticum

OP II remedia.

Sandaracha

Sal

Alumen

Sal.

Diosc. lib. 6. cap. 17.

ORTHOPNOI

ORIS HALITVS

cis, id est, difficulter

remedia.

spirantibus remedia.

Vide, Halitus oris re

Helenium

media.

Myrrha

V u iij

INDEX

Cupressus	extrahentia.
Daphnides	Aristolochia
Cotonea	Vrina Ampelos leuce.
Struthion	OSSA fracta conso-
Cyclaminos	lidantia.
Dracunculus maior	Vetonica Xyris.
Abrotonum	OVES necantia.
Hyssopus	Nerion.
Calamintha	OXYPARA IN-
Thymus	gredientia.
Baccharis	Ligusticum
Seleli Massiliense	Caros Anethum.
Hieracium maius	PALPEBRA-
Smyrnion	rum remedia.
Sphondylium	Vnguentum rosaceum
Peucedanum	Mastiche Resina
Melanthion	Fuligo picis
Ammoniacum	Grossi
Melissophyllon	Lixivia ex ficu
Bechion	Vrina Alumen
Botrys	Chondrylla
Anemone	Vide supra, Genarum
Hippuris	morbis remedia.
Vrtica	PALPEBRARVM
Elaterium	pili euulsi ne rena-
Hippophaeston	scantur.
Vinum panacite.	Tellina
OSSIVM squamæ	Sanguis Capnos.

CURATIVVS.

PALLIDVM CO PARALYTICO =

lorem facientia. rum remedia.

Hieracium minus

Capparis

Aloe.

Erythrodanum

PANORVM remedia.

Colocynthis

Atriplex

Acetum

Ampelos melena

Bulbus esculentus

Vinum scilliticum

Coriandrum cum faba

Aphronitrum.

fracta

PARTVS necantia.

Coniza

Ficus

Daphnides

Galiopsis

Coagulum

Olea sylvestris

Adeps hircinus & ouile

Helxine

lus & bubulus

Ocymastrum

Nasturtium

Ammoniacum

Thlaspi

Ruta

Ifatis

Plantago

Hedysaron

Xyphion.

Helleborus albus & ni-

PANTHERAS

ger

necantia.

Colocynthis

Aconitum pardalian-

Ampelos leuce

ches.

Vinum phthorium.

PAPAVERIS

PARTVS QVI-

curatio.

bus iuuatur.

Dioscor.lib.6. cap. 17.

Iris Illyrica

& 18.

Cinnamomum

PAPVLARVM

Balsamum

remedia.

Vnguentum telinum

Vrina

Flos aris.

Irinum

Vu iij

INDEX

Amaracinum	Clinopodium
Myrrha	Ammoniacum
Picea	Fiber Chamædrys
Olea Aethiopica	Prasium
Oesypum	Bechion
Fimum	Artemisia
Cicer	Coniza
Lupinum sativum	Leucoion
Allium	Onosma
Cyclaminos	Anthemis
Dracunculus maior	Anchusa
Dracunculus minor	Mandragoras
Hedera	Laurus Alexandrina
Gentiana	Ampelos leuce
Centaurium maius	Heliotropium maius
Centaurium minus	Vinum panacite
Pulegium	Vinum helleborite
Elelisphacos	Alumen
Calamintha	Sulphur
Baccharis	Lapis Iaspis
Panaces heracleon	Aetites
Staphylinus	Samius.
Thynni falsi caro	PARONYCHIAS
Seseli Masiliense	rum, id est, unguis
Smyrnion	morborem remedia.
Peucedanum	Thus cum melle
Sagapenum	Olea sylvestris
Galbanum	Myrtus

CVRATIVVS.

Ebur		Vide, Iumentorum scabiem
Paronychia		
Vua cenanthe		PECORI utilia.
Aerugo ferri		Adiantum.
PAROTIDVM id est, aurium apostematum remedia.		PECVS necantia.
Ficus		Merion
Fimum		Aconitum lycoctonon.
Linum	Faba	PECVS mortuum extrahentia.
Lapathum		Aristolochia.
Plantago		PECTORIS morbi remedia.
Erysimon		Acorus Men
Viscum	Althæa	Costum Myrrha
Psyllium		Iuncus odoratus
Strychnon sativum		Pityides
Vrtica		Terebinthina
Galiopsis		Iuniperus
Terra cimolia.		Ficus
Et in uerbo, Aurium medicinae.		Pomum
PAVESCEN- tium remedia		Nasturtium
Iinum		Piper
Melicratum		Chelidonium minus
Hydromel.		Rhaponticum
PECORIS scabiem emendantia.		Stichas
		Thymus
		Ruta
		Libanotis

INDEX

Sagapenum	Ficus Aegyptia
Ammoniacum	Vinum stichadite.
Scordion	PERCVSSIS à fe-
Bechion	ris utilia.
Vrtica	Balsamum
Isopyrum	Paliurus
Vinum cedrite	Mustela
Vinum aromatite	Ouum
Vinum nectarite	Argemone
Vinum daucite.	Hippomarathrum
PEDICVLOS	Coagulum
necantia.	Sanguis
Allium	Piper
Allumen	Elaphoboscon
Mel	Phyl litis.
Cedria.	PERNIONVM
PEDVM qui à frigo-	remedia.
re alserunt remedia.	Vnguentum melinum et
Cyclaminos.	telinum
PEDVM rimarum	Thus cum suillo adipe
remedia.	Acacia
Scilla	Ficus
PERFRICTIO=	Cancrì
nis medicina.	Pulmo marinus
Iris Illirya	Vngues asini
Cyperus	Adeps
Balsamum	Eruum
Oleum.	Rapa sativa

CURATIVVS.

Beta	Malua
Cyclaminos	Asparagus
Dracunculus maior	Lactuca sylvestris
Dracunculus minor	Hedera
Asphodelus	Abrotonum
Scilla	Daucus
Batrachion	Sphondylium
Arction	Aparine
Cotyledon prima	Phalangium
Aqua maris	Myrrhis
Alumen.	Aqua maris
PERIPNEUMO =	Dioscoridis libro 8. ca =
niacorum remedia.	pit. 58.
Abrotonum	PHAGEDAENAE
Tragoriganum.	morbi remedia.
PESTILENTIAE	Fel Fimum
contraria.	Dracunculus minor
Myrrhis, id est celi fo =	Isatis
lium	Chamaeleon niger
Vinum omphacite.	Panaces
PHALANGIO =	Staphylinus
rum ictus remedia.	Petasites
Cinnamomum	Characias
Terebinthus	Ampelos leuce
Myrica	Vinum
Myrtus	Acetum
Lixivia ex fico	Alumen
Cancris	Sal Flos salis.

INDEX

PHARICO ueneno	Porrum
contraria.	Agaricum
Vinum Albanum	Rhaponticum
Diosc. lib. 6. cap. 19.	Acantha
PHLEGMATIS	Prasium
contraria.	Cestrum
Plantago.	Lapis Asi us.
PHRENETICO	PILI genarum ne
rum remedia.	defluant.
Crocinum	Spica nardi
Vitex	Cochleæ terrestres
Asparagus	Oesypus
Serpyllum	Chondrylla
Coniza tertia	Armenius lapis.
Leucoion.	PILI palpebrarum
PTHIRIASIS,	euulsi ne rena-
sive pedicularis mor	scantur.
bi remedia	Tellinæ
Strigmenta gymnasto-	Sanguis
rum	Canops.
Myrica	PILI alarum euulsi
Hedera	ne renascantur.
Staphis agria	Fabæ.
Sandaracha.	PITVITAE crassæ
PTHISCORVM	remedia.
remedia.	Iris Illyrica
Pix	Sesamum
Adeps	Hyssopus

CURATIVVS.

Thymoxalme.

Origanus

PITVITAE res

Tragoriganum

media. *capitulum*

Pulegium

Cinnamomum

Thymus

Styrax

Naphtha

Ruta

Vlmus

Pyrethrum

Auellana

Sphondylium

Ouum

Melanthium

Serum

Parthenion

Vrina

Clematis

Hordeum

Sideritis achilleos

Linum

Hyoscyamus

Faba

Helleborum nigrum

Lupinum satium

Sesamoides maius

Agriorhaphanus

Cucumis

Portulaca

Elaterium

Cucurbita

Staphis agria

Cepa

Thapsia

Sinapi

Hippophaes

Piper

Hippophæston

Cyclaminos

Cici

Characias

Dracunculus maior

Lathyris

Capparis

Scammonia

Anemone

Thymelea

Anagallis

Ebulus

Centaurium minus

Apios

Tragacantha

Colocynthis

Hyssopus

Epithymon

INDEX

Empetron	Naphtha
Ampelos leuce	Populus nigra
Polypodion	Amurca
Heliotropium maius	Salix
Vua passa	Ficus
Aqua maris	Cochleæ terrestres
Vinum rhetinite	Mustela
Vinum aromatite	Marinus pulmo
Vinum mandragorite	Lac humanum
Vinum scammonite	Adipum medicinae
Sulphus	Peplus
PITYOCAMPA =	Sanguis scilicet mens-
rum curatio.	struus
Diosc.lib.6.cap.2.	Fimum
PLAGARVM uibi-	Hordeum
ces emendantia.	Lens
Susnon.	Rapa sativa
PLANTAE quæ	Erasica sativa
perimunt.	Seris
Diosc.lib.6.in præfat.	Cucurbita
PLEVRETICO =	Aros
rum remedia.	Asphodelus
Staphylinus	Bulbus esculentus
Laserpitium	Pulegium
Aethiopsis.	Panaces Heracleon
PODAGRAE mor-	Libanotis
bi remedia.	Scordion
Amomum	Leucoion
	Androsaces

CVRATIVVS.

Helxine		rum morbi remedia.
Papauer satium		Aloe.
Hyoscyamus		PRAECORDIO =
Lens palustris		rum remedia.
Aixoon maius		Scordion
Bryon thalassion		Vinum thymite
Phycos marinus		Vinum daucite.
Cucumis anguinus		PRAECIPITA =
Balanus myrepfica		tis ex alto utilia.
Ebulus		Iris Illirica
Heliotropium maius		Vitex
Vua passa		Asparagus
Acetum	Ferrum	Anisum
Sulphur	Sal	Cannabis sativa.
Lapis Asius		PROFLVII genit
Lapis gagates		turae remedia.
Teste siue terra fornacum.		Vide, Geniturae profluvij in somno.
POLYPI morbi remedia.		PRVRIGINEM facientia.
Dracunculus maior		Scolopendra
Dracunculus minor.		Ephemeron
PRESTERIS serpentis morsus remedia.		Opium.
Omotarichos		PRVRIGINEM emendantia.
Rubus.		Vrina Eruum
PRAEPTIO =		Lapathum
		Aloe

INDEX

Origanum	Batrachion
Pulegium	Chelidonium minus
Eleliphacos	Origanum
Melilotus	Pentaphyllon
Balanus myrepfica	Staphis agria
Acetum	Balanus myrepfica
Alumen	Ampelos leuce
Sulphur	Vitis sativa
Sal.	Aqua maris Sal.
PSILOTHRVM,	PSYLLII curatio.
sive unguentum de-	Diosc. lib. 6. cap. 10.
pilatorium.	PTERYGII morbi
Lepus marinus	remedia.
Hedera	Acacia
Ampelos leuce	Rhus
Dryopteris	Malum punicum
Arsenicum.	Myrtus
PSORAE morbi	Ficus
remedia.	Glycyrrhiza
Cardamomum	Aloe
Oleum amygdalinum	Prasum
Lycium	Pentaphyllon
Olea	Characias
Palma elate	Ampelos leuce
Ficus	Vua cenanthe
Erinaceus marinus	Acetum
Cicer	Alumen
Lupinum sativum	Sal.
	Ferri

CURATIVVS.

Ferri rubigo. genitalium remedia.

PVBERTAS ne Aspalathus.

erumpat.

PVTREDINES

Hyacinthus.

purgantia.

PVLMONIS mor-

Irinum

bi remedia.

Cinnamomum

Iuncus odoratus

Pix

Balsamum

Sal.

Cedria

QVADRUPES

Amygdalus amara

dum scabiem

Ficus

emendatia

Lac

Vide Iumentorum sca-

Pulegium

biem.

Ruta

QVARTANAE

Sagapenum

febris remedia.

Symphyton

Vide, Febris quartanae

Pentaphyllon

remedia.

Chrysocome

RADICES que

Vrtica

perimunt.

Thapsia

Dios. lib. 6. in prefat.

Melicratum

RAVCEDANIS

Vinum hyssopite

remedia.

Vinum aromatite.

Tragacantha.

PVLICES necantia.

REDVVIAS

Vnguentum telinum

sanantia.

Crocium

Ferri rubigo.

Butyrum

REFRIGERAN-

PVTREDINVM

tes medicine.

X x

INDEX

Vnguentum melinum	Pompholyx
Cupressus	Plumbum elotum
Rhodides	Spuma argenti
Rosa	Cerussa
Acacia	Corallium
Ouum	Terra
Sonchos	Lapis samius
Seris	Terra ampelitis.
Lactuca	REGII morbi
Caros	remedia.
Coriandrum	Nardi spica
Hieracium maius	Schistos
Polygonum duplex	Ceruinum cornu
Glymenon	Fimum
Periclymenon	Cicer
Helxine	Lapathum
Papauer satium	Atriplex
Psyllium	Asparagus
Cicuta	Erysmon
Lens palustris	Scilla
Aizoon duplex	Chelidonium
Erigeron	Aloe
Phacos thalassion	Absynthium
Potamogeton	Origanum
Cytisus	Hippomarathrum
Ebulus	Libanotis
Acetum	Sphondylium
Omphacomeli	Laserpitium

C V R A T I V V S.

Prasum	Calamus odoratus
Scordion	Cicer Casia
Asplenon	Cinnamomum
Anthemis	Chamapitys
Peonia	Passum
Erythrodanum	Glycyrrhiza
Chamapitys	Iuncus odoratus
Pentaphyllon	Laurinum
Hyacinthus	Lac
Halicacabus	Lotus sativa
Chamecissos	Men
Osyris	Pistacia
Myrtus sylvestris	Nardus Gallica
Elaterium	Nuclei pini
Vinum chamedryte	Oleum amygdalarum
Vinum calaminthite	Palma elate
Vinum nardite	Portulaca
Sulphur.	Plantago
RENVM doloris	Porrum
remedia.	Petroselinum
Amygdala amara	Peucedanum
Asparagus	Peonia
Anagallis	Rhaponticum
Agaricus	Saccharum
Anthyllis	Scandyx
Anchusa	Smyrnion
Halcyonium	Symphyton
Cardamomum	Stratiotes aquaticus

Xx ij

INDEX

Tragacantha	Oleum oleastri
Cordylon	Ouum
Vrina	Persica
Vetonica	Portulaca
Vua passa	Plantago
Vinum	Staphis agria
Vinum cydonite	Triticum
Vinum holosanthinum	Vini qualitas
Erinaceus terrestris	Vinum labrusca
Foeniculus	Vinum ex pyris
Vinum absynthite	Vinum myrtite.
Vinum nardite	RIGINOS necantia.
Vinum aromatite	Cedria.
Oleum balaninum.	RIGORES seu hor-
RHAGADVM	rores febrium ex-
remedia.	cutientia.
Pix	Gleucinum
Lycium	Piper
Vitex	Panaces heracleon
Cancr.	Staphylinus
RHEVMATIS	Vinum cedrite
mis utilia.	Pyrethrum.
Acetum	RIMARVM sedis
Cupressus	remedia.
Daphnoides	Vide, Sedis rimarum.
Ficus	ROSIONIS re-
Fex vini	media.
Macer	Lac schiston

CURATIVVS.

Peonia.	Aristolochia
R V C T V M monētia.	Centaurium
Mastiche	Acantha
Rhaphanus	Leucacantha
Anethum	Abrotonum
Smyrnion	Origanum
Vinum daucite.	Calamintha
R V P T O R V M	Serpyllum
remedia.	Baccharis
Acorus	Panaces heracleon
Cardamomum	Libanotis
Asarum	Laserpitium
Calamus odoratus	Sagapenum
Helenium	Galbanum
Bdellium	Polycnemum
Iuniperus	Chimopodion
Cedrides	Althea
Halimos	Cestron
Lixivia ex ficu	Symphyton
Fel	Holosteum
Fimum	Xyris
Dracunculus maior	Hippuris
Dracunculus minor	Heliochryson
Asphodelus	Phlomidis
Bulbus esculentus	Ampelos leuce
Capparis	Vinum daucite
Rhaponticum	Vinum tragoriganite
Gentiana	Vinum panacite

X x iij

INDEX

Lapis schistos.	Myrtus
S AGITTAS infi-	Cichorium
cas extrahentia.	Amygdalus amara
Vide, Spicula infixa.	Ouum
SALIVAM euo-	Ceruinum cornu
cantia.	Fimum
Pyrethrum.	Coagulum
SALAMANDRAE	Triticum
ueneni remedia.	Amylum
Diosc. lib. 6. cap. 4.	Portulaca
SANGVINEM ex-	Plantago
creantibus utilia.	Porrum
Iuncus odoratus	Erysimon
Aspalathus	Agaricum
Thus in potu datum	Aloe
Lentiscus	Rhaponticum
Mastiche potu data	Centaurium
Naphtha	Acantha leuce & Aras-
Cupressus	bica
Macer	Ferula
Myrica	Althea
Hypocistis	Cestron
Rosa	Lysimachia
Lycium	Symphytum
Salix	Polygonon mas
Quercus	Symphytum alterum
Palma	Clymenon
Malum punicum	Aethiopsis

CURATIVVS.

Isopyrum	Serpyllum
Adiantum	Ruta
Vitis sativa	Cuminum sativum
Vua	Stæbe
Omphacium	Ferula
Vinum phoenicis	Clymenon
Corallium	Hippuris
Lapis hematites	Sideritis achilleos
Terra samia.	Pentaphyllon
SANGVINEM	Phoenix herba
sistentia.	Astragalus
Thus	Lichen in petris
Cupressus	Idea radix
Galla	Gallion
Persea	Stratiotes terrestris
Cocleæ terrestres	Vua cenanthe
Rane	Acetum
Araneus	Vinum terebinthinum
Ouum	Plumbum elotum
Coagulum	Stimmi
Sanguis	Cinnabaris
Fimum	Alumen
Faba	Sulphur
Plantago	Spongiæ
Porrum	Gypsum.
Isatis	SANGVINEM cō-
Eleisphacos	cretum discutientia.
Mentha	Lixivia ex ficu

X x iij

INDEX

Thymus	SCABIEI morbi
Heliochryson.	remedia.
SANGVINEN per	Argemone prima
urinam expellentia.	Chamæleon niger
Eruum	Helleborus niger
Cantharides	Oesypum
Ammoniacum.	Oleum oleastri
SANGVINEM per	Sinapi
nares expellentia.	Sulphur
Crocodilium.	Vnguentum melinum.
SANGVINEM per	SCOLOPEN
urinam reddentium	drae morsus remedia.
remedia.	Grosi
Cuminum sylvestre.	Scolopendra
SANGVISUGAS	Asphodelus
necantia.	Sal.
Oxalme	Dioscorides libro.6.ca.
Diosc.lib.6.cap.32.	pit.59.
SANDARACHAE	SCORPIONIS
curatio.	ictus remedia.
Diosco.lib.6.cap.29.	Cyperus
SARDONIAE	Amomum
curatio.	Cardamomum
Diosc.lib.7.cap.14.	Cinnamomum
SCABIEI iumen =	Daphnoides
torum emendantia.	Myrtus
Vide, Iumentorum sca-	Ficus
biens.	Cancer

CURATIVVS.

Scorpius terrestris	Vinum cydonite
Smarides	Sulphur
Mullus piscis	Sal
Locuste	Lapis sapphirus.
Lacerta	Diosc.lib.6.cap.60.
Mures domestici	SCORPIONES
Fimum	necantia.
Lapathum	Cancr.
Sonchos	SCORPIONIS
Seris	marini ictus reme
Lactuca sylvestris	dia.
Ocymum	Vrina
Abrotonum	Asphodelus
Sampsuchum	Plumbum syncerum &
Hieracium maius	crematum
Delphinion	Sulphur.
Laserpitium	Diosc.lib.6.cap.61.
Atractilis	SCORPIONES
Lychnis utraq;	torpefacientia.
Millefolium	Delphinion
Phalangium	Lychnis sylvestris
Polemonia	Lens. palustris.
Chamaesyce	SECUNDINAS
Heliotropium	trahentia.
Scorpioides	Balsamum
Aqua maris	Sampsuchinum
Vinum tethalassome =	Abrotonum
num	Picea Sch.Stos.

INDEX

Fiber	Lens	Libanotis
Iecur mergi	Symphyton	
Linum	Erigeron	
Aristolochia tertia	SEDIS morbi re-	
Thymus	media.	
Pulegium	Thus	
Prasium	Lentiscus	
Stachys	Pix	Rosa
Artemisia	Amurca	
Oenanthe	Malum punicum	
Hemierocallis	Myrtus	
Erythrodanum	Cancer	
Anagyris	Ouum	
Myrtus	Oesypum	
Adiantum	Adeps	Fel
Ampelos leuce	Lens	
Vinum dictamnite.	Malua	
SEDIS rimarum	Althea	
remedia.	Portulaca	
Strigmenta balneo =	Sonchos	
rum	Anagallis	
Mers	Aloe	Melilotus
Dipsacos	Laserpitium	
Leucoion.	Aster atticus	
SEDIS inflammatio-	Viola purpurea	
nis remedia.	Cucumis anguinus	
Oleum cicinum	Colocynthis	
Amaracinum	Acetum	

C V R A T I V V S.

Oxalme

Vinum terebinthium

Flos æris

Plumbum elotum.

SEMINA que perimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

SENSIBVS nocētia

Vinum annosum.

SENSVS recreantia.

Lapis Samius.

SEPIS bestiolæ mortuus remedia.

Portulaca

Oxymel.

SERPENTIVM

uenenis contraria.

Paliurus

Vitex

Cancrī

Hippopotamus

Fiber

Mustela

Gallinaceus

Cantharides

Chondrylla

Nasturtium

Dracunculus

Aphodelus

Rhaponticum

Aristolochia tertia.

Origanum sylvestre

Baccharis

Ruta

Phlomos, siue uerbasum

Panaces chironium

Staphylinus

Smyrnion

Aparine

Chamædrys

Lychnis fatiua, siue coronaria

Erythrodanum siue Rubia

Sparganion

Polygonon mas

Clematis daphnoides

Polemonia

Anchusa

Ocimoides

Hyacinthus

Mandragoras

Nerion

Adiantum.

SERPENTES

fugantia.

INDEX

Iuniperus	Ficus Aegyptia
Cornus ceruinum	Pastinaca piscis
Adeps	Rana
Nasturtium	Cobius
Dracunculus maior	Fel
Abrotonum	Omotarichos
Origanum	Fimum
Calamintha	Marinus pulma
Peucedanum	Mel
Melanthion	Eruum
Galbanum	Dictamnus
Polium	Rhaphanus
Oenanthe	Agaricum
Lysimachia	Brassica sativa
Aster Atticus	Cyclaminos
Vinum conixite	Ampeloprason
Lapis gagates.	Dracunculus minor
SERPENTIVM	Asphodelus
morsus remedia.	Anagallis
Iris Ilirica	Acantha leuce
Asarum	Abrotonum
Cinnamomum	Asclepias
Balsamum	Origanum
Pix	Lilium
Iuniperus	Calamintha
Platanus	Clinopodium
Erica	Serpyllum
Pistacia	Leontopetalon

CVRATIVVS.

Lanaces heracleon &	Oxymeli
asclepion	Vinum conixite
Cyminum satium &	Vinum panacite
sylvestre	Sal Cinis vitis
Ammi	Lapis ophites.
Fœniculum	SERPENTES ne
Daucus	feriant.
Libanotis	(erui medulla.
Sagapenor	SERPENTES ne
Prasion	cantia.
Phyllitis	Anchusa onocheles
Trifolium	Vinum cedrite.
Scordion	SICCANTES
Cestron	medicinae.
Periclymenos	Ammi
Echion	Bromos
Ocymoides, siue ocymastrum	Cistos
Rubus	Cyminum satium
Eupatorium	Ebulus
Heliochryson	Aes ustum
Adiantum	Arena litoris
Peristereon supinus	Libanotis
Ebulus	Mentha
Ampelos leuce	Pompholyx
Vitis sativa	Spodium
Vinum	Rubus
Acetum	Terra Chia
	Rubrica sinopis

INDEX

Fex vini

Diphryges.

SINGULTUM

pellentia.

Fiber

Sisymbrium

Rhaponticum

Mentha

Aristolochia tertia

Anethum

Cuminum sylvestre

Alysson

Asplenon

Clymenon

Saxifragum.

SIRIASIS res

media.

Cucurbita

Pepo

Heliotropium maius.

SITIM generantia.

Cæpe

Allium

Capparis

Vini qualitas.

SITIM extinguentia.

Glycyrrhiza

Symphytum.

SMILACI cōtraria.

Vide, Taxo contraria.

SOMNIFER AE

medicinae.

Amygdale amare

Halicacabus, siue solaa

num uesticarum.

Anisum

Amomum

Cistos tertia, siue laa

danum

Baccharis

Dorycnion

Hyoscyamus

Lactuca

Iris Illyrica

Opium

Mandragoras

Papauer rhœas, siue sa

tiuum

Porrum

Styrax

Smilax hortensis

Strychnon hypnoticon

siue solanum somnifi

cum

Vitex

Vinum nouum

Lapis memphites.

CURATIVVS.

OMNIVM discuti-
tientia.

Sphondylium

Peucedanum.

SOMNIA imaginosa
& mala inducentia.

Faba

Lens

Pygnoconomum

Smilax lewis.

SORDES purgãtia.

Irinum

Cortex thuris

Sabina.

SPASTICORVM
remedia.

Fiber.

SPASMI remedia.

Vide, Convulsionis reme-
dia.

SPIRITVM id est,
flatum generantia.

Gentiana.

SPIRANTIBVS
difficulter utilia.

Vide, Orthopnoicis.

SPIRITVS discuti-
rentes coercentia.

Bdellium.

SPIRANTIBVS

uitam auferentia.

Cedria.

SPICVLA infixæ cor-
pori extrahentia.

Anagallis

Harundo

Aristolochia

Dictamnus

Propolis

Narcissus

Oxyacantha

Silurus

Triticum

Tragion

Xyphion

Xyris

Lacerta.

SPISSANDI vim
habentia.

Acacia

Malus

Cotonea

Malum sylvestre

Amygdalus amara

Baccharis

Britannica

Polygonon mas & fœ-

INDEX

<i>mina</i>	<i>contraria.</i>
Clymenon	Vinum in commune.
Medion	SQVAMAS ofsiu ^{no}
Rubus	extrahentia.
Helxine	Aristolochia tertia
Idea radix	Peucedanum.
Hippuris	STAPHYLOMA=
Psyllium	tis remedia.
Bryon thalassium	Palma Thebaica
Potamo geton	Lapis schistos
Acetum	Lapis sapphiros.
Vinum Hadrianum	STERNVT A=
Aerugo aurificum	mentum mouen=
Vinum nigrum labrus=	tia.
scæ	Iris Illyrica
Vinum Tyburtinum	Fiber Sinapi
Cadmia	Ptarmice
Pompholyx	Struthion
Squama eris	Batrachion
Pumex	Daphnoides
Corallium	Helleborus albus.
Rubrica synopsis	STERILES scem=
Lapis hematites.	nas facientia.
SPLENETICIS	Vide, Generationem de=
utilia.	primentia.
Vide, Lienis morbi reme=	STIGMATVM
dia.	remedia.
SPVMAE argenti	Batrachion
	Mandragora.

EV RATIVVS.

Mandragora.	Aqua maris
STOMACO CON	Vinum tethalassome
traria.	num.
Terebinthina	STOMACHI mor
Cedrides	bi remedia.
Melimela	Meu
Pruna	Nardi spica
Arbutus	Nardum Gallicum
Iuglans	Malabathrum
Auellana	Iuncus odoratus
Ficus	Agallochum
Hordeum	Helenium
Lens	Oleum balaninum
Malua	Mastichinum
Porrum	Vnguentum rosaceum
Brassica sativa & ma-	Susinum
rina	Nuclei pini
Cape	Mastiche
Nasturtium	Cupressus
Capparis	Iuniperus
Absynthium	Laurus
Absynthiū seriphium	Populus nigra
Balanus myrepsica	Rosa
Vua	Oliua colymbades
Thymelea	Palma
Ebulus	Palma elate
Prasium	Malum punicum
Galbanum	Silique

Y y

I N D E X

Myrtus	Portulaca
Cotonea	Sonchos
Mala Epirotica	Seris
Armeniaca	Cucumis
Mespilus	Lotus
Pruna	Pactuca
Amygdale dulces	Gingidium
Pistacia	Scandyx
Iuglans	Aphace
Morus	Ampeloprasora
Persea	Allium
Ficus Aegyptia	Zingiber
Ionia	Scilla
Cochlea terrestres	Bulbus esculentus
Ouum	Agaricum
Lac	Rhaponticum
Lac humanum	Gentiana
Caseus	Acantha leuce
Lana succida	Aloe
Oryza	Absynthium
Lyncurion	Mentha
Saccharon	Tragoriganum
Faba Aegyptia	Pulegium
Sifer	Melilotus
Lupinum sativum	Ligusticum
Lapathum	Caros
Lampfana	Anethum
Brassica sativa	Cynium sylvestre
	Hieracium maius
	Apium

C V R A T I V V S.

Petroselinum	Vinum omphacite
Smyrnion	Vinum nigrum ex labris
Fœniculus	sca floribus
Scordion	Vinum melitite
Artemisia	Vinum scilliticum
Nymphaea	Peonia Vinum cydonite
Cestron	Vinum apijte
Polygonon mas	Vinum anethinum
Rubus	Vinum rhoite
Strychnon sativum	Vinum myrtite
Cotyledon prima	Vinum terebinthi-
Erigeron	num
Adiantum	Vinum phœnicite
Aster Atticus	Vinum absynthite
Viola purpurea	Vinum bunite.
Chamedaphne	Vinum dictamnite
Colocynthis	Vinum calaminthite
Vitis samia	Vinum aromatite
Nuclei acinorum	Vinum nectarite
Vua œnanthe	Vinum nardite
Omphacium	Vinum ex sylvestri nar-
Vini qualitas	do
Phalernum	Vinum selenite
Hydromel	Ferrum
Thymoxalme	Flos salis
Omphacomeli	Fex uini
Vinum	Lapis alabastrite
Vinum Surrentinum	Lapis Samius

Yy ij

INDEX

STRUMAE GVT	Pseudobunion
turis remedia.	Adiantum
Iris Illyrica	Teste siue terra fornæ
Großi	cum
Vipera	STRANGVLAE
Mustela	tus remedia.
Vnguis asini	Irinum
Fimum	Absynthium.
Hordeum	STRANGVRIAE
Lolium	morbi remedia.
Faba	Lens Aspalathus
Lupinum satium	Cedrides
Lapathum	Locuste
Andrachne, siue portu-	Asparagus
laca syluestris	Sisymbrium
Plantago	Medica
Piper	Panaces heracleon
Capparis	Seseli Massiliense
Argemone	Hipposelinon
Goriandrum	Hippomarathron
Libanotis	Polycnemon
Laserpitium	Clinopodium
Aparine	Oenanthe
Millefolium	Coniza
Scordion	Asplenon
Lithospermon	Cape
Cotyledon prima	Onobrychis
Caliopsis	Polygonon mas

CURATIVVS.

Saxifragon	SVDORES EVO
Xyris	cantia.
Laurus Alexandrina	Metopium unguentum
Tragion	Smyrnion
Pseudobunion	Pyrethrum
Adiantum.	Onobrychis
STYPICAE ME =	Flos salis
dicinae.	Anchusa
Vide, Adstrictoriae me =	Lycopsis.
dicinae.	SVES necantia.
SVCCI qui perimūt.	Chamaeleon albus.
Dioscorides libro . 6 . in	SVFFVSIONVM
præfat.	morbi remedia.
SVDOREM DE =	Fel Sanguis
primentia .	Sagapenum
Oleum	Euphorbium
Oleum omphacinum	Chamaesyce
Oleum oleastri	Harena litoris.
Myrteum	SVGILLATORVM
Lentiscinum	remedia .
Vnguentum melinum	Acetum Sal.
Rhodes	SUPER CILIO =
Myrtus	rum raritati utilia.
Bulbus esculentus	Picea.
Vinum myrsinite	SUPER CILIIS
Sulphur	glabris utilia.
Gypsum	Fuligo resinae.
Terra samia.	SVPPVRATIO =
	Yy iij

INDEX

Onis tuberculorum remedia.	Agaricum
Crocomagna	Rhaponticum
Palimpissa.	Aristolochia tertia
SVPPVRATIO=	Hyssopum
num remedia.	Thymus
Ficus Aegyptia	Acinos
Mel	Ruta
Hordeum	Galbanum
Lolium	Ammoniacum
Cucurbita	Praefum
Ligusticum	Parthenium
Smyrnion	Anagyris
Althæa	Adiantum
Mandragoras	Thapsia
Vrtica	Ampelos leuce
Narcissus	Vinum passite
Ampelos leuce	Vinum hyssopite.
Diphryges.	T ABIDI corporis remedia.
SVSPIRIOSO=	Vide, Phthysicorum re- media.
rum remedia.	T ABESCENTI- bus utilia.
Canchamum	Daphnoides.
Cyphi	Vinum strobilite.
Oleum amygdalarum	T A X O contraria.
Pix	Vinum in commune
Ficus	Acetum.
Vulpinus pulmo	Diosc.lib.6.cap.12.
Eruum	
Plantago	

CURATIVVS.

TELA infixa corpori= Melilotos
bus extrahentia. Ruta

Vide, Spicula infixa. Cyminum

TENASMI morbi Liliū
remedia. Hyoscyamus

Lac schiston Erigeron

Fœnogræcum Vua passa Sal

Linum Geodes lapis

Eruum Terra samia

TEREDINEM Cimolia.

sentientia. THAPSIAE

Ficus Aegyptia contraria.

Hyoscyamus. Diosc. lib. 6. in præfat.

TEREDINEM nō & cap. 33.

sentientia. THERIACAM

Tilia. ingredientia.

Herm. Cor. cap. 133. Rapa sativa

TEREDINEM Zingiber

necantia. Dictamnus

Sal. Apium

TESTIVM more THERIOMA

bi remedia. tum remedia.

Vitex Lupinum sativum

Myrtus Eleliphacos.

Cicer THORACIS res

Faba media.

Erysimon Cerebrum gallinacei

Asphodelus Glycyrrhiza.

Y y iij

INDEX

THYMOS AB-	Bryon thalassion
sumentia.	Pteris
Smaris	Fimum Thelypteris
Thymus	Ruta Vinum cedrite
Heliotropium maius	Chalcanthum
Vitis sativa	Sal. Anchusa tertia.
TIBIARVM VL-	TINEA S rotundas
cerum remedia.	generantia.
Hydropiper	Triticum.
Ampelos leuce.	TINEA S necantia.
TINEA S LATAS	Absynthium seriphion
pellentia.	Mentha
Cardamomum	Heliotropium minus
Costum	Cedria
Malicorium	Aizoon maius.
Melimela	TINEIS contraria.
Iuglans	Morus Citria.
Heliotropium minus	TONSILLARVM
Vinum absynthite	morbi remedia.
Lupinum sativum	Pix Cedria.
Brassica sativa	Lycium
Portulaca	Pruna
Chamaeleon albus	Morus
Hyssopum	Ficus
Calamintha	Hirundines
Thymus	Ruta Lac schiston
Coriandrum	Mel Sinapi
Melilotum	Aloe

CURATIVVS.

Origanum	Sisymbrium	
Britannica	Piper	Scilla
Periclymenos	Agaricum	
Helxine	Rhaponticum	
Peristereon supinus	Centaurium maius	
Omphacium	Eryngion	
Vinum myrsinite	Calamintha	
Flos aris	Serpyllum	
Alumen	Sal. Sampsuchus	Ruta
TORMINIS	re= Panaces heracleon	
media.	Acetum	
Iris Illyrica.	Cuminum sativum	
Acorus	Men Seseli Massiliense	
Cardamomum	Cuminum sylvestre	
Balsamum	Elaphoboscon	
Agallochum	Petroselinum	
Oleum	Daucus	
Iuniperus	Libanotis	
Halimos	Ferula	
Iuglans	Peucedanum	
Ficus	Asclepias	
Fiber	Melissophyllon	
Talus suis	Phalangion	
Triticum	Coniza	
Milium	Alisma	
Panicum	Chamæpitys	
Eruum	Cramen	
Atriplex	Pseudobunion	

INDEX

Chamedaphne	Strigmenta gymnastor
Vinum scillite	rum
Vinum cedrite	Morus
Vinum hyssopite	Asphodelus
Vinum tragoriganite	Panaces Asclepion
Vinum panacite	Lasertitium
Aphronitrum	Viscum
Et in uerbo, Dysenteris	Thapsia
corum remedia.	Mandragoras
TORPORIS re=	Ephemeron
media.	Cucumis anguinus
Fagus.	Vrtica
TORSIONIS	Aerugo aurificum
remedia.	Lapis Asrus
Tragoriganum.	Terra cimolia.
TOXICO cōtraria.	TVBERA exte=
Glandes	nuantia.
Sanguis.	Triticum
TREMOREM	Leontopodium
excurientia.	Scammonia
Vnguentum cinnamomi	Vinum nigrum è labru
num.	sca.
TREMORIS re=	TVMORVM
media.	remedia.
Lepus terrestris.	Anagyris
TVBERCVLO =	Platanus
rum suppuratio=	Fagus
nis remedia.	Ilex
	Hordeum
	Adeps
	Faba

E V R A T I V V S.

Brassica sativa & syl-	Phlomidis
uestris	Cucumis anguinus
Cucurbita	Thapsia
Nasturtium	Chamaesyce
Hydropiper	Pygnoكوم
Bulbus esculentus	Aqua maris
Isatis	Indicus lapis
Chamaeleon	Fex uini Spongia.
Tragoriganum	T V S S I S remedia.
Sampsuchum	Amygdala amara
Ligusticum	Asphodelus
Daucus	Apium sativum
Libanotis	Bdellium
Melanthion	Bromos
Orchis serapias	Cinnamomum
Orminum	Calamus odoratus
Buphthalmus	Cupressus
Cannabis syluatica	Cedrides
Polygonon mas	Cistos Cacalia
Lagopus Xyris	Chamaedrys
Helxine	Tragacantha
Pentaphyllum	Dracunculus
Peristereon supinus	Faba Helenium
Hyoscyamus	Hippuris
Psyllium	Hyoscyamus
Xanthium	Iris Illyrica
Sesamoides	Lycium
Ephemerum	Laserpitium Mel

INDEX

Melicratum		Centaurium maius
Origanum	Pix	Baccharis
Paliurus	Piper	Seseli Massiliense
Peucedanum		Daucus
Prasium		Sagapenum Galbanum
Papauer sativum		Scordion
Ruta	Styrax	Bechion
Struthion		Helxine
Smyrnion		Phlomidis
sulphur		Acetum
Triticum		Vinum hyssopite
Tragoriganum		Sandaracha.
Terebinthina		V AROS purgans
Vua passa.		tia.
TVSSIS ueteris		Oleum balaninum.
remedia.		Myrrha
Asarum		Lacerta
Myrrha		Linum
Nuclei pini		Porrum
Mastiche		Cepe
Naphtha		Bulbus esculentus
Cerasia		Pulegium
Amygdala amara		Balanus myrepfica
Auellana		Cici
Allium		Sory.
Ficus		Ampelos leuce.
Rhaphanus	Propolis	V ARICES sanans
Scilla	Hyssopus	tia.
		Cirsion.
		V ENEFICIIS
		medetur.

CURATIVVS.

Scilla.		Orminum
VENEREM cum no		Xiphium
luptate expe-		Vrtica
dientia.		Caliopsis.
Laurus Alexandrina.		VENENATA
VENEREM co		fugantia.
hibentia		Vitex
Portulaca		Dictamnus.
Lactuca		VENAS excitantia.
Lactuca sylvestris.		Vinum Phalernum.
VENEREM sti-		VENTRIS anima-
mulantia.		lia expellentia.
Costum	Crocum	Vide, Tineas latas.
Mastiche		VENTREM solu-
Linum		uentia.
Rapa satina		Vide, Aluum soluentia.
Sifer	Eruca	VENENATO-
Porrum	Cape	rum ictus re-
Nasturtium		dia.
Dracunculus maior		Cardamomum
Dracunculus minor		Nardum gallicum
Bulbus esculentus		Helenium
Mentha		Cinnamomum
Staphylinus		Bdellium
Anisum	Orchis	Vitex
Orchis serapias		Ficus
Satyrion		Propolis
Satyrion alterum		Rhaphanus
		Triticum
		Eryngium
		Cyminum sylvestre
		Althea
		Tribulus

INDEX

Prasium	Passum
Smilax aspera	Linum gypsatum
Aqua maris	Rubrica lemnia
Acetum.	Terra samia.
VENENORVM	VERMIBVS
remedia.	contraria.
Cinnamomum	Cedria.
Oleum	Pix
Paliurus	Lycium
Olea Aethiopica	Batrachion
Iuglans	Clinopodion
Lixivia ex ficu	Characias
Lepus terrestris	Chamaefyce
Fiber	Butyrum
Sanguis	Vrina
Rapa sativa	Ficus
Malua	Cicer
Erysimon	Heliotropium
Agaricum	Fimum
Aristolochia secunda	Staphis agria
Abrotonum	Scilla
Ruta	Thymus.
Asperpitium	VERTIGINIS
Leucas	morbi remedia.
Pelium	Apium
Pentaphyllum	Balsamum
Colchicon	Lac humanum
Epipactis	Peucedanum
	Cestron
	Galbanum
	Ampelos leuce
	Ampelos melena
	Acetum scilliticum

CURATIVVS.

Vinum scilliticum.	Lotus syluestris	
VERTIGINEM	Plantago	Vua passa
adgenerantia.	Cucumis	
Cardamomum	Scandyx	Passum
Balsamum	Ochra	Porrum
Hysocyamus	Bulbus uomitiuus	
Mandragoras	Rhaponticum	
Falernum	Glycyrrhiza	
Vinum rhetinite	Tragacantha	
Mandragorite	Panaces heracleon	
Aconitum	Cicuta.	Petroselinum
VESICAE morbi	Smyrnion	
remedia.	Peucedanum	
Meu	Foeniculus	
Nardum Gallicum	Nymphaea	
Nuclei pini	Anthemis	Peonia
Cupressus	Phalaris	
Laurus	Palma	Cepe
Palma etate		Halcyonium
Myrtus	Lac	Cestron
Ficus	Ouum	Vinum terebinthinum
Cochleae terrestres		Vinum scilliticum
Cicadae	Napum	Vinum aromatite
Cervinum cornu		Vinum halosanthite
Saccharum		Lapis morochthus.
Gramen	Malua	VESPARVM ictus
Hippuris		remedia.
Portulaca	Laurus	Malua

INDEX

Sisymbrium.

VESTIBVS ne
animalia nos
ceant.

Absynthium

Heliochrysos.

VIBICES plagas
rum emendan-
tia.

Susinum.

VIPERAE morsus
remedia.

Casia

Costum

Iuniperus

Macer

Fraxinus

Vrina

Caries lignorum

Triticum

Eruum

Ferula

Anchusa

Onocheles

Ocimoides

Dioscorides libro.6. ca-
pit.63.

Herm. Coroll. cap.721.

VIRIVM infirmita-
tes roborantia.

Nuclei pini.

VISCO contraria.

Vinum in comuni

Acetum

Vinum Absynthite

Diosco.lib.6.cap.21.

VISCERVM mora-
bi remedia.

Thus.

VITILIGINIS
remedia.

Daphnoides

Myrtus

Ficus

Grossi

Cochleæ terrestres

Lepus terrestris

Sepiæ

Faba

Beta

Lupinum sativum

Chondrylla

Cepa

Allium

Piper

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Capparis

Argemone

Gentiana

Telephion

Ruta

Chamæleon niger

Libanotis

Lilium

Nymphaea

E V R A T I V V S.

Nymphaea Cicuta **VOCEM** claram
 Erythrodanum reddentia.

Helleborum nigrum Myrrha
 Cucumis anguinus Styrax Silurus.
 Balanus myrepfica **VOLVPTATES**
 Narcissus animi auge-
 Sulphur scentia.

Halcyonium Buglossum.
 Terra melia. **VOLVCRVM** mor-
VITRA fracta con- sus remedia.

glutinantia.
 Herm. Cor. cap. 254.
VMBILIC Ire
 media. Iecur aprinum.

Lapis magnes. **VOMITIONES**
VNGVIBVS utilia. Irinum Laurus
 Pix Cupressus Cocleae terrestres
 Daphnoides Blatte Pepe

Olea Oryza Asphodelus
 Linum Lapatum Capparis
 Bulbus esculentus Bulbus vomitorius
 Batrachion Origanum

Chelidonium minus Cestrum
 Viscum Vva passa Anagyris semen
 Sandaracha Papauer spumeum

Alumen Mandragoras
 Sulphur Daphnoides
 Fex vini. Helleborus albus
 Elaterion Silybon

Z z

INDEX

Balanus myrepfica
Narcissus
Melicratum
Aes ystum
Chrysocolia
Rubrica lemnia.
VOMITIONES
cohibentia
Atriplex
Apium
Mentha
Eupatorium.
VOMICA E mor=
bi remedia.
Pauliurus
Struthion
Bechion
Mandragora
Acetum.
VRENDI uim
habentia.
Misy
VRENDINEM
facientia.
Trifolium.
VRINAE difficul=
tatem generans
tia.

Diosc. lib. 6. in praefat
Cici **VRINAE** haren=
sa & aspera re
media.
Papauer ceratitis.
VRINAM cruenta
mouentia.
Clymenon.
VRINAM ar=
cessentia.
Eruum **Galbanum**
VRINAM mo=
uentia.
Acorus
Cyperus
Cardamomum
Nardi spica
Nardum Gallicum
Asarum
Malabathron
Casia
Cinnamomum
Costum
Iuncus odoratus
Calamus odoratus
Balsamum
Crocum
Crocemagna

Meu
Phis

CVRATIVVS.

Helenium		Panicum	
Oleum amygdalinum		Cicer	Eruum
Vnguentum melinum		Rapa sativa	
Susinum		Rhaphanus	
Irinum		Raphanus agria	
Amaracinum		Sifer	Bunion
Bdellium		Brassica sativa	
Picea	Nuclei pini	Asparagus	
Lentiscus	Resina	Sisymbrium aquati-	
Terebinthus		cum	
Cupressus		Crithmon	
Iuniperus		Cucumis	Pepo
Populus alba		Lactuca	
Paliurus	Tilia	Gingidium	
Olea Aethiopica		Caucalis	Eruca
Glandes	Myrtus	Ocymum	
Palma elate		Smilax hortensis	
Siliqua	Cotonea	Porrum	
Mala Epirotica		Ampeloprasum	
Cornus		Cepa	Allium
Amygdala dulces		Piper	
Erinaceus marinus		Struthion	
Cimices lecti		Dracunculus	
Oues	Buprestis	Asphodelus	
Vermes terreni		Scilla	Capparis
Mel	Hordeum	Agaricum	
Zythum		Crocodilion	
Milium		Centaurium maius	

Z z ij

INDEX

Chamaleon albus		Anthemis	
Acantha leuce		Lithosperma	
Acantha	Anonis	Erythrodanum	
Eryngion		Lonchitis	Althea
Absynthium		Hypericon	
Abrotonum		Choris	
Tragoriganum		Chamapitys	
Elelispacos		Cestron	
Thymus		Polygonon mas	
Serpyllum		Polemonia	
Baccharis		Saxifragon	
Ruta	Moly	Xyris	Gramen
Ligusticum		Gramen parnassium	
Staphylinus		Phoenix herba	
Tordylon		Hippuris	
Sisum	Anisum	Oxyscenos	
Caros Anethum		Heliochrysos	
Cyminum sylvestre		Astragalus	
Opium		Hyacinthus	
Oreoselinum		Papauer rhoeas	
Petroselinum		Strychnon hypnoticon	
Daucus	Libanotis	Cotyledon prima	
Melanthion		Vrtica	Arction
Ammoniacum		Vinum Lesbion	
Chamedris		Hydromel	
Trifolium	Scordion	Melicratum	
Androsaces		Vinum rhetinite	
Anthyllis		Vinum catorchite	

C V R A T I V V S.

Vinum è cedro	Omphacium
Vinum è lauro	Acetum
Vinum absynthite	Flos æris
Vinum calaminthite	Alumen
Vinum aromatite	VVL P E S necantia.
Vinum nectarite	Apocynon.
Vinum nardite	VVL N E R V M re=
Vinum asarite	media.
Vinum sylvestris nardi	Amurca
Vinum daucite	Allium
Vinum acorite	Argemone
Halcyonium	Aristolochia
Lapis hematites	Aloe
Lapis Iudaicus	Althæa
Corallium	Androsæmon
Vinum chamæpyteos.	Lycopsis
VERTICAE her=	Butyrum
be pruritus re=	Brassica
media.	Coccus
Herm. Cor. cap. 707.	Chamæpitys
VSTIS utilia.	Centaurion
Vrtica siue acalyphe.	Cyclaminos
VVAE faucium	Cytinus
remedia.	Cupressus
Pix	Dracunculus
Galla	Dictamnus
Pruna	Aerugo aurificum
Hirundines	Oenanthe
Vrtica	

Z z iij

INDEX

Ficus Aegyptia	Symphyton
Fimum	Sideritis
Gentiana	Stratiotes aquaticus
Glycyrrhiza	Spongia
Glutinum	Cochlea terrestres
Hippuris	Thus
Isatis	Terra cretria
Lana succida	Vinum
Ligusticum	Vinum cenanthe
Lilium	Vnguentum citrinum
Lysimachion	Vlmus
Minium sinopicum	Vitex.
Myriophyllon	VVLVAE mulie-
Picea	ris remedia.
Palma	Men
Portulaca	Cyperus
Porrum	Nardi spica
Polycnemon	Casia
Polium	Costum
Polygonon mas	Iuncus odoratus
Polygonatum	Balsamum
Pentaphyllum	Bryon
Phoenix herba	Nacaphthum
Pteris	Oleum amygdalinum
Peristereon	Mastichinum
Papauer	Vnguentum rosaceum
Plumbum elotum	Melinum
Scordion	Sampsuchinum

CVRATIVVS.


Abrotoninum	Iuglans
Susinum	Cimices lecti
Narcissinum	Lac schiston
Crocinum	Butyrum
Irinum	Oesypum
Gleucinum	Coagulum
Amaracinum	Adeps
Metopium	Foenogracum
Cinnamomum	Pinum
Myrrha	Malua
Styrax	Portulaca
Bdellium	Plantago
Lentiscus	Sonchos
Pix	Porrum
Naphtha	Sinapi
Iuniperus	Piper
Laurus	Agaricum
Myrica	Rhaponticum
Cistos	Pulegium
Rosa	Centaurium minus
Lycium	Melilotus
Acacia	Ruta
Amarca	Panaces heracleon
Vitex	Ammi
Galla	Sphondylion
Palma elate	Peucedanum
Myrtus	Sagapenum
Cotonea	Galbanum


Z x iij

INDEX


Asclepias	Vinum picatum, siue pis
Lilium	site
Circea	Vinum chamaedryte
Arthemisia	Vinum daucite
Geranion	Vinum helleborite
Anthyllis	Lapis gagates
Parthenion	Peristereon rectus
Peonia	Hyoscyamus
Cestron	Mandragoras
Clematis daphnoides	Ebulus
Chrysocome	Ampelos leuco
Ageraton	Acetum
Vinum terebinthinum	Acetum scilliticum.
Vinum cedrite	


INDICIS CURATIVI
FINIS.







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1790/A